Field Museum of Natural History

LIBRARY

Chicago

From Strecker Collection

Class A 46.03 Book G556

Gemmin 3632

Gen
1777.3

79463
V.1

ENTOMOLOGISCHE

BEYTRÄGE

ZU

DES RITTER LINNE'

ZWÖLFTEN AUSGABE

DES NATURSYSTEMS

VON

JOH. AUG. EPHRAIM GOEZE,

Paſtor an der Kirche S. Blaſii zu Quedlinburg, Ehrenmitgliede der Geſellſchaft Naturforſchender Freunde in Berlin, der Herzoglichen deutſchen Geſellſchaft in Helmſtädt, der Naturforſchergeſellſchaft in Halle, und der Königlich Schwediſchen patriotiſchen Geſellſchaft zu Stockholm.

DRITTEN THEILES VIERTER BAND.

34917

Leipzig,

bey Weidmanns Erben und Reich. 1783.

VORREDE.

Hier der vierte und lezte Band des dritten Theils meiner entomologiſchen Beyträge. Wann der fünfte Theil erſcheinen werde, kann ich noch nicht mit Gewiſsheit beſtimmen.

In der Vorrede zu den vorigen Theilen habe ich die entomologiſchen Schriften angeführt, die in der Zeit noch herauskamen, da die Theile abgedruckt wurden, die ich alſo bey meiner Handſchrift ſelbſt nicht anführen konnte. Jetzt ſollte ich alſo aus Cramers und Eſpers Heften, wie auch aus Fabricii Spec. Inſ. das Uebrige nachholen. Ich bitte aber meine Leſer, dieſe Schriften ſelbſt zu vergleichen, und das Fehlende ihren Exemplaren meiner Beyträge beyzufügen. Es würde die Vorrede ſonſt beynahe eben ſo ſtark, als dieſer Band geworden ſeyn.

Lieber will ich einige, den Entomologen nützliche und ſehr gegründete *Berichtigungen* mittheilen, die ich den freundſchaftlichen Erinnerungen einiger meiner Freunde zu danken habe.

Zuerſt von dem Herrn Pfarrer *Scriba* zu Gräfenhauſen.

Zum erſten Theil des dritten Bandes der Beyträge über die *Pap. Dan. Cand.*

1) Cramers P. D. C. *Niſe* kann nicht Hecube, ſondern ein anderer ſeyn. Der Sebaiſche iſt es auch nicht.

2) Bey Eubule iſt Seb. 38. f. 19. 20. angeführt, und eben dieſer Sebaiſche ſteht unter den neuen Laete flavus.

3) Bey Sennoe iſt Seba t. 26. f. 5. 6. citirt; dieſe Larve und Puppe mit 7. 8. iſt aber *Philea.*

4) Bey Cleopatra fällt alſo das Citatum Seba 26. f. 7. 8. weg.

5) Cramers *Eclipſis* iſt nicht die Linnéiſche, ſondern Maerula Fabricii.

6) Die Sulzerſche Teutonia iſt Cramers Coronea.

7) Die Iphigenia im Naturforſcher iſt Cramers Pyrrha.

8) Fabricii Calypſo hat Seba t. 6. f. 9. 10. und t. 26. f. 3. 4.; leztere fällt alſo unter den neuen weg.

9) No. 84. unter den neuen Sebaiſchen iſt Leucippe Cram. et Fabricii.

10) No. 89. unter den neuen iſt Odibes Cram. der nämliche ſcheint auch Seba t. 18. f. 12. 13. zu ſtehen.

11) Der Bergſträſeriſche Nelo iſt zuverläſsig eine Varietät von Rapae.

12) Creona

12) Creona Cram. ſteht Seba t. 18. f. 4. 5.

13) Crameri Daplidice iſt eigentlich Linn. Hellica.

14) Crabiſea Cram. ſcheint Seba t. 38. f. 15. 16. zu ſeyn.

15) No. 97. Seba t. 45. f. 3. 4. oder t. 31. f. 9. 10. möchte Arganbe Fabric. ſeyn.

Vom Herrn Hofmeiſter *Knoch* zu Braunſchweig.

Dieſe ſind wichtig und ſehr genau.

Bey der Ph. Tortr. *Praſinana* L. wird im Degeer Th. I. Qu. 1. S. 50. in der Note Röſels IV B. t. 22. angeführt, und im Naturf. VII. p. 139. dieſelbe Röſelſche Abb. für die Linn. Praſinana ausgegeben.

Nach Degeer ſoll bey der Praſin. L. Raupe, Puppe und Schmetterling eine grüne Farbe haben. Dieſes fällt aber bey dem Röſelſchen Schmetterling a. a. O. weg, indem die Puppe unten gelblich und oben röthlich blau ausſieht. Daher bin ich der Meynung, daſs Linn. Praſin. beym Röſel IV B. t. 10. f. 5. abgebildet worden, und eben diejenige ſey, welche Füeſsli p. 41. n. 798. Ph. Bicolorana nennet, und alſo Degeer Tom. II. Qu. 2. p. 296. den Geoffr. Inſ. II. p. 172. n. 124. Röſel IV. t. 10. und Réaum. I. t. 39. f. 10—14. mit Recht bey der Praſinana

angezogen habe. Das Linnéiſche Citat bey der Praſinana aus Röſel IV. t. 22. iſt meiner Meynung nach falſch. Man darf nur die Abbildungen des Réaumür, Degeer und Poda mit jenen, und unter einander vergleichen, um die Sache ins Reine zu bringen. Die Röſelſche Phal. Tom. IV. t. 22. f. 5. *iſt keine Tortrix.* Dieſes weiſs ich aus häufiger Erfahrung. Ich halte ſie für Geoffr. Ph. verte ondée. II. p. 172. n. 125. Die Thereſianer haben ſich wahrſcheinlich durch das falſche Zitat beym Linné verleiten laſſen, die Praſin. mit der Ph. verte ondée für einerley zu halten.

Meine Leſer vergleichen hierbey in dieſem Bande p. 3. no. 285.

* * *

Beym Degeer Th. I. Qu. 2. S. 5. iſt in der Note vieles von den Urſachen und Abſichten der beſondern Struktur des Geſpinnſtes der Ph. Pavonia geſagt worden. Seit vier Jahren habe ich Verſuche mit dieſen Geſpinnſten gemacht. Ich habe die Reuſe in der Mitte querdurch geſchnitten, und die Puppe in dem untern weitern Theile, den ich mit einer Nadel an

an dem Kaſten veſtſteckte, liegen laſſen. Ich habe davon *ganz ausgewachſene* Schmetterlinge bekommen; dabey aber die Vorſicht angewandt, daſs ich ſie in einem groſsen Kaſten, der inwendig nicht glatt war, auskommen lieſs. Denn die Männchen ſind ſehr lebhaft, wenn ſie nicht durch die enge Oeffnung kriechen müſſen, und fallen während des vielen Hin- und Herlaufens ſehr leicht, zumal wenn der Deckel oder die Wände des Kaſtens glatt ſind. Fallen ſie aber ein oder mehrere mal; ſo werden es Krüppel, und ihre Flügel wachſen nicht gehörig aus. Diejenigen, welche durch die Reuſe kriechen, und in ihrer Ordnung nicht geſtöret werden, ſitzen bald ſtille, und kommen nicht ſo leicht in Gefahr zu fallen. Die Weibchen müſſen ſich beſonders ſehr anſtrengen, um durch die enge Oeffnung der Reuſe zu kommen, und geben ſich daher gleich zur Ruhe, um auszuwachſen.

Wozu alſo der künſtliche Bau des Geſpinnſtes? Der Allmacht des Schöpfers war es gefällig, bey dieſem Schmetterling einen andern und künſtlichern Weg zu wählen, wodurch er aus ſeinem Behältniſs kommen konnte.

Die vom Degeer T. II. p. 250. no. 2. beſchriebene Phaläne kann nicht Atomaria L. ſeyn. Dieſe hat Friſch XIII. S. 12. t. 5. abgebildet, iſt viel kleiner, und bey weitem nicht ſo groſs, als die vom Degeer abgebildete. Degeer ziehet auch Schaeff. Icon. t. 17. f. 3. an, wo offenbar Prunaria L. abgebildet worden, die auch Kleemann in ſeinen Beytr. I. t. 23. f. 3. geliefert hat, und von dieſer iſt beym Degeer die Rede. Denn er ſagt: die Flügel wären auf der Oberſeite alle Orangegelb, welches beym Männchen vorzüglich eintrifft; bey der Atomaria Linn. aber, die auch im Naturforſcher III. t. 1. f. 4. ſchlecht gezeichnet iſt, nicht ſtatt findet. In der Note ſind Hufnagel Berlin. Magaz. IV. p. 570. n. 12. der faule Eſel; Gleditſch Forſtwiſſ. Th. I. p. 390. n. 7. *Kleemanns* Beytr. I. p. 285. t. 34. angezogen. Vergleicht man aber die Beſchreibung der Raupe und des Schmetterlings, ſo Degeer T. I. Qu. 2. p. 103 — 106. von dem groſsen braunen Fleiſchfarbig geſtreiften Stockſpanner macht, mit Kleemanns Beſchreibung am angef. Orte von der Raupe t. 35. f. 1. 2. 3. und hält damit des Hufnagels und Gleditſch Atomaria, und Linn. Hirtaria zuſammen; ſo

wird

wird man sich schwerlich enthalten können, unter allen diesen Namen die Hirtaria Linn. zu verstehen. Ich habe sie sehr oft aus der Raupe gezogen, und gefunden, dass die Degeerische Beschreibung l. c. und die Kleemannische mit der Natur genau übereinstimmen. Kleemann wusste es nicht, was für ein Schmetterling aus der t. 35. f. 1. 2. 3. abgebildeten Raupe komme. Denn er giebt die t. 34. f. 4. abgebildete für die Raupe des t. 34. f. 6. 7. vorgestellten Schmetterlings aus. Diese habe ich niemals gehabt, und wenn Kleemann darinn nicht irrt, wie ich denn nicht glaube; so hat der von ihm gezeichnete Spanner, oder Hirtaria Linn. *zweyerley Raupen*, wie ich dergleichen auch bey andern Arten gefunden habe. Des Degeer T. I. Qu. 1. p. 256. n. 6. t. 5. f. 21. beschriebene und abgebildete Phaläne halte ich für Atomaria Linn. Degeers Ph. Noctua Tom. II. Qu. 2. p. 293. und 294, so Schäffer t. 112. f. 1. 2. abgebildet, ist Linn. Ph. N. Exclamationis, und Hufnagels Ph. N. Clavus; also wohl keine neue Art. Es hat auch Degeer Tom. II. Qu. 1. p. 253. bey der Fasciaria Linn. den Rösel I B. Cl. 3. t. 3. unrecht citirt.

Uebrigens hat Herr Cammerrath *Jung* in seinem Verzeichniss der meisten bisher bekannten europäischen Schmetterlinge: 1782.

über die Atomaria,
— Aprilina,
— Ludifica,

viele Berichtigungen geliefert.

Bey dieser Gelegenheit aber kann ich nicht umhin, noch dieses anzuzeigen, wie mich Herr *Knoch* vest versichert hat: dass Herr *Herbst* im 2ten Stück des Füessl. Archivs Männchen und Weibchen der Atomaria nebst der Raupe und Puppe, unter dem Namen: Artemisaria, Beyfussspanner, beschrieben und abgebildet habe.

Das 2te Stück der *Knochischen* Beyträge zur Insektengeschichte, mit sieben sehr fein ausgemalten Kupfertafeln, kann ich meinen Lesern abermal nicht genugsam empfehlen.

Herr *Knoch* ist so sehr philosophischer Beobachter und Entomologe, dass eben dadurch seine Beobachtungen an *Genauigkeit* und *Annehmlichkeit* einen vorzüglichen Werth erhalten, und eine grosse Menge schöner kostbarer Mahlbücher unserer Zeiten weit hinter sich zurücklassen, darinn man nichts, als Genera,

Spe-

Species, u. ſ. w. von der wahren Naturgeſchichte aber faſt gar nichts findet. Meine Leſer werden mir danken, daſs ich ihnen ſtatt einiger magern Auszüge aus jenen, aus dieſen einige lehrreiche und höchſt intereſſante Bemerkungen mittheile.

In der Vorrede ſagt Herr K. ſehr richtig: daſs man doch allen Fleiſs anwenden möchte, die Abbildungen natürlicher Dinge der Natur ſo getreu als möglich zu machen, weil ſonſt die Herrlichkeit des Schöpfers mit entſtellt würde. Ein Vorzug, den nur ſolche geſchickte Hände, als die Knochiſchen, die ſelbſt ſo vortrefflich zeichnen, ihren Werken geben können!

Ferner eine anſehnliche Vermehrung einer Fauna Bructera. Er hat, wie ich, angemerkt, daſs in dem Mooſse des Berges viele Puppen unbekannter Spannmeſſer liegen.

P. 1. Ph. N. virens L. n. 139. davon p. 2. eine eigene Beſonderheit. Die Zunge dieſer Phal. iſt von der Baſi an bis in die Mitte geſpalten, da ſie ſonſt nur von der Mitte bis an die Spitze geſpalten iſt. Vielleicht iſt ſie hier nur zuſammengeklebt geweſen, wie mir oft vorgekommen

men ist. Diese Phaläne ist auch hier zum *erstenmal* abgebildet.

P. 4. Ph. Geom. pustulataria, die L. nicht hat.

P. 7. Ph. G. Prunaria L. Varietas, zu der verschiedene Citata bey der Sordiata L. gehören. Die Beschreibung der *Raupe* in schönem Latein, meisterhaft. Kenner der Entomologie werden die Schwierigkeit einer solchen Beschreibung fühlen, besonders bey Larven, die so sehr variiren, und sich durch keine merkliche Farben auszeichnen.

Besonders genau p. 12. die Bemerkungen über die Oekonomie und Lebensart dieser Raupen.

P. 17. heisst es unter andern in der Anmerkung: „Könnte man die mannigfaltigen Abänderungen, die sich sowohl an Kammförmigen als Borstenähnlichen Fühlhörnern der Schmetterlinge finden, ohne Hülfe eines Vergrösserungsglases bemerken; so glaube ich, nicht ohne Grund, dass selbige bey sehr vielen Gattungen ein wesentliches Unterscheidungszeichen abgeben würden.“

Es wären denn doch dies nur einzelne Merkmale, die nie einen vollständigen Begriff eines natür-

natürlichen Körpers geben. Sie müſſen alle zuſammengenommen werden.

P. 21. no. 4. Ph. N. Lucipara L. no. 181. t. 1. f. 4. 6. 7. Hier zum *erſtenmale* abgebildet. p. 28. ſehr artige philoſophiſche Anmerkungen.

„Linné, ſagt der V. giebt dieſe Art für ſelten aus. Ihm ſelbſt iſt er im Freyen nie zu Geſicht gekommen; da hingegen die Raupe jährlich in groſser Menge vorhanden ſey. Wie viele der bereits bekannten Nachtſchmetterlinge würden alſo fehlen, wenn ihre Raupen nicht aufgeſucht wären, die ſich wegen ihrer lebhaften Farben, ihrer Begierde zur Nahrung, und der davon zurückgebliebenen Spuren, oft ihrer, das Auge an ſich ziehenden Kunſttriebe, ihrer Unruhe bey bevorſtehender Verwandlung, und anderer Urſachen wegen nicht ſo ſorgfältig verbergen können, als ſie es gröſstentheils in ihrem lezten und vollkommenen Zuſtande zu thun pflegen, worinn ſie am Tage gewöhnlich der Ruhe genieſsen, und einen ihren trüben und dunklen Farben ſehr ähnlichen Aufenthalt wählen, der ſie auch oft durch ſeine Dunkelheit gegen alle Nachſtellungen in Sicherheit ſetzt? Dahingegen finden ſich meiſtentheils an denen Schmetterlingen ſehr in die Augen fallende

Far-

Farben und Zeichnungen, deren Raupen uns durch ihr Anſehen und durch den Aufenthalt in Saamenkapſeln, in dem Mark des Holzes, oder in der Erde ſehr oft verborgen bleiben."

Bey gewiſſen *Käferarten* iſt das Verhältniſs faſt eben ſo. Wie lange ſind die unanſehnlichen Larven der Prachtkäfer (Bupreſtis) in alten faulen Holzſtämmen verborgen geblieben, und wie ſchön ſind oft die Käfer?

P. 29. Ph. N. Tanaceti no. 5. t. 2. f. 1. 9.

Abermal hier *zuerſt* abgebildet. Die Raupen können ſeitwärts, wie einige Blattwickler, 5 bis 6 Zoll weit ſpringen.

P. 36. eine artige Bemerkung, die ich auch aus meiner Erfahrung ſehr wahr befunden habe.

„Obgleich dieſe Raupe eine glatte Haut und helle in die Augen fallende Farbe hat; alſo von dieſer Seite gegen ihre Feinde nicht ſonderlich geſchützt iſt; ſo habe ich dennoch keine, auch ſelbſt nicht unter den geſundeſten Ausgewachſenen gefunden, deren ich oft eine Menge zuſammengebracht, welche von andern Inſekten beſchädigt geweſen wären. Auch waren die Puppen, welche mir nicht ausgekommen ſind, niemals beſetzt. Ich will

es

es gern zugeben, daſs ſie ſich durch ihr ſtarkes Schlagen mit dem Kopfe, und andere heftige Bewegungen gegen die Angriffe ihrer Feinde vertheidiget. Allein warum ſetzen dieſe Waffen nicht auch andere Arten, welche damit verſehen ſind, in Sicherheit? Sollten vielleicht die bittren Säfte, welche unſere Raupe aus ihren Nahrungspflanzen zieht, den gewöhnlichen Raupenverfolgern einen Ekel erregen, ſo wie den Bohrkäfern, Holzläufen und Schabkäfern bey aufgetrockneten Inſekten, welche mit bittern Extrakten beſtrichen ſind? Ich wünſchte, daſs auch andere Naturforſcher hierüber Beobachtungen anſtellen möchten."

Dieſe Raupen brachten ihre Puppenhülſe ohne Erde aus groſsen und kleinen Stücken von morſchem Weidenholze, die unter ihre Futterkräuter geworfen waren, glücklich zu Stande.

P. 38. 39. 40. 41. iſt das kunſtmäſsige Verhalten der Raupe in Verfertigung ihres Geſpinnſtes beſchrieben, da ſie in Verlegenheit geſetzt war, ihren Bau nach einem ganz andern Plan, als der ihr in der Natur angewieſen war, alſo nur nach den zufällig veranlaſsten Umſtänden, zu machen, wobey der V. ſagt: „Ich glaube nicht zu irren, wenn ich dieſe Kunſthandlung

lung unter *die erſten* ſetze, die jemals an Jnſekten bemerkt worden ſind.“

Und wir ſtimmen ihm völlig bey. Dergleichen Bemerkungen können nicht genug geſammelt werden. Die Handlung der Raupe zeugt offenbar von gewiſſen Graden von Verſtandeskräften. Und ſolche Anmerkungen ſind die rechten Materialien zu einer *Pſychologie der Thiere.*

P. 44. ſagt der V. in der Anm. „Die *verlängerten Zungenfutterale* ſind beynahe ein unterſcheidendes Merkmal bey allen Puppen der *Kappenhalſigen Eulen;* doch weichen ſie auch unter ſich von einander ab.“

Sehr richtig und wahr. Jch fordere hierdurch den Verfaſſer öffentlich auf: *die Kappenhalſigen Eulen* von den Noctuis L. ganz zu trennen, und ſie zunächſt auf die Sphinges folgen zu laſſen. Sie verdienen es, und geben dazu ſelbſt die Charaktere an die Hand. Er iſt auch der Mann dazu, der nicht nöthig hat, in verba Magiſtri jurare. —

P. 47. no. 6. Ph. N. Artemiſiae, die L. nicht hat.

P. 50. von den *Dörnchen an den Fuſsblättern* dieſer Kappenhalſigen Eulen, daſs ſie wegen

gen ihrer *Ordnung* sehr in die Augen fallen, fast allen Eulen gemein sind, und wahrscheinlich zum Mittel dienen, sich vest anzuhalten.

P. 51. no. 7. Ph. N. Trapezina L. no. 99. Von den Mordraupen dieser Phaläne p. 55. besondre Bemerkungen:

1) Dass sie *in ihrer Freyheit* auch andre Raupen verzehren, wobey sie der V. oft angetroffen hat.

2) Dass sie sich ungern wieder an Pflanzen gewöhnen, wenn man sie eine Zeitlang mit andern Raupen gefüttert hat.

3) Dass sie durch das Fleischfressen bisweilen etwas von der grünlichen Farbe verlieren, und bräunlich werden.

4) Dass eine Kleinere oder Schwächere oft einer Grösern überlegen wird, und dieselbe auf die hinterlistigste Art angreift.

„Sie sucht ihr erst von hinten zu durch einen tückischen Biss eine Wunde beyzubringen. Ist ihr solches geglückt; so lässt sie die Verwundete so lange unangefochten, bis sie von ihrer Wunde matt und krank wird. Dann fällt sie über sie her, und giebt ihr die letzten tödtlichen Bisse.

Nach p. 56. ist dem V. Sphinx Euphorbiae nach acht Tagen ausgekommen, der gewöhnlich ein, auch zwey Jahr in der Puppe liegt. Also giebts wegen der gewissen Zeit des Auskommens noch keine Regel.

P. 58. no. 8. Ph. B. Fagi L. no. 30. Von der Larve p. 59. abermal eine meisterhafte Beschreibung. Ihre Geschichte ist noch nicht aufgeklärt genug. Von ihren unförmlich langen Füssen, welche Absicht? Offenbar erschweren sie ihr das Gehen. Sie stämmt sie in die Höhe, wenn ein Geräusch gemacht wird, oder wenn sie Gefahr fürchtet. Die Schmetterlinge kommen äusserst selten vollkommen aus den Puppen, wenn sie auch gar nicht in ihrer Ruhe gestört werden. Was mag davon die Ursache seyn?

P. 68. no. 9. Ph. G. pulveraria L. no. 215. Diese, die wahre *Clerkische*, aber nicht Defoliaria.

P. 71. no. 10. Ph. N. Parthenias L. no. 94. t. 3. f. 8. zum *erstenmale* hier abgebildet: das *Weibchen*. Es ist dieselbe, als unter meinen neuen Ph. glauceſcens: Beytr. III Th. 3 B. p. 206. no. 63.

P. 75.

P. 75. no. 11. t. 4. Ph. Pyr. Tarsicrinalis, der *Haarfuſs.* Eine ganz *neue Art.*

P. 79. no. 12. t. 5. f. 1-6. Ph. Pyr. Barbalis L. no. 329. wegen der Haare und Fühlhörner merkwürdig.

P. 81. no. 13. t. 5. f. 8. Ph. Tin. Degeerella L. no. 426. Aeuſserſt lange beſondre Antennen.

P. 85. no. 14. Pap. Pl. Rur. W album, das weiſse W. t. 6. f. 1. 2. Varietas Pap. Ilicis Eſper. An diverſa ſpecies?

P. 88. no. 2. t. 6. f. 3. Pap. Pl. Rur. Hippothoë. Varietas fœminae.

P. 90. no. t. 6. f. 4. 5. Pap. Pl. Rur. Amphidamas.

P. 93. no. 4. t. 6. f. 6. 7. Pap. Pl. Rur. Erebus. Eine ganz neue Art.

Die t. 6. abgebildeten Tagfalter ſind alle merkwürdig. Ihre Geſchichte, ſo wie andrer ihres Geſchlechts, verdient noch immer eine genaue Unterſuchung. Auch iſt es merkwürdig, daſs einige dieſer Pap. Pl. Rural. in verſchiedenen Gegenden häufig, in andern gar nicht gefunden werden. In unſerer Gegend Hippothoë,

pothoë, Amphidamus, W album und Erebus gar nicht; Virgaureae äuſserſt ſelten.

P. 95. Scarab. hemipterus L. no. 63. t. 7. f. 11. 12. wegen des beſondern Kopfs. f. 12.

Gewiſs iſt in dieſen wenigen Bogen mehr *wahre Naturgeſchichte* enthalten, als in manchem prächtigen ausgemahlten Werke, das einige hundert Thaler koſtet.

Vor der Neujahrsmeſſe 1783.

GOEZE.

V. *Blattwickler*. Ph. Tortrices. *)

Chenilles plieuſes Papillons (Phalenes) larges d'epaules. *Réaum.*

Nach der Wiener Entomologen Eintheilung: *Syſt. Verz. der Schmetterlinge der Wiener Gegend* p. 125. giebt es *ſechs Klaſſen* derſelben.

1) *Grüne;* 2) *Metalliſche;* 3) *Gelbe;* 4) *Braune;* 5) *Graue;* 6) *Düſtere.*

282. Phal.

*) *Linné* hat ſie alle unter dem allgemeinen Namen: Tortrices, begriffen; allein *Reaumur* hat ſchon einen Wink gegeben, daſs ihre Oekonomie und Verwandlung nicht nach einerley Ordnungen und Geſetzen erfolge, mithin darinn ſchon der Grund zu einer *natürlichen*, und der Erfahrung gemäſsen Eintheilung zu ſuchen ſey. S. Mém. des Inſ. Tom. II. Mém. 5. 6. &c. Er ſetzt unter dieſen *Raupenarten* drey Ordnungen: 1) einige biegen nur den *Rand* des Blatts über oder unter ſich, und überziehen den noch offenen Raum mit einem Gewebe (Chenilles *plieuſes*); 2) andere *rollen* das Blatt in mehrere Windungen (Chenilles *roulenſes*). Jene alſo *Blattwickler*; dieſe *Blattroller*. 3) Noch andere ſpinnen *mehr Blätter* zugleich oder die Blüthen der Pflanze in einen Knoſpen zuſammen, und dieſes entweder *einſam*, oder *geſellſchaftlich* (Chenilles lieuſes en paquet; Chenilles lieuſes des fleurs); *Blattbinder*. S. Abhandl. von der *Wickelraupe*, nebſt einigen Vorſchlägen zu derſelben Vertilgung. 8. Berl. und Leipz. 1779. mit e. Kupfer. Es iſt dies aber Ph. G. L. *Brunnata*, und keine *Tortrix*.

* * *

282. Phal. *Tortr. Cereana*, die *Wachsmotte.* *)

Müllers Linn. Naturſyſt. 5 Th. 1 B. p. 722. no. 282. der *Honigdieb.*

Fabric. S. E. p. 655. *Tinea.* 1. *Cerella:*
Alis griſeis, poſtice emarginatis: dorſo canaliculato, fuſco.

283. *Faſciana*, das *Weißband.* **)

Müller l. c. p. 723. no. 283. *Weißband.*

Wiener Schmett. p. 131. E. *Graue Blattwickler*, Ph. Tortr. *Cinereae:* n. 36. *Unbekannte Raupe;* Dunkler Wickler mit *breitem weißem Querbandbande.* T. *Faſciana* L.

Geoffr. Inſ. II. p. 188. no. 14. *Tinea* fuſca, capite fuſco, alis ponc albidis.
La *Teigne bedaude à tête brune. Long.* 4 lign.

Raj. Inſ. p. 204. no. 99. *Phalaena* parva, alis oblongis, Tineae inſtar, e fuſco et albo bicoloribus, nigra parte alba longiore.

Aequa-

*) Ich kann nicht ſagen, was den *Linné* bewogen hat, dieſe unter die *Wickler* zu ſetzen, da ſie eher zu den eigentlichen *Motten*, Tinea, zu gehören ſcheint. Ich habe die Verwüſtungen der *Larve* an einer mit Wachs und Harz imprägnirten *Kindermumie* erfahren. Als ich ſie vor drey Jahren bekam, waren hin und wieder kleine mit Wurmmehl angefüllte Löcher zu ſehen. Dies bewog mich, ſie eine geraume Zeit in Weingeiſt zu legen, und wieder zu trocknen. Deſſen ohnerachtet zeigen ſich bis jetzt noch immer kleine weiſse Larven darinn, die ſie durchlöchern. Das Wachs muſs vorzüglich die Nahrung der Larven ſeyn. Ich kann aber nicht ſagen, ob es dieſelbe Art mit denen in den Bienenſtöcken ſey, weil ich ſie nicht zur Verwandlung bringen können.

**) *Nicht abgebildet.*

Aequalis *veſtivorae*, at paulo minor.

Scop. Ent. carn. p. 233. no. 586. Phal. *Faſciana.*

Alae anticae ſupra fuſco glaucoque variae; *faſcia* lata poſtica *albida.*

Habitat in *Pomis*, quorum folia convolvit.

Long. Lin. 4. *Lat.* 2⅓.

Mülleri (Otto Frid.) Faun. Fridr. p. 55. no. 471. Ph. T. *faſciana. Nom. Linn.*

— Zool. Dan. Pr. p. 130. no. 1494. Nom. *Linn.*

284. *Uncana*, der *Klauenflügel.*

Müller l. c. p. 723. no. 284. *Klauenflügel.*

Wiener Schmett. p. 91. Y. *Afterſpannraupen*, Larvae Pſeudogeometrae; Blendende *Eulen*, Ph. Noct. *Submetallicae:* n. 4. *Unbekannte* Raupe; *Braunblanke weißgezeichnete Eule;* N. *Unca.* Ph. Geom. *Uncana* L.

Fabric. S. E. p. 646. no. 7. *Pyralis uncana.* Nom. *Linn.*

— Spec. Inſ. II. p. 277. no. 8.

Otto *Fabric.* Faun. Groenl. p. 195. no. 151. Nom. *Linn.*

Habitat inter frutices ad ripas rivulorum.

Mülleri Faun. Fridr. p. 52. no. 455.

— Zool. Dan. Pr. p. 130. no. 1495. Nom. *Linn.*

Clerk Phal. t. 3. f. 7.

285. *Praſinana*, der *Graßgrünwickler.* *)

Müller l. c. p. 723. no. 285. der *Erlenwickler.*

*) Die beyden vom *Linné* angeführten Schriftſteller bey dieſer Praſinana: *Réaum.* und *Degeer* gehören nicht zu derſelben, ſondern zu einer beſondern Art, welche *Füeſsl.* Bicolorana nennet. Wegen des *rothen Flügelrandes* aber möchte die *Geoffroyſche* II. no. 125. wohl die wahre Praſinana L. ſeyn.

Füeßlins Verz. ſchweiz. Inſ. p. 41. no. 797. Ph. *Praſinana.* Bey uns ſelten auf *Eichen.*

Röſels Inſektenbel. IV. p. 252. t. 22. die zu der NV. 2ten Kl. gehörige ſchöne gelblichtgrüne Büchenraupe. *)

Maders (Kleem.) Raupenkal. p. 94. no. 271. der *Erlenwickler.*

Wiener Schmett. p. 125. A. *Grüne* Blattwickler, Ph. Tortr. *Virides:* no. 2. *Hageeichenwicklerraupe* (Querc. Rob.); *Hageeichenwickler.* T. *Praſin.* L.

Gleditſch Forſtw. I. p. 557. no. 13. Ph. Tortr. *praſinana*, das *grüne Blatt*, der *grüne Blattwickler.* p. 656. no. 44. der *gelbgrüne weißpunktirte Blattwickler.*

Bekm. Ep. S. Linn. p. 167. no. 285. Ph. T. *praſinana.* Nom. *Linn.*

Geoffr. Inſ. II. p. 172. no. 125. *Phalaena* Seticornis Spirilinguis; alis deflexis viridibus; faſcia duplici transverſa ſaturatiore. **)

La *Phalène verte ondée.*

Long. 7 Lign.

Fabric. S. E. p. 645. no. 3. *Pyralis praſinana.* ***)

Variat antennis pedibusque albis et fulvis.

— Ejusd. *Species Inſectorum* I. p. 276. no. 5. Pyralis *Fagana.*

Alis

*) Die *Röſelſche* IV. t. 22. iſt mit der t. 10. nicht einerley, ſondern die *letztere* iſt die *Bicolorana* des *Füeſsl. Réaum.* und *Degeer.*

**) Ses Ailes ſuperieures ſont vertes, bordées *d'un peu de rouge* et nuancées de *trois bandes* presque transverſes d' un vert plus foncé.

***) *Röſel* IV. t. 10. wie auch Réaum. und Degeer gehören nicht hieher.

Alis viridibus, ſtrigis *tribus* obliquis albis; antennis pedibusque fulvis.

Larva viridis, linea laterali flava, cauda bifida.

Pupa intra folliculum, gibboſum, ferrugineum.

Müllери Faun. Fridr. p. 52. no. 456. Ph. T. *praſinana.*

— Zool. Dan. Pr. p. 130. no. 1496. Ph. T. *praſinana.* Nom. *Linn.*

286. *Viridana*, der *Grünwickler.* *)

Müller l. c. p. 723. no. 286. der *Grünwickler.*

Füeßl. ſchweiz. Inſ. p. 41. no. 799. Ph. *Viridana.* Sehr häufig auf *Eichen.*

— Magaz. der Entomol. II. p. 38. Ph. *Viridana.* Die Raupen des Chorherrn *Meyer* hatten alle auf dem achten Abſatz braune Flecke.

Röſels Inſektenbel. I. NV. 4 Kl. p. 5. t. 1. der in den Eichenblättern wohnende *grüne Blattwickler* mit kleinen ſchwarzen Punkten.

Maders (Kleem.) Raupenkal. p. 18. no. 29. der *Grünwickler.*

Wiener Schmett. p. 125. A. *Grüne* Blattwickler: no. 3. *Kahneichenwickelraupe* (Querc. Rob.); *Kahneichenwickler.* T. *Viridana* L.

Gleditſch Forſtwiſſ. I. p. 656. no. 45. der *ganz grüne Blattwickler ſonder Flecke*, II. p. 752. no. 78.

Leske Anfangsgr. der N. G. I. p. 463. E. *Blattwickler:* no. 22. der *ganz grüne Eichenwickler.*

Blumenbachs Handb. der N. G. p. 371. no. 17. *Viridana.*

*) Das Zitatum: *Friſch* III. n. 8, t. 5. das *Linné* hierbey angeführt hat, gehöret zu *Clorana.*

Oekonomiſche Nachrichten der patriotiſchen Geſellſch. in Schleſien I. p. 142. 143. 152.

Der *fahlgrüne Blattwickler* für die Obſtbäume der gefährlichſte; der minder gefährliche, doch immer ſchädliche, der *ſchwarze bunte und geſtreifte.*

Bekm. Epit. S. L. p. 167. no. 286. T. *Viridana.* Nom. *Linn.*

Syſt. Natur. du Regn. Anim. II. p. 160. no. 85. *Phaléne du Saule.*

Geoffr. Inſ. II. p. 171. no. 123.

Phalaena ſeticornis ſpirilinguis, humeris latis, antennis flaveſcentibus, alis dilute vireſcentibus.

La *Chappe verte. Long.* 4 lign.

Fabric. S. E. p. 646. no. 4. *Pyralis Viridana.* Nom. *Linn.*

Larva nuda, 16poda, viridis, nigro-punctata; pedibus poſticis flavis.

Pupa brunnea, poſtice ſtylo bifido.

— Ejusd. *Species Inſ.* II. p. 277. no. 6. P. *viridana.*

Mülleri Faun. Fridr. p. 52. no. 457. T. *Viridana.*

— Zool. Dan. Pr. p. 130. no. 1497. T. *Viridana.* Nom. *Linn.*

287. *Clorana*, der *Wollweidenwickler.*

Müller l. c. p. 724. no. 287. t. 22. f. 13. der *Weidenwickler.*

Füeßlins ſchweiz. Inſ. p. 41. no. 800. Ph. *Clorana.*

— Magaz. der Entomol. p. 38. Ph. *Clorana.* Nach des Chorherrn *Meyer* Bemerkung überwintern die *Puppen. Röſel* ſagt: nach 14 Tagen erſchienen

ſchienen die Vögel. Vermuthlich *zwo Generationen* im Jahr.

Friſch Inſ. III. p. 18. no. 8. 2 Pl. t. 5. die kleine *graue Weidenraupe* mit dem grünen *Zwiefalter* — mit ganz *grünen Oberflügeln* mit weiſsem Saum, und weiſsen *Unterflügeln* (alſo der *Röſelſche* I. NV. 4 Kl. t. 3.).

Röſels Inſektenbel. I. NV. 4 Kl. p. 8. t. 3. der *dicke grünlichgraue Blattwickler zwiſchen den Weidenblättern.*

Maders (Kleem.) Raupenkal. p. 60. no. 167. der *Weidenwickler.*

Wiener Schmett. p. 126. A. *Grüne* Blattwickler: no. 4. *Weidenwickelraupe* (Salic. Pentandr.); *Weidenwickler.* T. *Clorana* L.

Réaum. Inſ. II. Mém. 5. p. 236. t. 18. f. 6. 7. f. 4. *Coque en bateau.*

Fabric. S. E. p. 646. no. 5. *Pyralis Clorana.* Nom. *Linn. Spec. Inſ.* II. p. 277. no. 7.

Müller Faun. Fridr. p. 52. no. 458. T. *Clorana.*

— Zool. Dan. Pr. p. 130. no. 1498. T. *Clorana.* Nom. *Linn.*

Degeer Inſ. Tom. II. P. I. p. 475. no. 8. t. 10. f. 5-9.

Phaléne chappe verte à bordure blanche.

Phaléne à antennes filiformes à trompe, à ailes larges en toit vertes en deſſus bordées de blanc, & blanches en deſſous.

— *Ueberſ.* 2 B. 1 Th. p. 350. no. 8. t. 10. f. 5 - 9. die *grüne weiſsgerändelte Mantelphaläne.*

288. *Litterana*, der *Buchſtabenflügel.* *)

Müller l. c. p. 724. no. 288. der *Buchſtabenflügel.*

*) *Nicht abgebildet.*

Füeßl. ſchweiz. Inſ. p. 41. no. 801. Ph. *Litterana.*
Gleditſch Forſtwiſſ. II. p. 753. no. 77. T. *litterana*, der *dunkelgrüne Blattwickler mit ſchwarzen Zeichnungen.*
Der *Wiener Nachtrag* p. 317. Tortrices. A. Grüne Wickler: no. 5. *Unbekannte Raupe; hochgrüner ſchwarz gezeichneter Wickler.* T. *Litterana* L.
Fabric. S. E. p. 646. no. 6. *Pyralis Litterana.*
— Spec. Inſ. II. p. 284. no. 51.

289. *Zoegana*, der *Roſtpunkt.*

Müller l. c. p. 724. no. 289. der *Wechſelpunkt.*
Füeßl. ſchweiz. Inſ. p. 41. no. 802. Ph. *Zoegana.* Bey uns *ſelten.*
Wiener Schmett. p. 127. C. *Gelbe Blattwickler:* no. 4. *Unbekannte* Raupe; *ſtrohgelber Wickler mit einem braunen Winkelſtrich.*
Fabric. S. E. p. 648. no. 18. *Pyralis Zoegana.* Alis flavis; *puncto medio lituraque poſtica ferrugineis.*
— Spec. Inſ. II. p. 280. no. 25.
Clerk Phal. t. 4. f. 4.

290. *Hamana*, der *Hakenflügel.*

Müller l. c. p. 724. no. 290. der *Hakenflügel.*
Gleditſch Forſtwiſſ. II. p. 754. no. 79. T. *hamana.* Der *Blattwickler* mit gelben Oberflügeln, die mit einem braunrothen Punkte und einer ſolchen hakenförmigen Zeichnung verſehen ſind.
Wiener Schmett. p. 127. C. *Gelbe* Blattwickler: no. 3. *Unbekannte* Raupe; *zitrongelber Wickler* mit einem braunen *Wiederhaken.* T. *Hamana.* L.
Fabric. S. E. p. 648. n. 18. *β.* Pyr. *Hamana.* Nom. *Linn.*
(als eine *Abänderung* der Zoegana.)
Clerk

Clerk Phal. t. 4. f. 47.
Mülleri Zool. Dan. Pr. p. 130. no. 1500. T. *Hamana.* Nom. *Linn.*

291. *Kaekeritziana*, der *Upſaliſche Einpunkt.* *)

Müller l. c. p. 725. no. 291. der *Einpunkt.*
Wiener Schmett. p. 177. C. *Gelbe* Blattwickler: no. 1. *Unbekannte* Raupe; *bleichgelber Wickler mit einem Mittelpunkt.* T. *Kaekeritziana* L.

292. *Oporana*, der *Netzförmige Wickler.*

Müller l. c. p. 725. no. 292. das *Netz.*
Gleditſch Forſtwiſſ. II. p. 788. no. 15. T. *Oporana*, die *rothgraue gefleckte und gegitterte Aepfelbaummotte.*
Wiener Schmetterl. p. 128. D. *Braune Blattwickler*, T. *Ferrugineae:* no. 2. *Zwetſchenwickelraupe* (Pruni domeſt.); *Zwetſchenwickler.* T. *Oporana* L.
Glaſers phyſik. ökon. Abh. von den ſchädlichen Raupen der Obſtbäume. (neue Ausg. 1780.) p. 35. t. 3. f. 5. 6. 7. **)
Fabric. S. E. p. 651. no. 33. *Pyralis Oporana.* Nom. *Linn.*
— Spec. Inſ. II. p. 283. no. 43.
Geoffr. Inſ. II. p. 170. no. 119.

*) *Nicht abgebildet.*

**) Da dieſe Wickler ſo ſehr in der Farbe ändern, und gelblich, bräunlich, grünlich und röthlich gefunden werden; ſo trage ich kein Bedenken, die *Glaſerſchen* Wickler hieher zu ziehen. Obgleich der *Röſelſche* I. NV. 4 Kl. t. 2. vom *Geoffroy* hieher gerechnet wird; ſo wollte ich ihn doch lieber mit andern Schriftſtellern für die folgende Roſana L. halten.

Phalaena feticornis ſpirilinguis, humeris latis, aurato-flaveſcens, alarum faſcia transverſa, maculaque duplici fuſca.

La *Chappe à bande & tache brune. Long.* 4 lign.

Mülleri Zool. Dan. Pr. p. 130. no. 1499. T. *Oporana.* Nom. *Linn.*

293. *Roſana*, der *Roſenwickler.*

Müller l. c. p. 725. no. 293. der *Roſenwickler.*

Röſels Inſektenbel. I. NV. 4 Kl. t. 2. p. 7. der *ſchwarze Blattwickler mit weißen Punkten auf den Kirſchbäumen.* *)

Maders (Kleem.) Raupenkal. p. 18. no. 30. der *Roſenwickler.*

Füeßl. Magaz. der Entomol. II. p. 38. T. *Roſana* (mit dem Röſelſchen Zitato I. NV. 4. t. 2.). Die *Raupe* auch in *Haſelblättern* und *Eichenblättern.* Sind den *Schlupfweſpen* unterworfen.

Gleditſch Forſtwiſſ. II. p. 869. no. 1. T. *Roſana*, die *kleine Blattwicklermotte des Roſenſtrauchs.*

— p. 1033. no. 4. T. *Roſana*, die *Roſenblattwicklermotte mit der grauen Querbinde in den Oberflügeln.*

Blankaart Schaupl. der Raupen t. 8. f. E F G H.

Wiener Schmett. p. 128. C. *Gelbe* Blattwickler: no. 10. Heckenroſenwickelraupe (Roſae caninae); *Heckenroſenwickler.*

Syſt. Nat. du Regn. Anim. II. p. 161. no. 86. Phaléne *de la Roſe.*

Aft.

*) Aus dieſem Röſelſchen macht der Staatsr. *Müller* Faun. Fr. p. 58 n. 523. eine neue Art von *Motten:* Ph. *Tinea* Hebenſtreitella:

Alis ſubfuſcis, priorum maculis tribus obſcuris umbraticis,

Act. Upſal. 1736. p. 25. no. 77. Papilio alis depreſſis breviſſimis teſtaceis.

Fabric. S. E. p. 647. no. 9. *Pyralis Roſana.* Nom. *Linn.*

— *Spec. Inſect.* II. p. 278. no. 11.

Réaum. Inſ. II. t. 15. f. 5-9.

Degeer Inſ. I. Mém. 13. p. 403. t. 27. f. 4. 8. 11. 12. 14. *Ueberſ.* I. 3 Qu. S. 17.

— Tom. II. P. I. p. 468. no. 1.

Phaléne à antennes filiformes à trompe; à ailes larges brunes; à taches & lignes transverſes obſcures, dont les inferieures ſont noirâtres en deſſus, à barbillons courbés.

Phaléne chappe brune à réſeau des arbres fruitiers.

— *Ueberſ.* II B. I Th. p. 345. no. 1. der *netzförmige Braunmantel auf den Obſtbäumen.*

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 130. no. 1503. T. *Roſana.* Nom. *Linn.*

294. *Gnomana*, die *Querſtreife.*

Müller l. c. p. 725. no. 294. der *Schiefband.*

Wiener Schmett. p. 127. C. *Gelbe* Blattwickler: no. 7. Unbekannte Raupe; *blaßgoldgelber Wickler mit rothbraunen Schrägſtreifen.*

Fabric. S. E. p. 651. no. 32. *Pyralis Gnomana.* Nom. *Linn.*

— Spec. Inſ. II. p. 285. no. 42.

Clerk Phal. t. 4. f. 13.

Geoffr. Inſ. II. p. 171. no. 121.

Phalaena ſeticornis ſpirilinguis, humeris latis, flava, *faſcia transverſa fuſca.*

La *Chappe brune à bande brune.*

Long. $2\frac{1}{2}$ lign.

Degeer

Degeer Inſ. Tom. II. P. I. p. 469. no. 3.

Phaléne à antennes filiformes à trompe, à ailes larges d'un jaune foncé à lignes obliques & nuances brunes.

Phaléne chappe jaune à bande brune du Poirier.

— *Ueberſ.* II B. I Th. p. 346. no. 3. der *Gelbmantel mit einer braunen Binde auf den Birnbäumen.*

295. *Xyloſteana*, der *Heckkirſchenwickler.*

Müller l. c. p. 725. no. 295. der *Kreuzträger.*

Neuer Schaupl. der Natur II B. p. 247. der *Kreuzträger.*

Wiener Schmett. p. 128. D. *Braune* Blattwickler, T. Ferrugineae: no. 4. *Heckenkirſchenwickelraupe* (Lonicerae Xyloſtei); *Heckkirſchenwickler.* T. *Xyloſteana* L.

Clerk Phal. t. 2. f. 6.

Fabric. S. E. p. 648. no. 14. *Pyralis Xyloſteana.* Alis anticis teſtaceis; faſcia fuſca.

— Spec. Inſect. II. p. 279. no. 19.

Mülleri Zool. Dan. Pr. p. 130. no. 1501. T. *Xyloſteana.* Nom. *Linn.*

296. *Arcuana*, der *Bogenwickler.*

Müller l. c. p. 726. no. 296. die *Bogenbinde.*

Wiener Schmett. p. 126. B. *Metalliſche* Blattwickler: no. 11. *Unbekannte* Raupe; *goldgelber Wickler mit einer ſchwarzen Makel und Silber.* T. *Arcuana* L.

Catholicon A. p. 456. T. *Arcuana.*

Fabric. S. E. p. 649. no. 22. *Pyralis Arcuana.*

Alis

Alis luteis; fasciis tribus *arcuatis* maculaque disci atra; punctis tribus argenteis — Lineolae tres argenteae ad basin alarum.

— Spec. Inf. II. p. 281. no. 31.

Clerk Phal. t. 10. f. 8.

Müllerí Faun. Fridr. p. 52. no. 461. T. *Arcuana.*

— Zool. Dan. Pr. p. 131. no. 1506. T. *Arcuana.* Nom. *Linn.*

297. *Avellana*, der *Haselwickler.*

Müller l. c. p. 726. no. 297. *Haselwickler.*

Gleditsch Forstwiss. I. p. 570. no. 9. T. *Avellana*, der *braune bandige Blattwickler der Haselstaude.*

Wiener Schmett. p. 127. C. *Gelbe* Blattwickler, T. Flavae: no. 8. *Haselstaudenwickelraupe* (Coryli Avellanae), *Haselstaudenwickler.* T. *Avellana* L.

Catholic. A. p. 631. T. *Avellana.*

Albin Inf. I. t. 95. f. g. h.

Fabric. S. E. p. 650. no. 25. *Pyralis Avellana.* Nom. *Linn.*

— Spec. Inf. II. p. 281. no. 34.

Müllerí Faun. Fridr. p. 52. no. 460. T. *Avellana.*

— Zool. Dan. Pr. p. 130. no. 1505. T. *Avellana.* Nom. *Linn.*

Syst. Nat. du Regn. Anim. II. p. 158. no. 72. Phal. *des Jardins.*

298. *Ameriana*, der *Gemeinstrich.*

Müller l. c. p. 726. no. 298. der *Gemeinstrich.*

Füeßl. schweiz. Inf. p. 41. no. 803. T. *Ameriana.* Auf den *Weiden.*

Gleditsch Forstwiss. II. p. 754. no. 80. T. *Ameriana*, der *eigentliche Weidenblattwickler.*

Wiener

Wiener Schmett. p. 128. C. *Gelbe* Blattwickler: no. 11. *Sahlweidenwickelraupe* (Sal. Capreae), *Sahlweidenwickler.* T. *Ameriana* L.

Fabric. S. E. p. 647. no. 11. *Pyralis Ameriana.* Nom. *Linn.*

— Spec. Inſ. II. p. 278. no. 15.

299. *Piceana*, der *Fichtenwickler.*

Müller l. c. p. 726. no. 299. der *Pechflügel.*

Gleditſch Forſtwiſſ. I. p. 503. no. 7. T. *Piceana*, der *Nadelwickler.*

Clerk Phal. t. 2. f. 9.

Mülleri Faun. Fr. p. 52. no. 459. T. *Piceana.*

— Zool. Dan. Pr. p. 130. no. 1502. T. *Piceana.* Nom. *Linn.*

300. *Miniſtrana*, der *Roſtſtrich.*

Müller l. c. p. 726. no. 300. der *Rothrand.*

Wiener Schmett. p. 128. D. *Braune* Blattwickler: no. 5. *Unbekannte* Raupe; *Zimmetbrauner goldgelb gemiſchter Wickler.* T. *Miniſtrana.*

Syſt. Nat. du Regn. Anim. II. p. 159. no. 75. Phal. *de Jardin.*

Fabric. S. E. p. 648. no. 15. *Pyralis Miniſtrana.* Nom. *Linn.*

— Spec. Inſect. II. p. 279. no. 20.

Clerk Phal. t. 2. f. 12.

301. *Lecheana*, der *I L Wickler.*

Müller l. c. p. 727. no. 301. das I L.

Gleditſch Forſtwiſſ. II. p. 822. no. 17. die *preußiſche Blattwicklermotte.*

Pontoppid. N. H. von Dännem. p. 223. t. 17. Ph. Tortr. *Lecheana.*

Wiener Schmett. p. 126. B. *Metalliſche* Blattwickler: no. 3.

no. 3. *Ahornwickelraupe* (Aceris campeſtris), *Ahornwickler.* T. *Lecheana* L.

Clerk Phal. t. 10. f. 2.

Fabric. S. E. p. 649. no. 23. *Pyralis Lecheana.* Nom. *Linn.*

— Spec. Inſ. II. p. 281. no. 32.

Mülleri Faun. Fridr. p. 52. no. 462. T. *Lecheana.*

— Zool. Dan. Pr. p. 131. no. 1507. T. *Lecheana.* Nom. *Linn.*

302. *Branderiana.*

β) *Fuſcana*, der *Braunwickler.*

Müller l. c. p. 727. no. 302. t. 22. f. 14. der *Braunwickler.*

Gleditſch Forſtwiſſ. II. p. 754. no. 76. T. *Fuſcana*, der *braune Blattwickler.*

Fabric. S. E. p. 648. no. 13. *Pyralis fuſcana.* Nom. *Linn.*

Clerk Phal. t. 4. f. 7.

Mülleri Zool. Dan. Pr. p. 130. no. 1504. T. *fuſcana.* Nom. *Linn.*

303. *Chriſtiernana*, der *blutadrichte Wickler.*

Müller l. c. p. 727. no. 303. die *Blutader.*

Füeßl. ſchweiz. Inſ. p. 41. no. 805. Phal. *Chriſtiernana.*

Wien. Schmett. p. 128. C. *Gelbe* Blattwickler: no. 9. *Unbekannte* Raupe; *hochgelber Wickler mit roſenrothen Gitterſtreifen.*

Schäff. Icon. t. 145. f. 4.

Fabric. S. E. p. 649. no. 24. *Pyralis Chriſtiernana.* Nom. *Linn.*

— Spec. Inſ. II. p. 281. no. 33.

304. *Forskáleana*, das *gelbe Netz.*

Mül-

Müller l. c. p. 727. no. 304. das *gelbe Netz.*
Wiener Schmett. p. 127. C. *Gelbe Blattwickler:* no. 6. *Roſenwickelraupe* (Roſae Centifoliae); *Roſenwickler.* T. *Forſkaleana* L.
Fabric. S. E. p. 652. no. 41. *Pyralis Forſkaleana.* Nom. *Linn.*
— Spec. Inſ. II. p. 285. no. 57.
Clerk Phal. t. 10. f. 2. 6.
Müller i Faun. Fr. p. 52. no. 463. T. *Forſkaleana.*
— Zool. Dan. Pr. p. 131. no. 1508. T. *Forſkaleana.* Nom. *Linn.*

305. *Loeflingiana*, das *Doppelkreuz.*

Müller l. c. p. 727. no. 305. das *Doppelkreuz.*
Fabric. S. E. p. 652. no. 42. *Pyralis Loeflingiana.* Nom. *Linn.*
— Spec. Inſ. II. p. 285. no. 58.
Clerk Phal. t. 10. f. 6.

306. *Hartmanniana*, der *Doppelſtrich.* *)

Müller l. c. p. 728. no. 306. der *Doppelſtrich.*
Faun. Suec. ed. 2. no. 1322.

307. *Bergmanniana*, das *vierfache Silberband.*

Müller l. c. p. 728. no. 307. das *Silberband.*
Füeſsl. ſchweiz. Inſ. p. 41. no. 806. Phal. *Bergmanniana. Selten.*
Wiener Schmett. p. 126. B. *Metalliſche* Blattwickler, no. 5. *Unbekannte* Raupe, *gelber Wickler mit Silberſtrichen.* T. *Bergmanniana* L.
Clerk Phal. t. 10. f. 5.
Fabric. S. E. p. 652. no. 43. *Pyralis Bergmanniana.* Nom. *Linn.*
— Spec. Inſ. II. p. 285. no. 59.

Scop.

*) *Nicht abgebildet.*

Scop. Entom. carn. p. 232. no. 584. Ph. *Bergmanniana.*

Alae anticae flavae, nodulis binis, fasciisque argenteis, margine fusco-ferrugineo.

Long. lin. $3\frac{1}{2}$ *Lat.* 2.

Müller Faun. Fridr. p. 53. no. 465. T. *Bergmanniana.*

— Zool. Dan. Pr. p. 131. no. 1509. T. *Bergmanniana.* Nom. *Linn.*

Degeer Inf. II. P. I. p. 469. no. 4.

Phalène à antennes filiformes à trompe, à ailes larges d'un jaune orangé luisant avec quatre rayes transverses d'un brun argenté.

Phalène Chappe jaune à rayes argentées.

— *Uebers.* II B. I Th. p. 346. no. 4. der *Gelbmantel mit Silberstreifen.*

308. *Holmiana*, das *silberne Dreyeck.*

Müller l. c. p. 728. no. 308. das *silberne Dreyeck.*

Füesl. schweiz. Inf. p. 41. no. 807. Ph. *Holmiana.*

Gleditsch Forstwiss. II. p. 789. no. 17. T. *Holmiana*, die *kleine gelbrothe Obstmotte mit dem dreyeckigen silberfarbigen Rundflecke.*

Wien. Schmett. p. 127. B. *Metallische* Blattwickler: no. 16. Birnwickelraupe (Pyri comm.); *Birnwickler.* T. *Holmiana* L.

Fabric. S. E. p. 650. no. 31. *Pyralis Holmiana.* Nom. *Linn.*

— Spec. Inf. II. p. 283. no. 41.

Clerk Phal. t. 10. f. 7.

Syst. Nat. du Regn. Anim. II. p. 158. no. 73. Phalène des *Pommiers.*

Mülleri Faun. Fridr. p. 53. no. 466. T. *Holmiana.*

Müllerí Zool. Dan. Pr. p. 131. no. 1510. T. *Holmiana.* Nom. *Linn.*

309. *Rolandriana*, der *Krummſtrich.* *)

Müller l. c. p. 728. no. 309. der *Krummſtrich.*

Wiener Schmett. p. 128. C. *Gelbe* Blattwickler: no. 12. *Weißnießwurzwickelraupe* (Veratri albi); *Weißnießwurzwickler.* T. *Rolandriana* L.

Müllerí Faun. Fridr. p. 53. no. 467. T. *Rolandriana.*

— Zool. Dan. Pr. p. 131. no. 1511. T. *Rolandriana.* Nom. *Linn.*

310. *Solandriana*, der *Birkenwickler.*

Müller l. c. p. 728. no. 310. der *Birkenwickler.*

Gleditſch Forſtwiſſ. I. p. 551. no. 10. T. *Solandriana*, der *Birkenblattwickler.*

Scop. Entom. carn. p. 234. no. 587. T. *Solandriana.*

Macula media, communis, ovata, alterius coloris; alae anticae margo craſſior apicem verſus fuſco-punctatus.

Long. Lin. 5. *Lat.* $2\frac{1}{2}$.

Fabric. S. E. p. 648. no. 17. *Pyralis Solandriana.*

Alis pallidis, albo-ſubfaſciatis, macula communi dorſali, ferruginea.

— Spec. Inſ. II. p. 280. no. 23.

Müllerí Zool. Dan. Pr. p. 131. no. 1513. T. *Solandriana.* Nom. *Linn.*

Degeer Inſ. I. t. 28. f. 29. 30.

— Ueberſ. 3 Quart. p. 20.

— — II. Part. I. p. 485. no. 3.

Phalène à antennes filiformes, à trompe, à ailes

*) *Nicht abgebildet.*

ailes pendantes d'un brun clair à tache triangulaire blanche sur la femelle & brune sur le male au bord interieur.

Phaléne brune à lozange blanche du Bouleau.

— *Ueberſ.* II B. I Th. p. 358. no. 3. *die braune Birkenphaläne mit dem weiſsen rautenförmigen Fleck.*

311. *Haſtiana*, die *weiße Schrägbinde.*

Müller l. c. p. 729. no. 311. die *Krummbinde.*

Gleditſch Forſtwiſſ. II. p. 755. no. 82. T. *Haſtiana*, die *blaugraue Weidenmotte mit der ſchräglaufenden weiſsen Binde.*

Wiener Schmett. p. 126. B. *Metalliſche* Blattwickler: no. 4. *Bruchweidenwickelraupe* (Salicis fragilis); *Bruchweidenwickler.* T. *Haſtiana* L.

Clerk Phal. t. 2. f. 7.

Fabric. S. E. p. 650. no. 26. *Pyralis Haſtiana.* Nom. *Linn.*

— Spec. Inſ. II. p. 282. no. 36.

312. *Wahlbomiana*, das *Wolkenband.* *)

Müller l. c. p. 729. no. 312. das *Wolkenband.*

Wiener Schmett. p. 131. E. *Graue* Blattwickler: no. 20. *Unbekannte* Raupe, *grauer Wickler mit dunklen Flecken.* T. *Wahlbomiana* L.

Syſtem. Nat. du Regn. Anim. II. p. 158. no. 74. *Phaléne* de la grandeur d'une petite Mouche, qu'on trouve quelquefois dans les Jardins.

Mülleri Faun. Fridr. p. 53. no. 468. T. *Wahlbomiana.*

— Zool. Dan. Pr. p. 131. no. 1512. T. *Wahlbomiana.* Nom. *Linn.*

*) *Nicht abgebildet.*

313. *Lediana*, die *Silberſchuppe.*

Müller l. c. p. 729. no. 313. die *Silberſchuppe.*

Wiener Schmett. p. 127. B. *Metalliſche* Blattwickler: no. 13. *Porſchwickelraupe* (Ledi paluſtris); *Porſchwickler.* T. *Lediana* L.

Fabric. S. E. p. 650. no. 27. *Pyralis Lediana.* Nom. *Linn.*

— Spec. Inſ. II. p. 282. no. 37.

Clerk Phal. t. 10. f. 12.

314. *Alſtroemeriana*, der *Seitenroſtfleck.*

Müller l. c. p. 729. no. 314. der *Braunfleck.*

Wiener Schmett. p. 130. E. *Graue* Blattwickler: no. 18. *Unbekannte* Raupe; *weiſsgrauer Wickler mit Purpurflecken.* T. *Alſtroemeriana* L.

Sulzers Geſch. der Inſ. p. 162. t. 23. f. 5. der *Braunfleck.* T. *Alſtroemeriana* L.

Clerk Phal. t. 10. f. 1.

Fabric. S. E. p. 653. no. 44. *Pyralis Alſtroemeriana.* Nom. *Linn.*

— Spec. Inſ. II. p. 286. no. 61.

Mülleri Faun. Fridr. p. 53. no. 469. T. *Alſtroemeriana.*

— Zool. Dan. Pr. p. 131. no. 1514. T. *Alſtroemeriana.* Nom. *Linn.*

315. *Schalleriana*, die *Roſtflügelſpitze.* *)

Müller l. c. p. 729. no. 315. der *Roſtfleck.*

Fabric. S. E. p. 650. no. 28. *Pyralis Schalleriana.*

Alis canis; macula marginali ferruginea.

Puncta aliquot muricata ad baſin alae anticae.

— Spec. Inſ. II. p. 282. no. 38.

316. *Schrae-*

*) *Nicht abgebildet.*

318. *Schraeberiana*, das *weiſse Randdreyeck.* *)

Müller l. c. p. 729. no. 316. das *weiſse Dreyeck.*
Fabric. S. E. p. 650. no. 30. *Pyralis Schreberiana.* Nom. *Linn.*
— Spec. Inſ. II. p. 282. no. 40.

317. *Logiana*, der *Kohlenſtaub.*

Müller l. c. p. 730. no. 317. der *Kohlenſtaub.*
Wiener Schmett. p. 130. E. *Graue* Blattwickler: no. 4. *Unbekannte* Raupe; *graulichweiſser Blattwickler mit düſterer Auſsenrandmakel.* T. *Logiana* L.
Fabric. S. E. p. 651. no. 34. *Pyralis Logiana.* Nom. *Linn.*
— Spec. Inſ. II. p. 283. no. 45.
Clerk Phal. t. 10. f. 3.
Müller Faun. Fridr. p. 53. no. 470. T. *Logiana.*
— Zool. Dan. Pr. p. 130. no. 1515. T. *Logiana.* Nom. *Linn.*

318. *Gouana*, der *Schneeflügel.* **)

Müller l. c. p. 730. no. 318. das *Braunfutter.*
Fabric. S. E. p. 651. no. 35. *Pyralis Gouana.* Nom. *Linn.*
— Spec. Inſ. II. p. 283. no. 46.

319. *Brunnichana*, der *Rhombus.* ***)

Müller l. c. p. 730. no. 319. das *Viereck.*
Wiener Schmett. p. 132. F. *Düſtere* Blattwickler: no. 2. *Unbekannte* Raupe; *ſchwärzlichter Wickler mit weiſslichter Gemeinmakel.* T. *Brunnichana* L.

*) *Nicht abgebildet.* **) *Nicht abgebildet.*

***) *Nicht abgebildet.*

Fabric. S. E. p. 649. no. 21. *Pyralis Brunnichana.* Nom. *Linn.*
— Spec. Inf. II. p. 281. no. 30.

320. *Pariana*, die *bleyfahle Binde.*

Müller l. c. p. 730. no. 320. die *Bleybinde.*
Wiener Schmett. p. 132. F. *Düstere* Blattwickler: no. 8. *Unbekannte* Raupe; *düsterer Wickler mit gezähnten Oberflügeln.* T. *Pariana* L.
Clerk Phal. t. 10. f. 9.

321. *Moderiana*, der *braune Randfleck.* *)

Müller l. c. p. 730. no. 321. der *Randfleck.*
Linn. S. N. ed. 10. p. 823. Phal. *Rurinana.*
Fabric. S. E. p. 650. no. 29. *Pyralis Moderiana.* Nom. *Linn.*
— Spec. Inf. II. p. 282. no. 39.
Mülleri Zool. Dan. Pr. p. 130. no. 1516. T. *Moderiana.* Nom. *Linn.*

322. *Uddmanniana*, der *Querfleck.* **)

Müller l. c. p. 730. no. 322. der *Querfleck.*
Wiener Schmett. p. 130. E. *Graue* Blattwickler: no. 8. *Himbeerwickelraupe* (Rubi idaei); *Himbeerwickler.* T. *Uddmanniana* L.
Fabric. S. E. p. 648. no. 16. *Pyralis Uddmanniana.* Nom. *Linn.*
— Spec. Inf. II. p. 279. no. 22.

323. *Cruciana*, der *Bogenfleck.* ***)

Müller l. c. p. 731. no. 323. der *Bogenfleck.*

Fabric.

*) *Nicht abgebildet.* **) *Nicht abgebildet.*

***) *Nicht abgebildet.*

Fabric. S. E. p. 649. no. 19. *Pyralis Cruciana.* Nom. *Linn.*
— Spec. Inf. II. p. 280. no. 26.

324. *Fabriciana*, das *Punktpaar.**)

Müller l. c. p. 731. no. 324. das *Punktpaar.*
Fabric. S. E. p. 653. no. 45. *Pyralis Fabriciana.* Nom. *Linn.*
— Spec. Inf. II. p. 286. no. 62.

325. *Pupillana*, das *Silberauge.***)

Müller l. c. p. 731. no. 325. das *Silberauge.*

326. *Heracliana*, der *Kronenwickler.*

Müller l. c. p. 731. no. 326. der *Kronenwickler.*
Fabric. S. E. p. 655. no. 56. *Pyralis Heracliana.*
Alis depreſſis, griſeis; anticis ſubtus fuſcis.
— Spec. Inf. II. p. 288. no. 77.
Schaeff. Monogr. 1758. t. 2. f. 3. 4.
Müller Zool. Dan. Pr. p. 131. no. 1517. T. *Heracliana.* Nom. *Linn.*
Degeer Inſ. I. t. 29. f. 6. 7.
— II. Part. I. p. 407. no. 5.
Phaléne à antennes filiformes, à trompe, à ailes croiſées avec pluſieurs petits traits noirs, dont les barbillons en cornes & les pattes poſterieures ſont très-velues.
Phaléne à ailes croiſées de la Berce.
— *Ueberſ.* II B. I Th. p. 294. no. 5. die *Bärenklauphaläne mit gekreuzten Flügeln.*

Unabgebildete Linnéiſche Blattwickler.
1. *Faſciana.*
2. *Literana.*
3. *Hartmanniana.*

*) *Nicht abgebildet.* **) *Nicht abgebildet.*

4. *Rolandriana.*
5. *Wahlbomiana.*
6. *Schalleriana.*
7. *Schraeberiana.*
8. *Gouana.*
9. *Brunnichana.*
10. *Moderiana.*
11. *Uddmanniana.*
12. *Cruciana.*
13. *Fabriciana.*
14. *Pupillana.*

Neue Arten von Blattwicklern.

1. Phal. Tortr. *Populana*, der *Pappelwickler.*

Linn. Faun. Suec. ed. 2. Sepoſ. p. 550. no. 2296.
Phalaena ſeticornis ſpirilinguis; corniculis duobus ſubulatis recurvis, alis incumbentibus, nigro cinereoque nebuloſis.
Habitat in truncis *Populi tremulae* cujus foliis Larva victitat, eaque convolvit.

Syſt. Natur. du Regn. Anim. II. p. 159. no. 79. *Phalène ſur les troncs du Peuplier.*

2. *Bankiana*, der *Eulenförmige Wickler.*

Fabric. S. E. p. 644. no. 1. *Pyralis Bankiana.*
Alis albis, macula communi fuſca.
Habitat in *Anglia.* Statura fere *Noctuae.*

3. *Hattorfiana*, der *Hattorfwickler.*

Fabric. S. E. p. 647. no. 8. P. *Hattorfiana.*
Alis fuſcis; ſtrigis cinereis, ſeſquitertiis.
Habitat in *Germania.*

— *Spec. Inſ.* II. p. 278. no. 10.

4. *De-*

4. *Decuſſana*, der *Leipziger Wickler.*

Fabric. S. E. p. 647. no. 10. P. *Decuſſana.*
Alis cinereo, nigro argenteoque tenuiſſime faſciatis; apice macula ſubocellari cinerea.
Habitat *Lipſiae.*
— Spec. Inſ. II. p. 278. no. 14.

5. *Maculana*, der *vierfleckige Wickler.*

Fabric. S. E. p. 647. no. 12. P. *Maculana.*
Alis anticis fuſcis; maculis quatuor dorſalibus atro-ferrugineis.
In *Sueciae* Nemoribus.
— Spec. Inſ. II. p. 279. no. 16.

6. *Fuſcana*, der *Braunling.*

Fabric. S. E. p. 648. no. 13. P. *Fuſcana.*
Alis anticis fuſcis, immaculatis.
— Spec. Inſ. II. p. 279. no. 17.
Linn. Faun. Suec. ed. 2. p. 345. no. 1321. Ph. T. *fuſcana.*
Alis ſuperioribus fuſcis.
In *Nemoribus.*
Clerk Phal. t. 2. f. 1. Ph. *Fuſcana.*

7. *Laetana*, der *Schwarzpunkt.*

Fabric. S. E. p. 649. no. 20.
Alis anticis fuſceſcentibus; margine exteriori baſeos niveo, nigro punctato.
In *Sueciae* Nemoribus.
— Spec. Inſ. II. p. 281. no. 29.

8. *Squamana*, der *Schuppenwickler.*

Fabric. S. E. p. 651. no. 36.
Alis vireſcentibus, ſcabris.
In *Anglia.*

Fabric. Spec. Inſ. II. p. 284. no. 50.

9. *Emargana*, der *Dickrand.*

Fabric. S. E. p. 651. no. 37.

Alis ſubcaudatis, flavis, fuſco-reticulatis, faſciaque lata fuſca, margine craſſiori emarginato.

In *Anglia.*

— Spec. Inſ. II. p. 284. no. 52.

10. *Caudana*, der *Schwanzwickler.*

Fabric. S. E. p. 651. no. 38.

Alis *ſubcaudatis* griſeis; margine interiore fulvo; exteriore emarginato.

In *Anglia.*

— Spec. Inſ. II. p. 284. no. 53.

11. *Quercana*, der *ſächſiſche Eichenwickler.*

Fabric. S. E. p. 652. no. 39.

Alis anticis flavis; maculis duabus coſtalibus ſulphureis.

In *Saxoniae* Quercu.

Wiener Schmett. p. 128. C. *Gelbe Blattwickler:* no. 13. T. *Fagana*, *Büchenwickler.* Tab. I. a. f. 6. b. f. 6.

12. *Ocellana*, der *geäugte Wickler.*

Fabric. S. E. p. 652. no. 40.

Alis cinereis; litura media ſanguinea; puncto albido.

In *Anglia.*

— Spec. Inſ. II. p. 285. no. 56.

13. *Conwagana*, der *Silberpunkt.*

Fabric. S. E. p. 653. no. 46.

Alis

Alis ferrugineo-fuscis, argenteo-punctatis maculaque dorsali flavicante.

In *Angliae* Nemoribus.

Fabric. Spec. Inf. II. p. 286. no. 63.

14. *Aurana*, der *Goldfleck.*

Fabric. S. E. p. 653. no. 48.

Alis fuscis; maculis duabus aureis.

In *Anglia.*

— Spec. Inf. II. p. 286. no. 66.

15. *Rivellana*, die *Spaltstreife.*

Fabric. S. E. p. 654. no. 50.

Alis fuscis; fasciis tribus cinereis; secunda introrsum bifida.

In *Sueciae* Nemoribus.

— Spec. Inf. II. p. 287. no. 69.

16. *Dorsana*, der *Rückenbogen.*

Fabric. S. E. p. 654. no. 52.

Alis fuscis, arcu dorsali albo apiceque strigis argenteis.

In *Lipsiae hortis.*

— Spec. Inf. II. p. 287. no. 71.

Geoffr. Inf. II. p. 189. no. 16.

Tinea alis nigris, superioribus macula quadrata alba, ex quatuor lineolis albis transversis composita.

La *Teigne à quarrure.*

Long. $2\frac{1}{2}$ Liga.

17. *Strigana*, der *Rost- und Silberfarbig gestreifte Wickler.*

Fabric. S. E. p. 654. no. 53.

Alis

Alis flaveſcentibus, apice ſtrigis ferrugineis argenteisque; puncto triplici atro.

In *Sueciae* Nemoribus.

— Spec. Inſ. II. p. 287. no. 72.

18. *Depreſſana*, der *Hangefluͤgel.*

Fabric. S. E. p. 655. no. 57.

Alis depreſſis, fuſcis, capite, thoraceque niveis.

Habitat in *Suecia.*

— Spec. Inſ. II. p. 289. no. 78.

19. *Koenigiana*, der *oſtindianiſche braungeſtäubte Wickler.*

Fabric. S. E. p. 653. no. 47.

Alis fulvis, apice nigris, fulvo-maculatis.

— Spec. Inſ. II. p. 286. no. 65.

20. *Leeana*, der *Bleywickler.*

Fabric. Gen. Inſ. c. *Mantiſſ.* p. 292. no. 7-8.

Pyralis alis plumbeis; lineolis tribus maculaque magna apicis ferrugineis.

— Spec. Inſ. II. p. 278. no. 9. *Pyralis Plumbana.* Habitat *Hamburgi.*

21. *Pallidana*, der *blaßgelbe Wickler.*

Fabric. Mantiſſ. p. 292. no. 9-10.

Alis pallide flavis; ſtrigis duabus obliquis ferrugineis.

— Spec. Inſ. II. p. 278. no. 12.

Habitat *Hamburgi.*

22. *Servana*, der *Zentralfleck.*

Fabric. Mantiſſ. p. 292. no. 15-16.

Alis

Alis anticis fuſceſcentibus; macula centrali fulva, baſi flavis.

— Spec. Inſ. II. p. 279. no. 21.
In *Germania.*

23. *Aſperana*, der *Rauhflügel.*

Fabric. Mantiſſ. p. 292. no. 35-36.
Alis anticis, baſi albis, apice fuſcis *ſcabris.*

— Spec. Inſ. II. p. 284. no. 48.
Habitat *Hamburgi.*

24. *Duplana*, der *Doppelpunkt.*

Fabric. Mant. p. 293. no. 35-36.
Alis anticis pallidis; punctis duobus approximatis baſeos nigris.

— Spec. Inſ. II. p. 284. no. 49.
Habitat *Kiliae.*

25. *Scheſtediana*, der *Schwarzflügel.*

Fabric. Mant. p. 293. no. 47-48.
Alis atris; macula magna communi, ſtrigis atomisque coeruleſcenti argenteis.

— Spec. Inſ. II. p. 286. no. 64.
Habitat *Kiliae* in Alnetis.

26. *Schulziana*, der *Silberpunkt.*

Fabric. Mant. p. 293. no. 49-50.
Alis teſtaceis faſciis punctisque argenteis, medioque litura atra.

— Spec. Inſ. II. p. 287. no. 68.
In *Germania.*

27. *Lundana*, die *Goldſpitze.*

Fabric. Mant. p. 294. no. 53-54.

Alis

Alis basi fuscis linea semicirculari pallida, *apice auratis;* margine crassiori nigro pallidoque striato.

— Spec. Inf. II. p. 287. no. 73.
In *Kiliae Quercu.*

28. *Applana*, der *dreyfache Mittelpunkt.*

Fabric. Mant. p. 294. no. 56-57.
Alis depressis fuscis; punctis tribus centralibus albis.

— Spec. Inf. II. p. 288. no. 76.
Habitat *Kiloniae.*

29. *Bankiana*, der *englische Waldwickler.*

Fabric. Spec. Inf. II. p. 275. no. 1.
Alis fuscis, fasciis duabus niveis, posteriore unidentata.
In *Angliae Sylvis.*

30. *Smeathmannia*, die *abgebrochene Binde.*

Fabric. Spec. Inf. II. p. 278. no. 13.
Alis exalbidis, fasciis duabus obliquis fuscis, anteriore abbreviata, posteriore interrupta.
In *Anglia.*

31. *Forsterana*, der *doppelte Randfleck.*

Fabric. Spec. Inf. II. p. 279. no. 18.
Alis anticis obscure cinereis, maculis duabus marginalibus fuscis.
In *Angliae Nemoribus.*

32. *Stroemiana*, der *doppelte Rückenfleck.*

Fabric. Spec. Inf. II. p. 280. no. 24.
Alis fuscis, maculis duabus dorsalibus cinereis.

In

In *Germania.*

33. *Cinerana*, der *Aſchwickler.*

Fabric. Spec. Inſ. II. p. 281. no. 27.

Alis exalbido cinereis immaculatis, capite fulvo.

In *Germania.*

34. *Obliquana*, die *Schrägſtreife.*

Fabric. Spec. Inſ. II. p. 281. no. 28.

Alis cinereis, faſciis obliquis fulvis, albo-marginatis.

In *Anglia.*

35. *Faſciana*, die *Braunbinde.*

Fabric. Spec. Inſ. II. p. 282. no. 35.

Alis anticis obſcure cinereis, faſcia media lituraque apicis fuſcis.

In *Angliae hortis.*

36. *Ilicana*, der *ſchwarze Mittelpunkt.*

Fabric. Spec. Inſ. II. p. 283. no. 44.

Alis anticis fuſco-cinereis, punctis fuſcis, centrali ſolitario atro.

In *Angliae hortis.*

37. *Tumbergiana*, der *ſchwarze Vierpunkt.*

Fabric. Spec. Inſ. II. p. 284. no. 47.

Alis anticis cinereis, punctis quatuor elevato faſciculatis atris.

In *Germania.*

38. *Scabrana*, der *Hökerflügel.*

Fabric. Spec. Inſ. II. p. 284. no. 54.

Alis anticis cinereis fuſco ſubfaſciatis ſcabris, margine exteriori poſtice exciſo.

In

In *Angliae Quercu.*

39. *Teatiana*, der *vierfache ſchwarze Randpunkt.*

Fabric. Spec. Inſ. II. p. 286. no. 60.

Alis anticis griſeis, macula punctisque duobus centralibus nigris.

In *Angliae Nemoribus.*

40. *Bicolorana*, der *Weißgrünwickler.* *)

Füeßl. ſchweiz. Inſ. p. 41. no. 798. der *Weißgrünwickler.*

Röſels Inſektenbel. IV. p. 73. t. 10. die glatte, grüne, mit einer kleinen Rückenwarze verſehene, auf dem Eichenlaub lebende Raupe, mit ihrem beſonders ſchönen *grünen Papilion.*

Wiener Schmett. p. 125. A. *Grüne Blattwickler:* no. 1. *Eichenwicklerraupe* (Quercus Roboris); *Eichenwickler.* T. *Quercana.*

Degeer Inſ. Tom. I. Mém. 2. p. 58. t. 3. f. 1.

— Tom. II. P. I. p. 410. no. 1.

Phaléne à antennes filiformes, à trompe, à ailes rabatues en toit, dont les ſuperieures ſont vertes à deux lignes obliques jaunâtres, & les inferieures blanches.

Phaléne *verte bilinaire.*

— *Ueberſ.* II B. I Th. p. 296. no. 1. die *grüne zweylinichte Phaläne.*

Geoffr. Inſ. II. p. 172. no. 124.

Phalaena ſeticornis ſpirilinguis, humeris latis, alis viridibus, linea duplici transverſa albida.

La *Chappe verte à bande.*

Long. 9 Lign.

Réaum. Inſ. I. t. 39. f. 10-14.

Fabric. Spec. Inſ. II. p. 276. no. 4. Pyralis *praſinana.*

Alis

*) Vergl. mit *Praſinana* L. no. 285. welche *Fabric.* Spec. Inſ. II. p. 276. no. 5. *Fagana* nennet.

Alis anticis viridibus, ſtrigis *duabus* obliquis, flavicantibus, poſticis albis.

Habitat in *Alno*, *Quercu* Europae.

Larva viridis, linea laterali flavicante, ſegmento ſecundo dorſi tuberculato.

Pupa viridis, linea dorſali atra.

41. *Podana*, der *Okergelbe Wickler.*

Scop. Ent. carn. p. 232. no. 583.

Alae ochreaceae; anticae cinnamomeae; atomis ſtrigaque media fuſceſcentibus, apice caudatis.

In *Rhododendro ferrugin.*

Long. lin. $5\frac{1}{2}$. *Lat.* 3.

42. *Rubiana*, der *Strauchwickler.*

Scop. Ent. carn. p. 233. no. 585.

Alae fuſceſcentes; anticae ſupra cineraſcentes; macula communi poſtica ſubovata brunea, macula apicis punctisque tribus poſticis craſſiori margini impoſitis bruneis.

Long. lin. $4\frac{1}{4}$. *Lat.* $2\frac{1}{3}$.

An *Viduana Müllerі?* Zool. Dan. Pr. p. 132. no. 1523.

Alis albo-cinereis, faſciis obliquis, maculaque marginali nigro punctata griſeis.

43. *Faſciana*, die *Weißbinde.*

Linn. Faun. Suec. ed. 2. p. 342. no. 1304.

Alis fuſco-cineraſcentibus; faſcia alba.

In *Pomariis.*

Scop. Ent. carn. p. 233. no. 586.

Alae anticae ſupra fuſco glaucoque variae; faſcia lata albida poſtica.

Long. lin. 4. *Lat.* $2\frac{1}{3}$.

44. *Cervana*, der *Hirschhornfarbige Wickler.*

Scop. Ent. carn. p. 234. no. 588.

Alae anticae *cervinae;* limbo ferrugineo et fusco-punctato; fascia fuscescente punctisque (3-4) glaucis variegata.

In *Ericetis.*

Long. lin. 5. *Lat.* $2\frac{1}{2}$.

45. *Lambergiana*, der *Rindenfarbige Wickler.*

Scop. Entom. carn. p. 234. no. 589.

Alae anticae *corticinae;* strigis transversis punctisque quatuor plumbeis.

Circa *Idriam.*

Long. lin. 4. *Lat.* $2\frac{1}{4}$.

Müller Zool. Dan. Pr. p. 132. no. 1522. T. *Lambergiana.*

Alis nigricantibus maculis obscuris plumbeis.

46. *Wulfeniana*, der *Schwärzling.*

Scop. Ent. carn. p. 235. no. 590.

Nigricans, alis anticis plumbeo-punctatis; subtus puncto albo, quo posticae utrinque notatae.

Long. lin. 3. *Lat.* $1\frac{1}{2}$.

Circa *Idriam.*

Müller Zool. Dan. Prodr. p. 132. no. 1521. T. *Wulfeniana.*

Alis nigricantibus; anticis punctis argenteis; posticis litura utrinque nivea.

47. *Rufana*, der *Fuchs.*

Scop. Ent. carn. p. 235. no. 591.

Alae anticae ferrugineae, glauco-punctatae.

In *Salicetis.*

Long. $4\frac{1}{4}$. *Lat.* $2\frac{1}{3}$.

48. *Plum-*

48. *Plumbana*, der *Bleyſtrich.*

Scop. Ent. carn. p. 235. no. 592.

Alae anticae baſi fuſceſcentes; poſticae ferrugineae, *lituris transverſis hamatis plumbeis*, punctisque (2 - 3) nigris marginalibus ad angulum poſticum.

In *Herbidis.*

Long. lin. $4\frac{1}{2}$. *Lat.* $2\frac{1}{3}$.

49. *Ruſticana*, der *Landmann.*

Scop. Ent. carn. p. 236. no. 593.

Alae anticae caneſcentes; maculis obſoletis faſciaque pallide caffeatis.

Circa *Tuguria et poſſeſſiones Ruſticorum.*

Long. 4 lin. *Lat.* 2.

50. *Miſcellana*, der *Miſchling.*

Scop. Ent. carn. p. 236. no. 594.

Alae anticae cervinae fuſco-punctatae; ſtrigis transverſis interruptis plumbeis, faſciaque media fuſceſcente, plumbeo puncto notata.

In *Nemoribus*, *hortis*, *pomariis*, Majo.

Long. lin. 4. *Lat.* 2.

51. *Montana*, der *Bergmann.*

Scop. Ent. carn. p. 236. no. 595.

Alae anticae fuſcae, macula communi media margineque craſſiore poſtice ferrugineis, ſtrigis binis poſticis obliquis fimbriaque plumbeis.

In *montanis Carnioliae.*

Long. lin. 3. *Lat.* $\frac{1}{2}$.

Wien. Schmett. p. 127. B. *Metallichte Blattwickler:* no. 14. *Unbekannte Raupe; ſchwärzlichter Wickler*, mit gelber Gemeinmakel, und ſilbernem Unterrande. T. Montana *Scop.*

52. *Cana*, der *kleine Eſel.*

Scop. Ent. carn. p. 236. no. 596.
Alae anticae caneſcentes, fronte atomisque cervinis.
Inter *Corylos.*
Long. lin. 6. *Lat.* 3.

53. *Pedana*, der *Nebelflügel.*

Scop. Ent. carn. p. 237. no. 597.
Alae anticae cinereo-fuſcoque nebuloſae, apice ſtrigis obliquis ferrugineis.
Inter *frutices.*
Long. lin. 5. *Lat.* 2½.

54. *Umbriana*, der *Nachtſchatten.*

Scop. Ent. carn. p. 237. no. 598.
Umbrina; alis anticis cinereis, faſcia punctisque marginalibus fuſceſcentibus.
In *Pratis.*
Long. lin. 4. *Lat.* 2.

55. *Formoſana*, der *Obſtfreund.*

Scop. Ent. carn. p. 237. no. 599.
Alae anticae nigro-corticinoque variae, ſtrigis tribus ſubmarginalibus obliquis plumbeis, punctisque albis marginalibus.
Circa *Idriam*, in *Pomariis.*
Long. lin. 4. *Lat.* 2.

56. *Rivulana*, die *Bachlinie.*

Scop. Ent. carn. p. 237. no. 600.
Alae anticae murinae; faſcia rivulisque poſticis, albidis.
In *Sylvis.*
Long. lin. 4. *Lat.* 2.

Wien.

§ *Wien. Schmett.* p. 131. E. *Graue Blattwickler:* no. 21. *Unbekannte Raupe; grauer Wickler mit düſtern Schrägſtreifen.* T. Rivulana *Scop.*

57. *Gramineana*, der *Grasling.*

Scop. Ent. carn. p. 238. no. 601.
Alae anticae atomis faſciisque binis obſoletis fuſceſcentibus.
In *herbidis collibus.*
Long. lin. $3\frac{1}{2}$. *Lat.* $1\frac{3}{4}$.

58. *Capillitiana*, der *Buſchkopf.*

Scop. Ent. carn. p. 238. no. 602.
Alae anticae ſubferrugineae; punctis marginalibus capite palpisque albidis.
In *Sylveſtribus locis.*
Long. lin. 4. *Lat.* 2.

59. *Oſſeana*, der *Beinfarbige Wickler.*

Scop. Ent. carn. p. 238. no. 603.
Alae anticae oſſeae; atomis fuſcis, punctoque apicis fuſceſcente.
In *Herbidis.*
Long. lin. $3\frac{1}{2}$. *Lat.* $1\frac{1}{2}$.

60. *Pyraliana*, der *Lichtfalterartige Wickler.*

Scop. Ent. carn. p. 238. no. 604.
Alae anticae ferrugineae; limbo obſcuriore, faſciisque binis fuſcis.
In *Sylvis.*
Long. lin. 3. *Lat.* $1\frac{1}{2}$.

61. *Revoyana*, der *Krummrand.*

Scop. Ann. hiſt. nat. 5. p. 116. no. 130.

Alis superioribus glauco-virentibus, margine exteriore notabiliter curvo.
Circa *Schemnitz.*
Alae anticae *Longit.* lin. 4-5.
Comes Petr. *Revay de Reva.*

62. *Schiffermulleriana*, der *Schiffermüllerſche Wickler.*

Scop. Ann. hiſt. nat. 5. p. 117. no. 131.
Parva; alis cinereo-murinoque variis.
In *hortis Schemnitzenſibus.*
Alae anticae *Long.* lin. 3-4.

63. *Hochenwartiana*, der *Hochenwartiſche Wickler.*

Scop. Ann. hiſt. nat. 5. p. 117. no. 132.
Alis anticis fuſcis, macula magna, lunata, communi, media.
Schemnitzii in hortis et pratis.
Alae anticae *Long.* lin. 5-6.

64. *Cruciana*, das *Roſtkreuz.*

Scop. Ann. hiſt. nat. 5. p. 118. no. 133.
Alae anticae flavae; ſingula cruce ferruginea.
Circa *Schemnitz* in pratis.
Alae anticae *Long.* lin. 4-5.

65. *Cingulana*, der *Gürtelwickler.*

Scop. Ann. hiſt. nat. 5. p. 118. no. 134.
Parva; murina; faſcia alba ſupra baſin.
Schemnitzii in pratis.
Alae anticae *Longit.* lin. 3-4.

66. *Miana*, der *Silberflügel.*

Mülleri Faun. Fridr. p. 53. no. 472.

Alis

Alis omnibus argenteis superioribus limbo fusco; lineaque undulata argentea.

In *Horto.*

— Zool. Dan. Prodr. p. 131. no. 1518.

67. *Koenigiana*, der *Grauflügel.*

Mülleri Faun. Fridr. p. 53. no. 473.

Alis omnibus griseis politis; inferioribus striga undulata.

— Zool. Dan. Pr. p. 131. no. 1519.

In *Arvis.*

68. *Albana*, der *Weißling.*

Mülleri Faun. Fridr. p. 53. no. 474.

Alis omnibus albis; inferioribus apice fascia fusca.

In *Arundineto.*

— Zool. Dan. Pr. p. 132. no. 1520.

69. *Penniferana*, der *Federträger.*

Mülleri Zool. Dan. Pr. p. 132. no. 1527.

Alis sexpennibus cinereis, fasciis duabus punctisque marginalibus nigris.

Frisch Inf. III. p. 20. no. 10. t. 7. der *3ten Platte.* f. 1-5.

Das kleine *Kaprifoliumblütträuplein* mit seinem Zwiefalter.

70. *Aureana*, der *Goldrand.*

Mülleri Zool. Dan. Pr. p. 132. no. 1528.

Alis omnibus utrinque fuscis, margineque postico latiusculo, aureo.

71. *Miniana*, der *Röthling.*

Mülleri Zool. Dan. Pr. p. 132. no. 1525.

Alis ſuperioribus miniatis; nodulo diſci candido, triangulo marginali rufo.

72. *Circulana*, der *Zirkelwickler.*

Mülleri Zool. Dan. Pr. p. 132. no. 1526.

Alis fulveſcentibus; macula dorſali communi ferruginea, ſtriga alba cincta.

73. *Graminiana*, der *Graswickler.*

Mülleri Zool. Dan. Pr. p. 132. no. 1529.

Alis omnibus utrinque cinereo-fuſcis; baſi maculis, diſco lineis, altera bifida, altera curvata, transverſis, albis.

74. *Olivana*, *Olivengrüner Wickler mit 2 ſilbernen Schrägeſtreifen.*

Wien. Schmett. p. 126. B. *Metalliſche Blattwickler*: no. 1. *Unbek. R.*

75. *Pilleriana*, *goldner W. mit 2 braunen Schrägeſtreifen.*

Wien. Schmett. p. 126. B. no. 2. *Unbekannte R.*

76. *Baumanniana*, *gelber Oranienſtreifigter W. mit Silberſtrichen.*

Wiener Schmett. p. 126. B. no. 6. *Unbek. R.*

77. *Teſſerana*, *gelber rothfleckichter W. mit Silberſtrichen.*

Wien. Schmett. p. 126. B. no. 7. *Unbek.* R.
Geoffr. Inſ. II. p. 186. no. 10.

Tinea *aurata*, alis ſuperioribus *cruce* decuſſata fuſco-rubra.

La *Teigne à croix de ſaint André.*

Long. 2¾ lign.

78. *Ba-*

78. *Badiana*, *graugelber*, *rothbraunfleckichter W. mit Silberſtrichen.*

Wien. Schmett. p. 126. no. 8. *Unbek.* R.

79. *Woeberiana*, *brauner W. mit Rothgold und Silber gezeichnet.*

Wien. Schmett. p. 126. no. 9. *Unbek.* R.

80. *Penkleriana*, *grau- und gelbgemiſchter W. mit Silberſtreifen.*

Wien. Schmett. p. 126. no. 12. *Unbek.* R.

81. *Lunulana*, *braunſchwarzer W. mit einem weißen Gemeinmonde und matten Silberſtrichen.*

Wien. Schmett. p. 127. B. no. 15. *Unbek.* R.

82. *Micana*, *graubräunlichter und ſchwarzgemiſchter W. mit Silberſprecken.*

Wien. Schmett. p. 127. B. no. 17. *Unbek.* R.

83. *Argentana*, *ganz ſilberglänzender W.*

Wien. Schmett. p. 127. B. no. 18. *Unbek.* R.

84. *Suttneriana*, *bleichgelber W. mit einem Mittelpunkt.*

Wien. Schmett. p. 127. C. *Gelbe Blattw.* no. 2. *Unbek.* R.

85. *Coſtana*, *Ledergelber W. mit zwey braunen Aufſenrandmakeln.*

Wien. Schmett. p. 127. C. no. 5. *Unbek.* R.

86. *Mediana*, *Okergelber und braungezeichneter W.*

Wien. Schmett. p. 128. C. *Unbek.* R.

87. *Viburnana*, *Mehlbaumwickler.*

Wien. Schmett. p. 128. C. no. 15. Mehlbaumwicklerraupe (Viburni Lantanae).

88. *Buoliana*, *Oranienfarbener Silberweißgegitterter W.*

Wien. Schmett. p. 128. C. no. 16. *Unbek.* R.

89. *Ferrugana*, *Roſtbrauner Wickler.*

Wien. Schmett. p. 128. D. *Braune Blattwickler:* no. 1. *Unbek.* R.

90. *Heparana*, *Leberfarbiger W. mit dunklen Streifen.*

Wien. Schmett. p. 128. D. no. 3. *Unbek.* R.
Geoffr. Inſ. II. p. 169. no. 118.

Phalaena ſeticornis ſpirilinguis, humeris latis, ferrugineo-fuſca, faſciis tribus transverſis ſaturatioribus.

La *Chappe brune.*

Long. 4 lign.

Degeer Inſ. Tom. I. Mém. 13. p. 409. 410. t. 27. f. 9. 10.

— II. Part. I. p. 468. no. 2.

Phaléne à antennes filiformes à trompe, à ailes larges d'un brun de Caffé, à bande oblique obſcure, à barbillons droits & allongés.

Phaléne chappe brune du Lilas.

— *Ueberſ.* II B. I Th. p. 345. no. 2. *die braune Mantelphaläne auf den Fliedern.*

Hellgrüne ſechzehnfüßige Raupe mit grünem Kopfe.

91. *Fulvana*, *Specklilienwickler.*

Wien.

Wien. Schmett. p. 128. D. no. 6. Specklilienwicklerraupe (Lonicerae Periclymeni).

92. *Rhombana*, *gelbbrauner W. mit zwey düstern Flecken.*

Wien. Schmett. p. 128. D. no. 7. *Unbek.* R.

93. *Rufana*, *gelbröthlicher W. mit düsterer Außenrandmakel.*

Wien. Schmett. p. 129. D. no. 8. *Unbek.* R.

94. *Lipsiana*, *Leberbrauner W. mit weißen Mittelpunkten.*

Wien. Schmett. p. 129. D. no. 9. *Unbek.* R.

95. *Cristana*, *dunkelbrauner W. mit weißem Innenrande.*

Wien. Schmett. p. 129. D. no. 10. *Unbek.* R.

96. *Scopoliana*, *Caffebrauner W. mit 2 weißglänzenden Bogenflächen.*

Wien. Schmett. p. 129. D. no. 11. *Unbek.* R.

97. *Laevigana*, *hellbrauner W. mit dunkler Mitte.*

Wiener Schmett. p. 129. D. no. 12. *Unbek.* R.

98. *Pusillana*, *rothbrauner W. mit weißgestricheltem Außenrande.*

Wien. Schmett. p. 129. D. no. 13. *Unbek.* R.

99. *Striana*, *bräunlichter W. mit düstern Streifen.*

Wien. Schmett. p. 129. D. no. 14. *Unbek.* R.

100. *Hohenwartiana*, *graubrauner* (auch goldgelber) *W. mit silberfarbigen Untenrandhäkchen.*

Wien. Schmett. p. 129. D. no. 15. *Unbek.* R.

101. *Politana*, *glänzender goldbräunlichter W. ohne Makel.*

Wien. Schmett. p. 129. D. no. 16. *Unbek.* R.

102. *Mitterbacheriana*, *Oraniengelb- und rothbrauner W. mit weißen Strichelchen.*

Wien. Schmett. p. 129. D. no. 17. *Unbek.* R.

103. *Tenerana*, *weißlicht- und Zimmetbrauner W. mit feinen Punkten.*

Wien. Schmett. p. 129. D. no. 18. *Unbek.* R.

104. *Permixtana*, *blaßbuntfarbiger W.*

Wien. Schmett. p. 129. D. no. 19. *Unbek.* R.

105. *Sparsana*, *grauer röthlich gezeichneter W.*

Wien. Schmett. p. 129. E. *Graue Blattw.* no. 1. *Unbek.* R.

106. *Succedana*, *hellgrauer W. mit bräunlichten Punkten und weißen Strichelchen.*

Wien. Schmett. p. 129. E. no. 2. *Unbek.* R.

107. *Cinctana*, *weißer W. mit braunem Querbande und Flecken.*

Wien. Schmett. p. 129. E. no. 3. *Unbek.* R.

108. *Dilutana*, *röthlichweißer W. mit blafsfarbigen Flecken.*

Wien. Schmett. p. 130. E. no. 5. *Unbek.* R.

109. *Variegana*, *gelblichtweifser W. mit düfterer Innenrandmakel und buntem Untenrande.*

Wien. Schmett. p. 130. E. no. 6. *Unbek.* R.

110. *Ocellana*, *weifslichter Wickler mit grauem Rücken und Innenwinkel.*

Wien.

Wien. Schmett. p. 130. E. no. 7. *Unbek.* R.

111. *Aſperana*, *grauer W. mit bunthökrichten Flügeln.*

Wien. Schmett. p. 130. E. no. 8. *Unbek.* R.

112. *Treueriana*, *weiſsgrauhökrichter ſchwarzgefleckter* (auch grünlichweiſser) *W.*

Wien. Schmett. p. 130. E. no. 10. *Unbek.* R.

113. *Pinana*, *Fichtenwickler.*

Wien. Schmett. p. 130. E. no. 11. Fichtenwicklerraupe (Pini Piceae etc. *Cluſ.*).

114. *Scabrana*, *grauer W. mit düſtern Hökern des Rückenwinkels.*

Wien. Schmett. p. 130. E. no. 12. *Unbek.* R.

115. *Punctulana*, *röthlichgrauer W. mit erhobenen ſchwarzen Punkten.*

Wien. Schmett. p. 130. E. no. 13. *Unbek.* R.

116. *Conſperſana*, *Perlfarbener W. mit blaugrauen Punkten und Strichelchen.*

Wien. Schmett. p. 130. E. no. 14. *Unbek.* R.

117. *Strigulana*, *Lichtgrauer dunkelſpreckichter W.*

Wien. Schmett. p. 130. E. no. 15. *Unbek.* R.

118. *Steinkellneriana*, *grauer W. mit ſchwarzem S.*

Wien. Schmett. p. 130. E. no. 16. *Unbek.* R.

119. *Revayana*, *grauer W. mit rothem Mittelpunkt.*

Wien. Schmett. p. 130. E. no. 17. *Unbek.* R.

120. *Tumidana*, *Lichtgrauer W. mit zwey röthlichen Schwulſten.*

Wien.

Wien. Schmett. p. 130. E. no. 18. *Unbek.* R.

121. *Undulana*, *grauer weifslichtgefchlängelter W.*
Wien. Schmett. p. 131. E. no. 22. *Unbek.* R.

122. *Stagnana*, *grauer lichtgewäfferter W.*
Wien. Schmett. p. 131. E. no. 23. *Unbek.* R.

123. *Comitana*, *dunkelgrauer weifsgefchlängelter W.*
Wien. Schmett. p. 131. E. no. 24. *Unbek.* R.

124. *Affeclana*, *braungrauer weifsgefleckter W.*
Wien. Schmett. p. 131. E. no. 25. *Unbek.* R.

125. *Botrana*, *Weintraubenwickler.*
Wien. Schmett. p. 131. E. no. 26. Weintraubenwicklerraupe (Botri).

126. *Achatana*, *grauer W. mit rothbraunen Flecken.*
Wien. Schmett. p. 131. E. no. 27. *Unbek.* R.

127. *Mygindiana*, *grauer*, *abwärts feuerrothgeftrichter W.*
Wien. Schmett. p. 131. E. no. 28. *Unbek.* R.

128. *Corticana*, *dunkelgrau und weifsgefleckter W.*
Wien. Schmett. p. 131. E. no. 29. *Unbek.* R.

129. *Scutulana*, *grauer W. mit zwo weifslichen Flächen.*
Wien. Schmett. p. 131. E. no. 30. *Unbek.* R.

130. *Linneana*, *weifslichgrauer W. mit einem fchwarzen Mittelftrichelchen.*
Wien. Schmett. p. 131. E. no. 31. *Unbek.* R.

131. *Similana*, *grauer W. mit zwo weifslichen Flächen und geftrichtem Aufsenrande.*
Wien. Schmett. p. 131. E. no. 32. *Unbek.* R.

132. *Si-*

132. *Sinuana*, *Mäusefahler W. mit einer weisen Innenrandmakel.*
Wien. Schmett. p. 131. E. no. 33. *Unbek.* R.

133. *Roborana*, *Eichenbuschwickler.*
Wien. Schmett. p. 131. E. no. 34. Eichenbuschwicklerraupe (Quercus Rob.)

134. *Tripunctana*, *schwarzgrauer W. mit weißem Mittelraume und drey schwarzen Pünktchen.*
Wiener Schmett. p. 131. E. no. 35. *Unbek.* R.

135. *Profundana*, *düstergemischter* W. *mit weißlicher Gemeinmakel.*
Wien. Schmett. p. 132. F. *düstere Blattwickler:* no. 1. *Unbek.* R.

136. *Trauniana*, *schwarzer* W. *mit hochgelber Gemeinmakel.*
Wien. Schmett. p. 132. F. no. 3. *Unbek.* R.

137. *Iacquiniana*, *braunschwarzer* W. *mit bleichgelbem Gemeinbande.*
Wien. Schmett. p. 132. F. no. 4. *Unbek.* R.

138. *Furvana*, *grauschwarzer* W. *mit lichtgezeichnetem Untenrande.*
Wien. Schmett. p. 132. F. no. 5. *Unbek.* R.

139. *Inundana*, *mattschwarzer weislich gewässerter* W. *mit weisem Mittelpunkte.*
Wien. Scmett. p. 132. F. no. 6. *Unbek.* R.

140. *Urticana*, *Nesselwickler.*
Wien. Schmett. p. 132. F. no. 7. Nesselwicklerraupe (Urticae dioïcae).
An *Degeer* Inf. II. Part. I. p. 476. no. 5.
Phaléne Chappe à ailes béantes de l'Ortie?
— Tom. I. Mém. 13. p. 413. t. 28. f. 1. 2. 9. 10.
— *Ueberf.* II B. I Th. p. 473. no. 5. *die Mantelpha-*

phaläne auf den Neſſeln mit aus einander ſtehenden Flügeln.

141. *Alniana*, *Erlenwickler.*
Wien. Schmett. p. 132. F. no. 8. Erlenwicklerraupe (Betulae Alni).

142. *Fuligana*, *ganz düſterer Wickler.*
Wien. Schmett. p. 132. F. no. 9. *Unbek.* R.

143. *Literana*, *hochgrüner ſchwarzgezeichneter* W.
Wien. Schmett. Nachtr. p. 317. A. no. 5. *Unbek.* R.

144. *Decimana*, *gelber kreuzmaklichter* W. *mit Silberſtrichen.*
Wien. Schmett. Nachtr. p. 317. B. *Unbek.* R.

145. *Trigonana*, *Dottergelber* W. *mit bräunlichem Dreyecke.*
Wien. Schmett. Nachtr. p. 317. C. *Unbek.* R.

146. *Steineriana*, *Skorpionsſennenwickler.*
Wien. Schmett. Nachtr. p. 317. C. Skorpionsſennenwicklerraupe (Coronillae Emeri).

147. *Hermanniana*, *Brombeerwickler.*
Wien. Schmett. Nachtr. p. 317. D. Brombeerwicklerraupe (Rubi fruticoſi).

148. *Pasquayana*, *Elſebeerwichler.*
Wien. Schmett. Nachtr. p. 318. D. Elſebeerwicklerraupe (Crataegi torminalis).

149. *Helvolana*, *Weißwurzwickler.*
Wien. Schmett. Nachtr. p. 318. D. Weiſswurzwicklerraupe (Convallariae Polygonati).

150. *Gerningana*, *goldbrauner ſchwarzrothſtreifichter* W.
Wien. Schmett. Nachtr. p. 318. D. *Unbek.* R.

151. *Cam-*

151. *Campoliliana*, *weißer*, *braun- und gelbſprenklichter* W.

Wien. Schmett. Nachtr. p. 318. E. *Unbek.* R.

152. *Fluidana*, *weiſser*, *braunwellenſtreifichter* W.

Wien. Schmett. Nachtr. p. 318. *Unbek.* R.

153. *Lacunana*, *bleichgrauer braunmaklichter* W.

Wien. Schmett. Nachtr. p. 318. *Unbek.* R.

154. *Salviana*, *Salbeywickler.*

Wien. Schmett. Nachtr. p. 318. F. Salbeywicklerraupe (Salviae pratenſis).

155. *Merianana*, der *hohe Bruſtſchildwickler.*

Degeer Inſ. Tom. II. Part. I. p. 470. no. 6. t. 9. f. 16. 19.

Phaléne à antennes filiformes, à trompe, à corcelet huppé, à ailes larges d'un brun verdâtre avec deux cercles ovales & trois lignes transverſes griſes.

Phaléne chappe à corcelet à arrête.

Chenilles raſes vertes à points blancs & à cinq rayes longitudinales blanches, dont celle du milieu eſt large.

— De *grandeur mediocre.*

— *Ueberſ.* II B. I Th. p. 473. no. 6. t. 9. f. 16. 19. *Die Mantelphaläne mit einem kantigen Bruſtſchilde.*

Merian. Inſ. Eur. t. 87.

156. *Mumetes*, der *Sichelflügel.*

Cramer Pap. exot. I. p. 128. t. 82. Fig. A. *Surin.* Alis furvis; anticis falcatis flavo-lineatis.

157. *Marriana*, das *braune Dreyeck.*

Cramer Pap. exot. IV. p. 113. t. 348. Fig. F.

Alis *anticis* ſinuoſis variegatis; maculis fuſcis triangularibus; *poſticis* luteis.

158. *Renſelariana*, das *gelbe Bächlein.*

Cramer Pap. exot. IV. p. 114. t. 348. Fig. H.

Alis *anticis* flavo-rivulatis, maculis quatuor fulvis; *poſticis* fuſco-canis.

159. *Crameriana*, der *Buckelflügel.*

Cramer Pap. exot. IV. p. 114. t. 348. Fig. I.

Alis *anticis* gibboſis, margine rutilantibus, medio bilineatis; *poſticis* fuſco-canis.

160. *Seppiana*, der *fleiſchfarbige Wickler.*

Cramer Pap. exot. IV. p. 135. t. 359. Fig. H.

Alis concoloribus *incarnatis;* anticis margine exteriore fuſco-maculato.

161. *Holthuſiana*, der *Pommeranzenrand.*

Cramer Pap. exot. IV. p. 138. t. 360. Fig. H.

Alis flavicantibus; *anticis* marginibus rutilantibus nigroque punctatis; *poſticis* margine aurantiaco.

162. *Meyeriana*, der *Flimmerrand.*

Cramer Pap. exot. IV. p. 138. t. 360. Fig. K.

Incarnata; marginibus nigro-ciliatis.

163. *Gladbaghiana*, das *Doppelſtäbchen.*

Cramer Pap. exot. IV. p. 138. t. 360. Fig. L.

Alis *anticis* rubro-variegatis; *binis* flavo-rubroque *bacillis.*

164. *Demarriana*, der *Schneeflügel.*

Cramer Pap. exot. IV. p. 138. t. 360. Fig. M.
Nivea; anticis rivulis transverſis flavis ſinuoſis.

165. *Fueslíniana*, der *Röthling.*

Cramer Pap. exot. IV. p. 163. t. 372. Fig. E.
Rutilans, atro-punctata.

166. *Albertiana*, die *gelbweiſse Neune.*

Cramer Pap. exot. IV. p. 163. t. 372. Fig. H.
Furva; alis *anticis* binis numeris 9 flavo-albis.

167. *Burmanniana*, der *Mondrand.*

Cramer Pap. exot. IV. p. 164. t. 372. Fig. H.
Luteſcens; margine anticarum atro-lunulato.

168. *Gerningiana*, der *Randpunkt.*

Cramer Pap. exot. IV. p. 164. t. 372. Fig. I.
Teſtacea; punctulis nigris marginalibus.

169. *Walchiana*, der *Weiſsrand.*

Cramer Pap. exot. IV. p. 191. t. 384. Fig. F.
Alis olivaceo-micantibus, margine anteriore *niveis.*

170. *Thunbergiana*, der *Bräunling.*

Cramer Pap. exot. IV. p. 192. t. 384. Fig. H.
Alis anticis fuſcis, brunneo-maculatis.

171. *Klemaniana*, der *Weiſspunkt.*

Cramer Pap. exot. IV. p. 192. t. 384. Fig. I.

Alis olivaceo-fuſcis; albo-punctatis, poſticis concoloribus brunneis.

172. *Eſperiana*, der *Schwarzſtrich.*

Cramer Pap. exot. IV. p. 192. t. 384. Fig. K.
Alis concoloribus, fuſco-rubris, nigro-lituratis.

173. *Clerkiana*, der *weiſse Dreyzack.*

Cramer Pap. exot. IV. p. 192. t. 384. Fig. M.
Alis anticis caneſcentibus, alba tripude marginali; poſticis furvis, nigro-lineatis.

V. *Lichtmücken*, Pyralides. (*Zünsler*, Pinceurs.)

327. *Farinalis*, die *Mehlmücke.*

Müller L. N. S. 5 Th. I B. p. 731. *Feuerwürmlein* p. 732. no. 327. der *Polirflügel.*
Füeßl. ſchweiz. Inſ. p. 41. no. 808. Ph. *Pyralis.*
Wien. Schmett. p. 123. B. *Kurzſchnauzigte Zünsler*, Ph. Pyr. *Brevipalpes:* no. 33. *Mehlzünslerraupe* (Farinae culinaris). Pyr. *Farinalis Linn.*
Geoffr. Inſ. II. p. 167. no. 113.
Phalaena ſeticornis ſpirilinguis triangularis, alis ſuperioribus fuſco-purpureis; faſcia transverſa albido-ferruginea, abdomen ſupra protendens.
La *Phalène à ventre relevé.*
Long. $4\frac{1}{2}$ Lign.
Réaum. Inſ. II. t. 2. f. 4.
Bekm. Ep. S. L. p. 167. no. 327. Ph. Pyr. *Farinalis.*
Blumenbachs Handb. der N. G. p. 372. no. 18. Ph. Pyr. *Farinalis.*
Scop. Entom. carn. p. 240. no. 608.

Alae

Alae anticae basi et limbo caryophyllinis, media parte pallide cervina, marginibus repandis albidis.

Long. $5\frac{1}{2}$ lin.

Poda Mus. graec. p. 94.

Schaeff. Icon. t. 95. f. 8. 9.

Fabric. S. E. p. 641. *Phalaena* alis forficatis no. 112. Ph. *Farinalis.*

Palpis recurvatis, alis politis, lutescentibus, strigis repandis albis, basi apiceque glaucis.

— Spec. Ins. p. 270. no. 169. Ph. *Farinalis.*

Sedens caudam erigit.

Mülleri Faun. Fridr. p. 54. no. 478. Pyr. *Farinalis.* Nom. *Linn.*

— Zool. Dan. Pr. p. 132. no. 1530. Pyr. *Farinalis.* N. L.

Cramer Pap. exot. IV. p. 112. t. 348. Fig. D. Pyr. *Farinalis Linn.*

328. *Glaucinalis*, der *Blauflügel.*

Müller l. c. p. 732. no. 328. der *Glattflügel.*

Wien. Schmett. A. *Langschnauzichte Zünsler*, P. *Longipalpes.* p. 120. no. 10. *Unbek.* R. *Gelblichter Zünsler mit zwey Querstrichen.* P. Glaucinalis *Linn.*

Die Querstriche kaum sichtbar.

Fabric. S. E. p. 641. no. 113. *Phalaena glaucinalis.* Nom. *Linn.*

— Spec. Ins. p. 270. no. 172. N. L.

Clerk Phal. t. 5. f. 4.

Mülleri Faun. Fr. p. 54. no. 479. Pyr. *glaucinalis.* Nom. *Linn.*

— Zool. Dan. Pr. p. 132. no. 1531. Pyr. *glaucinalis.* N. L.

329. *Barbalis*, der *Langbart.*

Müller l. c. p. 732. no. 329. der *Schenkelbart.*

Füeſsl. ſchweiz. Inſ. p. 41. no. 809. Ph. *barbalis. Selten.*

Pontopp. N. G. v. D. p. 221. t. 17.

Wien. Schmett. p. 120. A. no. 9. *Kleezünslerraupe* (Trifolii pratenſis); *Kleezünsler.* Pyr. barbalis *Linn.*

Raj. Hiſt. Inſ. p. 227. no. 103. *Phalaena* parva, alis latis, e fulvo utrinque albicantibus, nulla colorum diverſitate.

Scop. Ent. carn. p. 239. no. 605. Pyr. *barbalis.*

Alae omnes utrinque cineraſcentes; atomis ſtrigisque tribus. Antennae ſubpectinatae. Femora antica barbata.

Circa *Labacum.*

Long. lin. $6\frac{3}{4}$.

Fabric. S. E. p. 641. no. 114. *Phalaena barbalis.* Nom. *Linn.*

— Spec. Inſ. p. 271. no. 171. N. L.

Clerk Phal. t. 5. f. 3.

Mülleri Faun. Fr. p. 54. no. 476. Pyr. *barbalis.* Nom. *Linn.*

— Zool. Dan. Pr. p. 133. no. 1532. N. L.

330. *Tentacularis*, der *Langfühler.*

Müller l. c. p. 732. no. 330. der *Langfühler.*

Wien. Schmett. p. 119. A. no. 2. *Butterblumzünslerraupe* (Leontodontis Taraxaci); *Butterblumzünsler.*

Syſt. Nat. du Regn. Anim. II. p. 150. no. 32.

Fabric. S. E. p. 641. no. 115. *Phalaena tentacularis.* Nom. *Linn.*

— Spec. Inſ. p. 271. no. 172. N. L.

Degeer

Degeer Inf. I. t. 5. f. 1.
— *Ueberf.* I. 1 Qu. p. 50. t. 5. f. 1.
— II. Part. 1. p. 358. no. 12.

Phaléne à antennes barbues, à trompe; à ailes horizontales d'un blanc fale avec deux lignes transverfes d'un brun pâle, dont les barbillons de la tête egalent les antennes en longueur.

Phaléne à très longs barbillons.

— *Ueberf.* II Th. 1 B. p. 260. no. 12. der *Langbart.*
Müllerі Faun. Fridr. p. 54. no. 475. Pyr. *tentacularis.* Nom. *Linn.*
— Zool. Dan. Pr. p. 133. no. 1533. Pyr. *tentacularis.* N. L.

331. *Proboſcidalis*, der *Rüſſelfühler.*

Müller l. c. p. 732. no. 331. der *Rüſſelfühler.*
Füeſsl. ſchweiz. Inf. p. 42. no. 810. Phal. *proboſcidalis. Nicht ſelten.*
Maders (Kleem.) Raupenkal. p. 26. no. 59.
Kleemanns Beytr. p. 265. t. 32. f. 1-10.

Die grün hellgeſtreifte mit zarten Härchen und 14 Füſsen beſetzte ſpringende *Spannraupe* der 3ten Klaſſe.

Ueber den gewölbten Netzförmigen Augen noch *ein kleines rundes.*

Sulzers Geſch. der Inf. p. 162. VI. *Feuervöglein.* Ph. Pyr. *Proboſcidalis.* t. 23. f. 6. 7. 8.

Das Weibchen blaſser.

Wien. Schmett. p. 119. A. no. 1. *Unbek.* R. *Brauner Zünsler mit ſpitzigem Aufsenwinkel der Oberflügel.* Pyr. *Proboſcidalis* L. *)

*) Da hier die Raupe als unbekannt angegeben wird; ſo ſcheinen die W. Entomologen die *Kleemanniſche* wohl nicht für die Proboſc. L. zu halten.

Scop. Ent. carn. p. 239. no. 606. Ph. Pyr. *Proboſcidalis.*

Alae anticae ſupra cinereae, faſciis tribus fuſcis; margine utrinque ferrugineo; poſtica in alae apice deſinente; antennae ſubpectinatae.

In *Carniolia* non rara.

Long. lin. 6.

Fabric. S. E. p. 642. no. 116. Phal. *Proboſcidalis.* Nom. *Linn.*

— Spec. Inſ. p. 271. no. 173. N. L.

Müllerí Faun. Fr. p. 54. no. 477. Ph. Pyr. *Proboſcidalis.* N. L.

— Zool. Dan. Pr. p. 133. no. 1534. Ph. Pyr. *Proboſcidalis.* N. L.

332. *Roſtralis*, die *Langſchnauze.*

Müller l. c. p. 733. no. 332. t. 22. f. 15. die *Langſchnauze.*

Füeßlins ſchweiz. Inſ. p. 42. no. 811. Ph. *Roſtralis.*

Gleditſch Forſtwiſſ. I. p. 580. no. 1. Ph. *Pyralis*, die *Haynbüchenmotte;* die *dunkelgraue langſchnäblichte Lichtmotte;* auf *Weißbüchen und Hopfen.*

Wien. Schmett. H. p. 119. no. 3. *Hopfenzünslerraupe* (Humuli Lupuli); *Hopfenzünsler.* Ph. Pyr. *Roſtralis* L.

Leske Anfangsgr. der N. G. I. p. 463. no. 21. *Hopfenzünsler.*

Röſels Inſektenbel. I. NV. 4te Kl. p. 14. t. 6. das *grüne Springräuplein auf dem Hopfen.*

Raj. Hiſt. Inſ. p. 214. no. 9.

Phalaena media e rufo cineraſcens aut pulla, gemina proboſcide ſurſum reflexa, alis exterioribus duplici transverſa areola e rufo nigricante diſtinctis.

Geoffr.

Geoffr. Inſ. II. p. 168. no. 116.

Phalaena ſeticornis ſpirilinguis, corniculis magnis criſtatis, alis fuſco-fumoſis, medietate poſtica albidiore, punctis verrucoſis eminentibus.

Le toupet à pointes.

Long. 6 lign.

Fabric. S. E. p. 642. no. 117. Phal. *Roſtralis.* Nom. *Linn.*

Larva nuda, 14-poda, viridis; ſtrigis obliquis lineisque lateralibus albis.

Pupa folliculata, brunnea, obtuſa, antice carinata.

— Spec. Inſect. p. 271. no. 174. Nom. *Linn.*

333. *Sulphuralis*, der *Schwefelflügel.*

Müller l. c. p. 733. no. 233. der *Schwefelflügel.*

Füeßl. ſchweiz. Inſ. p. 42. no. 812. Phal. *Sulphuralis.* Bey uns ſelten.

Wien. Schmett. p. 93. Z. *Halbſpannraupen* (Larvae Semigeometrae); *reiche Eulen*, Ph. *Noctuae* Metallicae: no. 6. *Windeneulenraupe* (Convolvuli arvenſis); *Windeneule.* N. *Sulphurea* (Pyralis Sulphuralis L.).

Beſchäftigungen der Geſellſch. Naturf. Freunde zu Berlin. III. B. p. 37. t. 1. f. 7. Phal. *Sulphuralis.*

Schaeff. Icon. t. 9. f. 14. 15.

Fabric. Mantiſſ. p. 280. no. 83·84. Phal. *Bombyx lugubris.*

Alis deflexis flavis, rivulis punctisque atris; poſticis fuſcis.

— Spec. Inſect. p. 197. no. 116. Ph. B. *lugubris.*

334. *Forficalis*, das *Kohlvögelchen.*

Müller l. c. p. 733. no. 334. der *Kohlwurm.*

Füeſsl. ſchweiz. Inſ. p. 82. no. 813. Phal. *Forficalis.*

Wien. Schmett. p. 122. B. *Kurzſchwanzigte Zünsler:* no. 17. *Meerrettigzünslerraupe* (Cochlleariae Armoraciae); *Meerrettigzünsler.* Ph. *Forficalis* L.

Schaeff. Icon. t. 51. f. 8. 9.

Geoffr. Inſ. II. p. 166. no. 111.

Phalaena ſeticornis ſpirilinguis, triangularis; alis deflexis flavis, lineis duabus ferrugineis obliquis.

La *bande eſquiſſée.*

Long. 6 lign.

Syſt. Natur. du Regn. Anim. II. p. 158. no. 70. Phaléne *du Chou.*

Act. Upſal. 1736. p. 24. no. 49.

Papilio alis planis pallidis nitidis.

Fabric. S. E. p. 642. no. 120. Nom. *Linn.*

— Spec. Inſ. p. 272. no. 177. Nom. L. *Phalaena Forficalis.*

Mülleri Faun. Fridr. p. 54. no. 484. Ph. P. *Forficalis.* N. L.

— Z. D. Pr. p. 133. no. 1535. Ph. P. *Forficalis.* N. L.

535. *Verticalis*, das *Neſſelvögelchen.*

Müller l. c. p. 733. no. 335. der *Neſſelwurm.*

Füeßl. ſchweiz. Inſ. p. 42. no. 814. Ph. *Verticalis.*

Röſels Inſektenbel. I. NV. 4te Kl. p. 9. t. 4. *der groſſe grüne Blattwickler der größern Brennneſſel.*

Wien. Schmett. p. 120. B. no. 1. *Neſſelzünslerraupe* (Urticae dioicae); *Neſſelzünsler.* P. *Verticalis* L.

Sulzers Kennz. der Inſ. t. 16. f. 98. Ph. *Purpuralis.*

Bekmann

Bekmann Ep. S. L. p. 167. no. 335. P. *Verticalis.*
Syſtem. Natur. du Regne Anim. II. p. 153. no. 46. *Phaléne de l' ortie.*
Act. Upſal. 1736. p. 24. no. 50.

Papilio alis planis nitidis albidis, faſciis undulatis.

Fabric. S. E. p. 643. no. 121. Phal. *Verticalis.* *)
— Spec. Inſect. p. 272. no. 180. Phal. *Verticalis.* **)

Larva 16-poda, piloſa, capite pedibusque flavis.

Pupa brunnea, ſegmentis tribus ultimis denticulo notatis.

Raj. Inſ. p. 207. no. 48.

Phalaena parva ex albido ſublutea, alis exterioribus duplici linea transverſa nigricante, obliqueque ducta notatis.

Müllери Faun. Fridr. p. 54. no. 482. Pyr. *Verticalis.* N. L.
— Zool. Dan. Pr. p. 133. no. 1536. P. *Verticalis.* N. L.

336. *Pinguinalis*, das *Fettvögelchen.* ***)

Müller l. c. p. 733. no. 336. der *Butterkeeter.*

Füeſsl.

*) Hierbey hat *Fabricius* des *Geoffroy* Inſ. II. p. 166. no. 12. *La bande à l' envers*, angeführt; dieſes iſt aber der *Wiener* Pyr. *Paleatis.* p. 123. no. 27.

**) Hier ſtehet auch noch der *Geoffroy* p. 166. no. 12.

***) Von der Raupe ſagt *Linné:* habitat — rarius *in Ventriculo humano, inter Vermes peſſima.* Es iſt möglich, daſs dergleichen Räupchen mit den Speiſen in den Magen kommen, und allerley üble Zufälle erregen können; man verwechsle ſie aber ja nicht mit den eigentlichen *Eingeweide- und Darmwürmern.*

Füeſsl. ſchweiz. Inſ. p. 42. no. 815. Ph. *pinguinalis.*

Abhandl. der ſchwed. Akad. der Wiſſ. 17 B. 1755. p. 50. *Rolanders* Beſchr. einer glatten Raupe mit 16 Füſsen und getheilten Gelenken, welche *von allerley Hausmannskoſt* lebt. t. 2.

Wien. Schmett. p. 120. A. no. 13. *Schmalzzünslerraupe* (Butyri aliorumque pinguium); *Schmalzzünsler.* P. *Pinguinalis* L.

Schaeff. Icon. t. 60. f. 8. 9.

Réaum. Inſ. III. t. 20. f. 5.

Fabric. S. E. p. 643. no. 124. Phal. *pinguinalis.* N. L.

— Spec. Inſ. p. 273. no. 184. Ph. *pinguinalis.* N. L.

Larva 16-poda, laevis, fuſca, nitida.

Pupa nuda, brunnea, obſcura.

Pontopp. N. G. v. D. p. 221. no. 64. Ph. *pinguinalis.*

Müllerí Faun. Fr. p. 54. no. 479. Pyr. *Pinguinalis.* N. L.

— Zool. Dan. Pr. p. 133. no. 1537. Pyr. *Pinguinalis.* N. L.

Degeer Inſ. Tom. II. Part. I. p. 371. t. 6. f. 11.

Phaléne à antennes filiformes ſans trompe, à barbillons allongés; à ailes horizontales d' un gris d' agathe avec des rayes & des taches brunes & noires.

Phaléne de la graiſſe.

— *Ueberſ.* II Th. I B. p. 271. t. 6. f. 11. die *Fettphaläne.*

337. *Frumentalis*, das *Getreidevögelchen.*

Müller l. c. p. 734. no. 337. der *Getreidewurm.*

Pallas

Pallas Reiſen I. Th. p. 81. *)
Neueſte Entdeckungen im Ruſſ. Reiche. I. p. 217.

338. *Secalis*, das *Rockenvögelchen.* **)

Müller l. c. p. 734. no. 338. der *Rockenwurm.*
Lepechins Reiſe durch Ruſsl. I. p. 81. Sie ſollen von gekochtem *Wermuthwaſſer* ſterben.
Schwed. Abh. 1752. 14t. B. p. 67. *Rolander* von der Raupe in den weiſsen Aehren.
Wiener Schmett. p. 78. M. *Seiteſtreifenraupen; ſchwarzgezeichnete Eulen:* no. 17. *Rockenhalmeulenraupe* (Secalis cerealis intra culmos habitans); *Rockenhalmeule.* Noctua *Secalis* L.
Fabric. S. E. p. 644. no. 125. Phal. *Secalis.* Nom. *Linn.*
— Spec. Inſ. p. 273. no. 186. Phal. *Secalis.* Nom. L.
An *Mülleri* Faun. Fr. p. 46. no. 410? Ph. *Noctua Secalis*, ſpirilinguis criſtata cinerea: *thorace* bipunctato, alis ſtrigis maculisque tribus; ſubtus punctatis.
In Spica *Secalis.*
— Z. D. Pr. p. 124. no. 1425. Ph. N. *Secalis.*

339. *Sanguinalis*, das *Blutband.*

Müller l. c. p. 734. no. 339. das *Blutband.*
Wien. Schmett. p. 124. B. no. 41. *Unbek.* R. *Gelber Zünsler mit 2 rothen Querbinden.* Pyr. *Sanguinalis* L. et p. 152.
Schaeff. Icon. t. 19. f. 16.

Fabric.

*) Die *Larven* freſſen oft in Ruſsland die Aecker rein ab. Das beſte Mittel dagegen, die Felder, ſobald die Saat aufgegangen, beſonders bey feuchter Witterung, mit Aſche von *Buchweizen und Erbſenſtroh* beſtreuet,

**) *Nicht abgebildet.*

Fabric. S. E. p. 644. no. 126. Phal. *Sanguinalis.* Nom. L.

— Spec. Inſ. p. 274. no. 188. Ph. *Sanguinalis.* N. L.

340. *Stictícalis*, der *Bartrand.* *)

Müller l. c. p. 734. no. 340. der *Bartrand.*

Fabric. S. E. p. 644. no. 127. Phal. *Stictícalis.* Nom. L.

— Spec. Inſ. p. 274. no. 189. Phal. *Stictícalis.* N. L.

In Europa *boreali.*

341. *Reticularis*, der *Scheckrand.* **)

Müller l. c. p. 734. no. 341. der *Buntbart.*

Faun. Suec. ed. 2. p. 352. no. 1355. Ph. Pyr. *Reticularis.*

342. *Purpuralis*, der *Purpurmantel.* ***)

Müller l. c. p. 735. no. 342. der *Purpurmantel.*

Wien. Schmett. p. 124. B. no. 42. *Weiſsdornzünsler-raupe* (Crataegi oxyac.); *Weiſsdornzünsler.* Pyr. *Purpuralis* L.

Fabric. S. E. p. 644. no. 131. Phal. *purpuralis.* Nom. *Linn.*

— Spec. Inſ. p. 275. no. 194. Phal. *purpuralis.* N. L.

Variat rarius alis fuſcis flavo-maculatis.

Müller Faun. Fr. p. 54. no. 483. Ph. Pyr. *purpuralis.* N. L.

— Zool. Dan. Pr. p. 133. no. 1538. Ph. Pyr. *purpuralis.* N. L.

343 *Du-*

*) *Nicht abgebildet.* **) *Nicht abgebildet.*

***) *Nicht abgebildet.*

843. *Duplaris*, der *Doppelpunkt.* *)

Müller l. c. p. 735. no. 343. der *Parallelpunkt.*
Mülleri Z. D. Pr. p. 133. no. 1539. Pyr. *Duplaris.* N. L.
— Faun. Fridr. p. 55. no. 485. Phal. *Tinea* duplaris. N. L.

Unabgebildete Linnéiſche Lichtmücken.

1. no. 338. *Secalis.*
2. no. 340. *Stictícalis.*
3. no. 341. *Reticularis.*
4. no. 342. *Purpuralis.*
5. no. 343. *Duplaris.*

Neue Arten von Lichtmücken.

1. *Nemoralis*, die *Waldlichtmücke.*

Fabric. S. E. p. 642. no. 118.
Palpis recurvatis, alis griſeis; ſtrigis tribus fuſcis; intermedia flexuoſa.
In Angliae *Nemoribus.*
— Spec. Inſ. p. 271. no. 175.
Harris Inſ. Angl. t. 6. f. 2?

2. *Palpalis*, die *geradſchnauzigte Lichtmücke.*

Fabric. S. E. p. 642. no. 119.
Palpis porrectis, thorace longioribus, alis griſeis; poſticis margine craſſiori albo.
Habitat in *Anglia.*
— Spec. Inſ. p. 271. no. 176.

3. *Fuſcalis*, das *Weiſsauge.*

Fabric. S. E. p. 643. no. 122.

Palpis

*) *Nicht abgebildet.*

Palpis recurvatis, alis fuſcis, nitidis; anticis puncto ſubocellari niveo. In *India orientali.*
Fabric. Spec. Inſ. p. 273. no. 182.

4. *Dorſalis*, die *braune Rückenlinie.*

Fabric. S. E. p. 643. no. 123.
Palpis recurvatis; alis cinereis, linea dorſali faſciaque poſtica fuſcis. In *Braſilia.*
— Spec. Inſ. p. 273. no. 183.

5. *Faſcialis*, die *Doppelbinde.*

Fabric. S. E. p. 644. no. 128.
Palpis recurvatis, alis fuſcis, faſciis duabus flavis.
In *Nova Hollandia.*
— Spec. Inſ. p. 274. no. 190.

6. *Recurvalis*, die *Weiſsbinde.*

Fabric. S. E. p. 644. no. 129.
Palpis recurvatis, alis fuſcis; anticis faſciis duabus albis; poſteriore abbreviata.
In *India orientali.*
— Spec. Inſ. p. 274. no. 192.

7. *Punctalis*, der *Weiſsrand.*

Fabric. S. E. p. 644. no. 130.
Alis ſubferrugineis, ſtriga flava, margine craſſiori albo-punctato.
— Spec. Inſ. p. 275. no. 193.
In *Europae borealis* Nemoribus.

8. *Coſtalis*, der *Rippenfleck.*

Fabric. S. E. p. 644. no. 132.
Alis purpuraſcentibus; maculis duabus coſtalibus, margineque poſtico flavis. In *Anglia.*

Fabric.

Fabric. Spec. Inſ. p. 275. no. 196.

9. *Dentalis*, die *Purpurbinde.*

Fabric. S. E. p. 645. no. 134.
Alis flavis; faſcia purpurea.
In *India orientali.*
— Spec. Inſ. p. 275. no. 198.

10. *Undalis*, die *Waſſerbinde.* *)

Fabric. Spec. Inſect. p. 272. no. 178.
Alis obſcure cinereis, ſtrigis tribus obliquis undatis niveis.
In *Italia.*

11. *Ferrugalis*, die *Roſtbinde.*

Fabric. Spec. Inſ. p. 273. no. 185.
Alis flavis, ſtrigis tribus undatis ferrugineis.
In *Africa aequinoctiali.*

12. *Nivealis*, der *Schneebauch.*

Fabric. Spec. Inſ. p. 274. no. 187.
Alis griſeo-fuſcis, maculis duabus coſtalibus albis, corpore niveo.
In *Germania.*

13. *Strigalis*, die *Purpurader.*

Fabric. Spec. Inſ. p. 274. no. 191.
Alis griſeis, ſtrigis duabus flavis coſtaque purpuraſcente.
In *Germaniae Nemoribus.*

14. *Ver-*

*) Die *Noctuam Sagittam*, S. E. p. 597. no. 3. hält *Fabric.* nun ſelbſt in ſeinen Spec. Inſ. p. 272. no. 179. für eine Phalaenam oder Pyralidem L. Palpis recurvis, alis cinereis, macula coſtali atra, poſticis flavis, margine fuſco: Phalaena *Sagittalis.* *Caput acuminatum.*

14. *Verrucalis*, die *Dreywarze.*

Müllerí Faun. Fridr. p. 55. no. 484.
Palpis porrectis, alis albis, lineis duabus nigris acutis; *verrucis tribus.*
In *Pariete.*

— Zool. Dan. Pr. p. 133. no. 1540. Ph. Pyr. *Verrucalis.*

15. *Anthracinalis*, der *Köhler.*

Scop. Ent. carn. p. 239. no. 607.
Tota nigra; alis anticis albo-maculatis. Antennae mari pectinatae.
Circa *torrentes. Long.* lin. $6\frac{1}{2}$.

Wien. Schmett. p. 124. B. no. 46. *Schwarzer Zünsler mit viel weißen Fleckchen.* P. Anthracinalis *Scop.* Die *Raupe* iſt entdeckt. S. *Nachtrag* p. 317.

16. *Citrinalis*, die *Zitrongelbe Lichtmücke.*

Scop. Ent. carn. p. 240. no. 609.
Alae citrinae; poſticae pallidiores immaculatae; anticae faſcia ſubmarginali et cratere ſanguineo reticulatae.
Circa *Idriam.*
Palpi lin. $1\frac{1}{2}$ longi.
Long. lin. 4.

17. *Trabealis*, der *ſchwarze Balken.*

Scop. Ent. carn. p. 240. no. 610.
Alae anticae paleaceae; faſciis binis; *trabe* longitudinali maculisque (5) nigris.
Labaco mortuam accepi.
Long. lin. $4\frac{1}{2}$.

18. *Criſtalis*, der *ſchwarze Buſch.*

Scop. Ent. carn. p. 241. no. 611.

Alae

Alae fuscae; anticae supra ferrugineo fuscoque nebulosae; *crista* nigricante in medio notatae.

Circa *Idriam.*

Long. lin. $3\frac{1}{2}$.

19. *Lunalis*, das *braune Möndgen.*

Scop. Ent. carn. p. 241. no. 612.

Alae cervinae; anticae strigis tribus obsoletis lunulaque fuscis.

Labaci degit.

Long. lin. $6\frac{1}{2}$.

20. *Viminalis*, die *Bindweiden-Lichtmücke.*

Scop. Ent. carn. p. 241. no. 613.

Alae murinae, fascia obscuriore utrinque.

In aut circa *Salicem viminalem.*

Long. lin. 5.

21. *Extimalis*, die *Roststpitze.*

Scop. Ent. carn. p. 241. no. 614.

Alba; alis anticis apice ferrugineis.

In agro *Labacensi.*

Long. lin. 5.

22. *Sericealis*, der *Seidenglanz.*

Scop. Ent. carn. p. 642. no. 615.

Tota suboffea, sed *Serici* in modum nitens; alis anticis macula obsoleta fuscescente.

In agro *Labacensi.*

Long. lin. 4.

Wien. Schmett. p. 122. B. no. 18. *Unbek.* R. *Hellokergelber Zünsler mit einem schwarzen Mondfleckchen.* P. Sericealis *Scop.*

23. *Ruralis*, der *Landmann.*

Scop. Ent. carn. p. 242. no. 616.

Alae paleaceae, ſtrigis transverſis, undulatis, obſoletis, fuſcis.

Ruri degit.

Long. lin. 7.

24. *Trivialis*, der *gemeine Mann.*

Scop. Ent. carn. p. 642. no. 617.

Alae paleaceae; anticae ſupra faſcia lineis tribus obſcurioribus compoſita, ab alae margine inferiore nata et in apicem deſinente.

Vulgaris apud nos in hortis et pratis.

Long. lin. 6.

25. *Nemoralis*, die *Waldnymphe.*

Scop. Ent. carn. p. 642. no. 618.

Alae anticae baſi oſſeae, venulis paleaceis reticulatae, limbo paleaceo, parte intermedia vinaceae, margine externo repando.

In *Nemoribus* frigidis umbroſis.

Long. lin. 5.

Wien. Schmett. p. 123. B. no. 34. *Unbek.* R. *Gelb- und düſterröthlicher Zünsler mit weiß- und braungezähntem Saume.* P. Nemoralis *Scop.*

26. *Majalis*, die *Maylichtmücke.*

Scop. Ent. carn. p. 643. no. 619.

Alae anticae ſupra albae; faſciis tribus, interruptis, fuſceſcentibus. Pectus pedesque argentei, tibiis fuſco-annulatis.

In pratis *Majo* M.

Long. lin. 4.

27. *Luteolaris*, die *Leimfarbige Lichtmücke.* *)

Scop.

*) Ib. no. 136. Phal. priori ſimillima, ſed absque palpis porrectis, et linea longitudinali, marginali fuſco-lutea evidentiore.

Scop. Ann. 5. hiſt. nat. p. 118. no. 135.
Pallide lutea, palpis thorace longioribus, adſcendentibus.
In *Hungariae* pratis montanis.
Long. lin. 5-6.

28. *Tinealis*, *einwärts bleicher, auswärts düſtrer Zünsler.*

Wien. Schmett. p. 119. A. no. 4. *Unbek.* R.

29. *Decimalis*, *mit einem weißlichten X bezeichneter Zünsler.*

Wien. Schmett. p. 119. A. no. 5. *Unbek.* R.

30. *Bombycalis*, *gelbbrauner Zünsler mit gelbgerandetem Querbande.*

Wien. Schmett. p. 120. A. no. 6. *Unbek.* R.

31. *Anguſtalis*, *braunrother Zünsler mit ſchmalen Oberflügeln.*

Wien. Schmett. p. 120. A. no. 7. *Unbek.* R.

32. *Curtalis*, *blaßoraniengelber Zünsler mit rothbraunen Querſtrichen.*

Wien. Schmett. p. 120. A. no. 8. *Unbek.* R.

33. *Griſealis*, *Lichtgrauer Zünsler mit drey Querſtrichen.*

Wien. Schmett. p. 120. A. no. 11. *Unbek.* R.

34. *Emortualis*, *grünlichgrauer Zünsler mit 2 gelben Querſtrichen.*

Wien. Schmett. p. 120. A. no. 12. *Unbek.* R.

35. *Dentalis*, *Olivengrünlicher zackicht gezeichneter Zünsler.*

Wien. Schmett. p. 120. A. no. 14. *Unbek.* R.

36. *Repandalis*, *glänzender weißlich- und graugewäſſerter Zünsler.*

Wien. Schmett. p. 120. B. no. 2. *Unbek.* R.

37. *Triquetralis*, *glänzendweißlicher Zünsler mit 2 Wellenſtrichen und einem Dreyeck.*

Wien. Schmett. p. 120. B. no. 3. *Unbek.* R.

38. *Politalis*, *Strohgelber und Kupferbrauner Zünsler.*

Wien. Schmett. p. 121. B. no. 4. *Unbek.* R.

39. *Verbaſcalis*, der *Wollkrautzünsler.*

Wien. Schmett. p. 121. B. no. 5. *Wollkrautzünslerraupe* (Verbaſci Thapſi).

40. *Lancealis*, *glänzendgrauer Zünsler mit Lanzenförmigen Oberflügeln.*

Wien. Schmett. p. 121. B. no. 6. *Unbek.* R.

41. *Flavalis*, *glänzender hellgelber Zünsler.*

Wien. Schmett. p. 121. B. no. 7. *Unbek.* R.

42. *Fuſcalis*, *glänzender graubräunlicher Zünsler mit blaſſen Wellenſtrichen.*

Wien. Schmett. p. 121. B. no. 8. *Unbek.* R.

43. *Polygonalis*, *Wegetrittzünsler.*

Wien. Schmett. p. 121. B. no. 9. *Wegetrittzünslerraupe* (Polygoni avicularis).

44. *Elutalis*, *glänzendweißer blaßbraun gerandeter Zünsler.*

Wien. Schmett. p. 121. B. no. 10. *Unbek.* R.

45. *Prunalis*, *Schlehenzünsler.*

Wien.

Wien. Schmett. p. 121. B. no. 11. *Schlehenzünsler-raupe* (Pruni ſpinoſae).

46. *Sambucalis*, der *Holderzünsler.*

Wien. Schmett. p. 122. B. no. 14. *Holderzünsler-raupe* (Sambuci nigrae).

47. *Literalis*, *brauner Zünsler mit weiſsen Zügen.*

Wien. Schmett. p. 122. B. no. 15. *Unbek.* R.

48. *Salicalis*, der *Weidenzünsler.*

Wien. Schmett. p. 122. B. no. 16. t. I. b. f. 5. *Weidenzünslerraupe* (Salicis Triandrae etc.). t. I. a. f. 5.

49. *Lunatralis*, *graulichter Zünsler mit einem ſchwarzen Mondfleckchen.*

Wien. Schmett. p. 122. B. no. 19. *Unbek.* R.

50. *Olivalis*, *glänzender Olivenbräunlichter Zünsler mit weiſsen Mittelzeichen.*

Wien. Schmett. p. 123. B. no. 21. *Unbek.* R.

51. *Corticalis*, *hellbrauner, weiſs und ſchwarz geſtrichter Zünsler.*

Wien. Schmett. p. 123. B. no. 22. *Unbek.* R.

52. *Alpinalis*, *glänzender grauer Zünsler mit weiſser Mittelmakel.*

Wien. Schmett. p. 123. B. no. 24. *Unbek.* R.

53. *Punctalis*, *Quittengelblichter Zünsler mit einem weiſsen Punkt.*

Wien. Schmett. p. 123. B. no. 25. *Unbek.* R.

54. *Aenealis*, *bräunlichtgrauer Kupferſchielender Zünsler.*

Wien. Schmett. p. 123. B. no. 26. *Unbek.* R.

55. *Palealis, blafsgrünlichtgelber Zünsler.*

Wien. Schmett. p. 123. B. no. 27. *Unbek.* R.
Geoffr. Inf. II. p. 166. no. 112.
Phalaena feticornis ſpirilinguis triangularis, alis deflexis albo-vireſcentibus, ſubtus lineis duabus transverſis nigris.
La bande à l'envers.
Long. 7 lign.

56. *Ochrealis, hellokergelber Zünsler.*

Wien. Schmett. p. 123. B. no. 28. *Unbek. R.*

57. *Margaritalis, glänzender Perlfarbiger Zünsler.*

Wien. Schmett. p. 123. B. no. 29. *Unbek.* R.

58. *Ceſpitalis, gelb, braun und grauneblichter Zünsler mit gelblichen Querſtrichen der Unterflügel.*

Wien. Schmett. p. 123. B. no. 32. *Unbek.* R.

59. *Flammealis, gelber Zünsler mit Fleiſchfarbichtem Rande.*

Wien. Schmett. p. 123. B. no. 35. *Unbek.* R.

60. *Rubidalis, Purpurbrauner Zünsler mit 2 gelben Querſtrichen.*

Wien. Schmett. p. 124. B. no. 36. *Unbek.* R.

61. *Regalis, glänzender braunrother Zünsler mit 2 ſilbernen halben Querbinden.*

Wien. Schmett. p. 124. B. no. 37. *Unbek.* R.

62. *Fimbrialis, Purpurfarbiger Zünsler mit goldgelbem Untenrande.*

Wien. Schmett. p. 124. B. no. 38. *Unbek.* R.

63. *Au-*

63. *Auroralis*, *gelber Zünsler mit Purpurſtreifen.*

Wien. Schmett. p. 124. B. no. 39. *Unbek.* R.

64. *Pudoralis*, der *Zünsler mit weißen roſenroth gefleckten Oberflügeln.*

Wien. Schmett. p. 124. B. no. 40. *Unbek.* R.

65. *Quadripunctalis*, *Purpurſchwarzer Zünsler mit vier gelben Fleckchen.*

Wien. Schmett. p. 124. B. no. 43. *Unbek.* R.
Geoffr. Inſ. II. p. 195. no. 33.
Tinea fuſco-rubra, alis ſuperioribus maculis duabus croceis transverſim poſitis.
La Teigne à deux taches jaunes en bande.
Long. 3 lign.

66. *Pollinalis*, *ſchwarzer, weißgefleckter und beſtäubter Zünsler.*

Wien. Schmett. p. 124. B. no. 44. *Unbek.* R.

67. *Guttalis*, *ſchwarzer Zünsler mit 8 weißen Fleckchen.*

Wien. Schmett. p. 124. B. no. 45. *Unbek.* R.

68. *Nivalis*, *ſchimmernd weißer bräunlicht gewäſſerter Zünsler.* *)

Wien. Schmett. Nachtr. p. 316. A. no. 46. *Unbek.* R.

69. *Trinalis*, *hochgelber dreymaklichter Zünsler.*

Wien. Schmett. Nachtr. p. 317. B. no. 47. *Unbek.* R.

*) Die Pyr. *Calvarialis*, *ſchwarzbrauner Zünsler mit gelbem ſchwarzgezeichnetem Mittelflecke*, iſt ſchon vorher ihre N. *Calvaria*; wie auch p. 317. P. *Marginalis* ihre N. *Marginea*.

70. *Punicealis*, *rother gelbgefleckter Zünsler.*

Wien. Schmett. Nachtr. p. 317. B. no. 49. *Unbek.* R.

71. *Porphyralis*, *ſchwärzlichtrother gelbgeſtricht-und punktirter Zünsler.*

Wien. Schmett. Nachtr. p. 317. B. no. 50. *Unbek.* R.

72. *Auſonia*, die *Surinamiſche Auſonia.*

Cramer Pap. exot. II. p. 66. t. 140. Fig. C.
Alis incarnatis, ciliatis; anticarum dextra lineola curva atra.

73. *Flegia*, die *Surinamiſche Flegia.*

Cramer Pap. exot. II. p. 66. t. 140. Fig. D.
Alis concoloribus niveo-perlaceis; anticarum margine exteriore pallide glaucis.

74. *Chorebus*, der *Surinamiſche Chorebus.*

Cramer Pap. exot. II. p. 25. t. 113. Fig. D.
Alis anticis falcatis fuſcis, lineis transverſis incarnatis; poſticis obſcurioribus.

75. *Diaphana*, der *afrikaniſche Durchſchein.*

Cramer Pap. exot. II. p. 26. t. 113. Fig. G.
Alis niveis, atro-punctatis, lineisque transverſis luteis.

76. *Politia*, die *afrikaniſche Politia.*

Cramer Pap. exot. II. p. 35. t. 120. Fig. A.
Alis niveis, rubro-micantibus; anticis margine anteriore luteo.

77. *Nitocris*, die *Surinamiſche Nitokris.*

Cramer Pap. exot. III. p. 148. t. 275. Fig. A.

Alis

Alis olivaceis concoloribus; anticis margine anteriore rubro-punctatis, lineaque longitudinali communi atro-liturata; posticis lunulis olivaceis marginalibus.

78. *Pueritia*, die *Koromandelsche Pueritia.*

Cramer Pap. exot. III. p. 128. t. 164. Fig. E.
Alis fuscis; anticis apice et margine exteriore; posticis pariter maculis nigris, glauco-punctatis.

79. *Tedea*, die — *Tedea.*

Cramer Pap. exot. IV. p. 48. t. 312. Fig. G.
Alis anticis testaceis, posticis incarnatis; omnibus maculis argentaceis.

80. *Sulphuralis*, der *Schwefelflügel.*

Cramer Pap. exot. IV. p. 113. t. 348. Fig. E.
Tota sulphurea; alis anticis, binis lineis transversis, punctisque argenteis.

81. *Bilineata*, die *Doppellinie.*

Cramer Pap. exot. IV. p. 138. t. 360. Fig. I.
Alis anticis, pulchre rubris, singula flavo-bilineata.

82. *Margaritaria*, das *goldne V.*

Cramer Pap. exot. IV. p. 150. t. 367. Fig. K.
Alis violaceis, litteris V aurantiacis.
Clerk Icon. t. 51. f. 3. 4.

83. *Procopia*, die *Surinamische Prokopia.*

Cramer Pap. exot. IV. p. 152. t. 368. Fig. E.
Alis violaceis, albo-striatis, basi aurantiaco-canis.

84. *Mar-*

84. *Marginalis*, der *Surinamiſche Olivenrand.*

Cramer Pap. exot. IV. p. 160. t. 371. Fig. D.
Triangularis; alis albeſcentibus nigro-ſtriatis, margine lato-olivaceo.
Merian. Surin. t. 41. f. 2.

85. *Venuſtalis*, die *Surinamiſche Venuſtalis.*

Cramer Pap. exot. IV. p. 162. t. 371. Fig. I.
Alis anticis flaveſcentibus, nigro-ſerpentulatis; poſticis aurantiacis.

86. *Reginalis*, die *Surinamiſche Schwarzbinde.*

Cramer Pap. exot. IV. p. 163. t. 372. Fig. C.
Alis incarnatis, anticis aterrime faſciatis.

87. *Vicinalis*, die *Surinamiſche Schecke.*

Cramer Pap. exot. IV. p. 164. t. 372. Fig. G.
Flavo-rubro-furvoque variegata.

88. *Floralis*, das *Surinamiſche Blümchen.*
Cramer Pap. exot. IV. p. 191. t. 384. Fig. G.
Hilare rutilans, binis anticarum faſciis albis.

89. *Houttuinialis*, die *Houttuiniſche Lichtmücke.*
Cramer Pap. exot. IV. p. 192. t. 384. Fig. L.
Nigra, aurantiaco-maculata.

VI. *Motten*, Phal. *Tineae.* *)

344. *Gelatella*, die *Kerbelmotte.* **)

Mül-

*) Es iſt merkwürdig, daſs bey dem Mottengeſchlecht die *Weibchen einiger Arten Flügellos ſind.* Ich nenne dies Geſchlecht *Motten*, um es von den *Schaben*, Blattis, zu unterſcheiden. Zu dieſen Motten gehören die *Minirer*, Vers mineurs; Larvae *Subcutaneae.*

**) Da *Linné* ſelbſt dieſer Motte den Geſchlechtsnamen Tinea beyge-

Müllers Erkl. des Linn. Naturſyſt. Vten Th. Iter B. p. 735. no. 344. der *Apfelſchäler.* *)

Martini allgem. Geſch. der Nat. in alphab. Ordn. III B. p. 129. *Apfelſchäler.*

Wien. Schmett. p. 144. D. *Schnauzenloſe Schaben*, Ph. *Tineae Impalpes*, mit geſpitzten Oberflügeln: no. 38. *Rothweidenſchabenraupe* (Salicis purpureae); *Rothweidenſchabe.* Ph. T. *Gelatella* L. Fem. *Hemiptera.*

Clerk Phal. t. 8. f. 3.

345. *Sociella*, die *geſellſchaftliche Honigmotte.*

Müller l. c. p. 735. no. 345. die *Honigmotte.*

Bekm. Epit. S. L. p. 168. no. 345. T. *Gelatella.*

Syſt. Nat. du Regn. Anim. II. p. 162. no. 95. Le plus grand de tous ceux nommés: *naſutae* par *Linnaeus.*

Fabric. S. E. p. 656. no. 3. Tinea *Sociella.*

Alis oblongis, cinereis, antice albidis, poſtice pallidis, ſtriga undata, nigra.

— Spec. Inſ. p. 289. no. 3. T. *Sociella.*

Clerk Phal. t. 3. f. 11.

Degeer Inſ. Tom. II. Part. I. p. 466.

Phaléne à antennes filiformes, à trompe; à ailes roulées d'un blanc cendré avec des atomes bruns, & deux rayes obliques brunes.

Phaléne *à ailes à rouleau applati.*

Degeer

beygeſetzt hat; ſo habe ich ſie von den *Blattwicklern* abgeſondert, und zu den Tineis geſetzt.

*) Die Ueberſetzung in dem Müllerſchen Kommentar iſt ſonderbar: „dieſes Inſekt pflegt ſich gerne bey *den vom Tiſche getragenen Aepfelſchaalen* einzufinden.“

Linn. Habitat in *Pomariis ſub menſe defoliationis.* In den *Obſtkammern, um die Zeit, oder in dem Monat, wenn die Blätter fallen.*

Degeer Ueberſ. II Th. I B. p. 343. no. 4. die *Phaläne mit flachgerollten Flügeln.*

346. *Colonella*, die *Kolonmotte.*

Müller l. c. p. 736. no. 346. das *Kolon.*

Wiener Schmett. p. 133. B. *Geradſchnauzigte Schaben*, Ph. T. *Directipalpes, mit ſtumpfen Oberflügeln:* no. 1. *Unbek. Raupe;* röthlichgraue Schabe *mit ſchwarzem Mittelpunkte.* T. *Colonella* L. Groſs, und gleicht einer *Eule* (Noctua).

Neuer Schaupl. der Natur II. p. 193. Ph. *Colonella.*

Fabric. S. E. p. 655. no. 2. T. *Colonella.* Nom. *Linn.*

Puncta duo atra ad marginem craſſiorem.

— Spec. Inſ. II. p. 289. no. 2. T. *Colonella.*

Clerk Phal. t. 3. f. 8.

Syſt. Nat. du Regn. Anim. II. p. 163. no. 102. *Phaléne des Jardins.*

Müllers Zool. Dan. Pr. p. 133. no. 1541. Ph. T. *Colonella.* Nom. L.

Degeer Inſ. Tom. II. P. I. p. 467. no. 5.

Phaléne à antennes filiformes, à trompe; à ailes roulées d'un gris d'agathe avec deux rayes ondées noirâtres, & un point noir au milieu.

Phaléne *agathe à ailes roulées à point noir.*

— *Ueberſ.* II Th. I B. p. 342. no. 5. *die Achatfarbige Phaläne mit zuſammengerollten Flügeln und ſchwarzem Punkt.*

347. *Puſiella*, die *Zahnlinie.*

Müller l. c. p. 736. no. 347. der *Zahnſtrich.*

Füeßl. ſchweiz. Inſ. p. 42. no. 816. Ph. *puſiella.* Bey Zürch ſelten.

Sulzers Geſch. der Inſ. p. 162. t. 23. f. 9. der *Zahnſtrich.*

Fabric.

Fabric. S. E. p. 656. no. 6. T. *Puſiella.* Nom. *Linn.* In *Germaniae arvis.*

— Nov. Spec. Inſ. p. 291. no. 8. T. *Puſiella.*

348. *Bella*, das *punktirte Band.*

Müller l. c. p. 736. no. 348. das *Punktband.*

Raj. Hiſt. Inſ. p. 211. no. 1.
Phalaena minor fulva, maculis nigris, alba linea pulchre aſperſis.

Linn. Muſ. L. V. p. 399. no. 34.

Fabric. S. E. p. 585. no. 101. Ph. *Bombyx* bella. Nom. *Linn.*

— Spec. Inſ. II. p. 203. no. 141. Ph. B. *bella.*

Drury Illuſtr. of nat. hiſt. I. t. 24. f. 3.

Cramer Pap. exot. P. I. t. 109. Fig. CD.

349. *Pulchella*, der *Blutpunkt.*

Müller l. c. p. 736. no. 349. der *Blutpunkt.*

Lepechins Reiſe durch Ruſsl. P. I. p. 302.

Gladbachs neue Schmett. t. 15. f. 5. 6. der *Blutpunkt.*

Sulzers Geſch. der Inſ. p. 162. t. 23. f. 11. der *Blutpunkt.*

Wien. Schmett. p. 67. C. *Spindelraupen*, Larvae Fuſiformes; *Schabenartige Eulen*, Ph. Noctuae *Tineiformes:* no. 9. Sonnenwendeeulenraupe (Heliotropii europ. etc.); *Sonnenwendeeule;* Noctua *Pulchra.* Tinea *Pulchella* L.

Schaeff. Icon. t. 122. f. 1.

Fabric. S. E. p. 586. no. 102. Ph. *Bombyx* pulchella. Nom. *Linn.*

— Spec. Inſ. II. p. 203. no. 142. Ph. B. *pulchella.*

Cramer Pap. exot. P. I. p. 108. t. 109. Fig. EF. Ph. *Lotrix.*

Scop. Ent. carn. p. 208. no. 514. Phal. *pulchella.*

Alba;

Alba; alis anticis nigro-rubroque punctatis; posticis limbo fusco.

In flore *Scabiosae arvensis.*

Long. lin. $7\frac{1}{3}$. *Lat.* $3\frac{1}{3}$.

350. *Evonymella*, die *Spillbaummotte.* *)

Müller l. c. p. 736. no. 350. die *Spillbaummotte.*

Füeßl. schweiz. Inf. p. 42. no. 817. Ph. *Evonymella.*

— Magaz. der Entomol. II B. p. 39. Ph. *Evonymella* — die Raupen derselben haben viele *Zwirnwürmer.*

Röfels Insektenbel. I B. NV. 4te Kl. p. 19. t. 8. die *gelbe gesellige Heckenschabe.*

Maders (Kleemanns) Raupenkalender p. 61. no. 171. die *Spillbaummotte.*

Gleditsch Forstwiss. I. p. 395. no. 1. Ph. T. *Evonymella*, die *Spindelstrauchmotte.*

Die Oberflügel weiss mit 50 schwarzen Punkten, und unten braun.

Glaser von schädlichen Raupen (neue Ausg.) p. 44. *Raupe des punktirten Nachtschmetterlings*, Ph. *Evonymella.*

Leske Anfangsgr. der N. G. I. p. 464. no. 23. *Spindelbaummotte.*

Wien. Schmett. p. 138. C. *Krummschnauzichte Schaben*, Ph. T. *Recurvipalpes:* no. 18. *Spindelbaumschabenraupe* (Evonymi Europaei); *Spindelbaumschabe.* T. *Evonymella* L.

Bekm. Epit. S. L. p. 168. no. 350. Ph. T. *Evonymella.*

Onomat. hist. nat. VI. p. 358. die *Spillbaummotte.*

Catholicon E. p. 311. *Evonymella.*

Syftem.

*) Das *Linnéische* Zitatum: *Frisch* V. t. 16. gehört nicht hieher, sondern zu der folgenden, Padella.

Syſtem. Nat. du Regn. Anim. II. p. 159. no. 81.
Phaléne de Chenille, qui vit en commun ſur le Poirier, le Cerifier, & autres arbres, & qui en ravage toutes les feuilles.

Réaumur Inſ. II. t. 12. f. 12. 13. I. t. 17. f. 10. 11. La Chenille du *Fuſain;* le *petit deuil.*

Raj. Hiſt. Inſ. p. 196. *Phalaena* parva, alis longis, lividis ſeu plumbeis, exterioribus punctis nigris, inferioribus fuſcis.

Act. Upſal. 1736. p. 26. no. 81. Papilio alis depreſſis argenteis, nigro-punctatis.

Scop. Entom. carn. p. 241. no. 631. Ph. T. *Evonymella.*
Alae anticae ſupra albae, punctis nigris ad (27).
Long. lin. $5\frac{1}{4}$.

Fabric. S. E. p. 656. no. 4. Ph. T. *Evonymella.* Nom. *Linn.*
Larva gregaria, nuda, flava, nigro-punctata, ſub tentorio communi.
Pupa folliculata, brunnea.

— Spec. Inſ. II. p. 290. no. 6. T. *Evonymella.*

Geoffr. Inſ. p. 183. no. 4. *Tinea* alis ſuperioribus, albis punctis nigris, inferioribus fuſcis.
La *Teigne blanche à points noirs.*
Long. $4\frac{1}{2}$ lign.

Müllerí Faun. Fridr. p. 55. no. 487. Ph. T. *Evonymella.* Nom. *Linn.*

— Zool. Dan. Prodr. p. 133. no. 1542. Ph. T. *Evonymella.*

351. *Padella*, die *Obſtmotte.*
Müller l. c. p. 737. no. 351. die *Obſtmotte.*
Füeßl. ſchweiz. Inſ. p. 42. no. 818. T. *Padella.*

Füeßl. Magazin der Entomol. 2 B. p. 39. Ph. T. *Padella.*

Friſch Inſ. V. p. 38. no. 16. 2 Pl. t. 16. *von den geſelligen Blattmotten und ihren Papilions.*

Röſels Inſektenbel. I. NV. 4te Kl. p. 17. t. 7. die *graue geſellige Heckenſchabe, oder Schabenraupe, mit dem großen Gewebe.*

Wien. Schmett. p. 139. C. no. 33. *Vogelkirſchenſchabenraupe* (Padi Pruni); *Vogelkirſchenſchabe.* T. *Padella* L.

Gleditſch Forſtwiſſ. II. p. 789. no. 19. P. T. *Padella, Patſcherbenmotte.*

Bekm. Epit. S. L. p. 168. no. 351. Tin. *Padella.*

Scop. Ent. carn. p. 247. no. 636. Ph. T. *Padella.*

Similis *Evonymellae*, ſed diverſa, 1) punctis paucioribus, nec ultra (20), 2) alis anticis minus albis, ſubtus ubique fuſcis; 3) alis poſticis utrinque fuſcis totis.

Long. lin. $4\frac{1}{2}$.

Fabric. S. E. p. 656. no. 5. Tin. *Padella.* Nom. *Linn.*

Larva gregaria, nuda, griſea; ſegmentis utrinque puncto atro, ſub tentorio communi.

Pupa folliculata, flavicans.

— Spec. Inſ. II. p. 290. no. 7. Tin. *Padella.*

Schaeff. Icon. t. 145. f. 2. 3.

Müllerі Faun. Fridr. p. 55. no. 488. Tin. *Padella.* Nom. *Linn.*

— Zool. Dan. Pr. p. 133. no. 1543. Tin. *Padella.*

Degeer Inſ. II. p. 479. no. 1. t. 10. f. 14. 15. 16.

Phaléne à antennes filiformes, à trompe, à ailes pendantes, d'un gris-de-perle cendré à vingt points noirs.

Phaléne petit-deuil cendré à 20 points noirs.

Che-

Chenilles rafes couleur d'ardoife, dont les deux extremités du corps ſont jaunes, avec deux rangs de taches noires & à ſeize pattes: fig. 10.
— Ueberſ. II Th. I B. p. 354. no. 1. t. 10. f. 10. 14. 15. 16.
Die kleine aſchfarbige Trauerphaläne mit zwanzig ſchwarzen Punkten.

352. *Sequella*, die *Krummlinie.*
Müller l. c. p. 737. no. 352. der *Krummbalken.*
Wien. Schmett. p. 140. C. no. 55. *Steinſamenſchabenraupe* (Lithoſpermi purpurei coerulei); *Steinſamenſchabe.* T. *Sequella* L.
Fabric. S. E. p. 657. no. 7. T. *Sequella.* N. *Linn.*
— Spec. Inſ. II. p. 291. no. 9. Tin. *Sequella.*
Clerk Phal. t. 10. f. 14.

353. *Crataegella*, *Hagedornmotte.* *)
Müller l. c. p. 737. no. 353. die *Hagedornmotte.*
Wien. Schmett. p. 142. D. no. 7. *Hagedornſchabenraupe* (Crataegi Oxyacanthae); *Hagedornſchabe.* T. *Crataegella* L.

354. *Irrorella*, der *Dreypunkt.*
Müller l. c. p. 737. no. 354. die *Pomeranzenmotte.*
Füeßl. ſchweiz. Inſ. p. 42. no. 819. Tin. *Irrorella.*
Wien. Schmett. p. 68. C. *Spindelraupen*, Larvae *Fuſiformes; Schabenartige Eulen*, Ph. Noct. *Tineiformes:* no. 6. *Baumflechteneulenraupe* (Lichenis olivacei etc.); *Baumflechteneule.* N. *Irrorea* (Tin. *Irrorella* L.).
Sulzers Geſch. der Inſ. p. 162. t. 23. f. 10. die *Pomeranzenmotte.*

*) *Nicht abgebildet.*

Fabric. S. E. p. 657. no. 9. Tin. *Irrorella.* Nom. *Linn.*

— Spec. Inſ. II. p. 291. no. 11. Tin. *Irrorella.*

Mülleri Zool. Dan. Pr. p. 138. no. 1606. b. Tin. *Irrorella.* Nom. *Linn.*

Degeer Inſ. Tom. II. P. I. p. 342. t. 5. f. 12.

Phaléne à antennes barbues, à trompe; à ailes rabatues arrondies d'un jaune d'ocre clair, picquées de points noirs, dont le corps eſt noir & le bout du ventre jaune.

Phaléne jaune à points noirs.

— *Ueberſ.* II Th. I B. p. 248. t. 5. f. 12. die *gelbe ſchwarzpunktirte Motte.*

355. *Lutarella*, die *Leimfarbige Motte.*

Müller l. c. p. 737. no. 355. die *Gelblingin.*

Wien. Schmett. p. 68. C. no. 3. *Steinflechtenculenraupe* (Lichenis ſaxatilis); *Steinflechteneule.* Noct. *Luteola* (Tin. *Lutarella* L.)

Clerk Phal. t. 4. f. 9.

Fabric. S. E. p. 657. no. 10. Tin. *Lutarella.*

Alis ſupra luteis, immaculatis, ſubtus fuſcis.

— Spec. Inſ. II. p. 291. no. 13. Tin. *Lutarella.*

Mülleri Faun. Fridr. p. 55. no. 486. Tin. *Lutarella.* Nom. *Linn.*

— Zool. Dan. Pr. p. 134. no. 1559. Tin. *Lutarella.*

356. *Meſomella*, die *Grasmotte.*

Müller l. c. p. 738. no. 356. *Grasmotte.*

Füeßl. ſchweiz. Inſ. p. 42. no. 820. Ph. *Meſomella.*

Clerk Phal. t. 4. f. 14.

Fabric. S. E. p. 657. no. 11. Tin. *Meſomella.* Nom. *Linn.*

— Spec. Inſ. II. p. 292. no. 14.

Alis

Alis anticis pallidis, margine flavo, punctisque duobus fuscis.

357. *Oxyacanthella*, die *Weißdornmotte.* *)

Müller l. c. p. 738. no. 357. *Weisdornmotte.*

Fabric. S. E. p. 657. no. 12. Tin. *Oxyacanthella.* Nom. *Linn.*

— Spec. Inf. II. p. 292. no. 15. Tin. *Oxyacanthella.*

358. *Pinetella*, die *Fichtenmotte.*

Müller l. c. p. 738. no. 358. *Fichtenmotte.*

Wien. Schmett. p. 134. B. no. 7. *Föhrenschabenraupe* (Pini sylvestris); *Föhrenschabe.* Tin. *Pinetella* L.

Gleditsch Forstwiss. I. p. 503. no. 8. Ph. Tin. *Pinetella*, die *gelbe Fichtenmotte.*

Knochs Beytr. I. p. 69. t. 4. f. 7. Ph. Tin. *Pinetella*, die *Fichtenmotte.*

Alis anticis pallide aurantiis; alba pyramide longitudinali fasciis binis colore alae interrupta.

Scop. Entom. carn. p. 244. no. 622. Ph. *Pinetella.*

Alae anticae ut in Pascuella; sed alba pyramide longitudinali, fasciis binis colore alae interrupta.

Long. lin. 5.

Fabric. S. E. p. 657. no. 13. Tin. *Pinetella.* Nom. *Linn.*

— Spec. Inf. II. p. 292. no. 16. Tin. *Pinetella.*

Mülleri Zool. Dan. Pr. p. 133. no. 1544. Tin. *Pinetella.* Nom. L.

359. *Pascuella*, die *Futterkrautmotte.* **)

Müller l. c. p. 738. no. 359. die *Futtermotte.*

*) *Nicht abgebildet.* **) *Nicht abgebildet.*

Wien. Schmett. p. 134. B. no. 4. *Unbek.* R. *Bleichgelbe Schabe mit einer geraden Silberſtreife.*

Scop. Ent. carn. p. 244. no. 621. Ph. *Paſcuella.*

Alae anticae pallide aurantiae; linea alba longitudinali, a baſi fere ad limbum usque producta, utrinque acuminata, inferiore latere dente in medio inſtructa; linea limbi transverſa, aliaque marginali argenteis; area his interjecta cinerea; apice introrſum plicata.

Long. lin. 5.

Fabric. S. E. p. 658. no. 15. Tin. *Paſcuella.*

Alis cinereis, linea albiſſima, margine poſtico, nigro-punctato.

— Spec. Inſ. II. p. 292. no. 18. Tin. *Paſcuella.*

Müller Zool. Dan. Pr. p. 134. no. 1545. Tin. *Paſcuella.* Nom. *Linn.*

Degeer Inſ. Tom. II. Part. I. p. 465. no. 2.

Phaléne à antennes filiformes, à trompe, à ailes roulées d'un blanc jaunâtre avec des lignes longitudinales argentées, à barbillons allongés.

Phaléne à ailes roulées blancheâtres, à lignes argentées.

— *Ueberſ.* II Th. I B. p. 342. no. 2. die *Phaläne mit weifslichen zuſammengerollten Flügeln mit Silberfarbigen Linien.*

360. *Pratella*, die *Wieſenmotte.*

Müller l. c. p. 738. no. 360. die *Wieſenmotte.*

Füeſsl. ſchweiz. Inſ. p. 24. no. 821. Ph. *Pratella.*

Wien. Schmett. p. 135. B. no. 29. *Unbekannte Raupe; graue mit Silber geradgeſtrichte Schabe.*

Clerk Phal. t. 3. f. 14. (male).

Syſt. Natur. du Regn. Anim. II. p. 163. no. 98.

Fabric. S. E. p. 658. no. 14. Tinea *Pratella.* Nom. *Linn.*

Fabric.

Fabric. Spec. Inſ. II. p. 292. no. 17. Tin. *Pratella.*
Müllleri Faun. Fridr. p. 55. no. 491. Tin. *Pratella.* Nom. *Linn.*
— Zool. Dan. Pr. p. 134. no. 1546. Tin. *Pratella.*
Degeer Inſ. Tom. II. P. I. p. 464. no. 1.
Phaléne à antennes filiformes, à trompe, à ailes roulées d'un blanc argentés en deſſus & d'un brun griſeâtre en deſſous.
Phaléne *argentée à ailes roulées.*
— *Ueberſ.* II Th. I B. p. 341. no. 1. die *Silberphaläne mit zuſammengerollten Flügeln.*

361. *Culmella*, die *Halmenmotte.*

Müller l. c. p. 739. no. 361. *Halmenmotte.*
Füeſsl. ſchweiz. Inſ. p. 42. no. 822. Phal. *Culmella.*
Wien. Schmett. p. 134. B. no. 9. *Wurzelſchabenraupe* (Radicum graminis); *Wurzelſchabe.* T. *Culmella* L.
Suſt. Nat. du Regn. Anim. II. p. 162. no. 97.
Schaeff. Icon. t. 145. f. 1. 2.
Raj. Hiſt. Inſ. p. 229. no. 106.
Phalaena minor paſcuorum gemina proboſcide, alis oblongis, cum ſedet, circumvolutis, exterioribus ex argenteo luteſcentibus vel argenteis vel plumbeis.
Act. Upſal. 1736. p. 26. no. 82. Papilio alis depreſſis cuneiformibus oblongis ſtriatis.
Scop. Entom. carn. p. 246. no. 630. Phal. *Culmella.*
Albida tota et immaculata; alis poſticis fimbria argentea; oculis nigris.
Long. lin. $4\frac{1}{3}$.
Fabric. S. E. p. 658. no. 16. T. *Culmella.*
Alis cinereis; linea unica albiſſima, abbreviata.

Fabric. Spec. Inſ. II. p. 233. no. 19. Tin. *Culmella.*

Müllerí Zool. Dan. Pr. p. 134. no. 1549. Tin. *Culmella.* Nom. *Linn.*

362. *Rorella*, die *Thaumotte.* *)

Müller l. c. p. 739. no. 362. *Thaumotte.*

363. *Carnella*, der *Blutrand.*

Müller l. c. p. 739. no. 363. *Fleiſchrolle.*

Füeſsl. ſchweiz. Inſ. p. 42. no. 823. Tin. *Carnella.*

— Magaz. der Entomol. II B. p. 107.

Wien. Schmett. p. 138. C. no. 13. Unbekannte Raupe; *roſenrothe und gelbe Schabe.*

Naturforſch. III St p. 7. t. 1. f. 6. die *Roſenrothe Binde*, Faſcia Roſea. (D. *Kühn.*)

Sulzers Geſch. der Inſ. p. 162. t. 23. f. 12. die *Fleiſchrolle.*

Schaeff. Icon. t. 247. f. 2. 3.

Fabric. S. E. p. 658. no. 18. Tin. *Carnella.* Nom. *Linn.*

— Spec. Inſ. II. p. 293. no. 21. Tin. *Carnella.*

364. *Nemorella*, die *Waldmotte.* **)

Müller l. c. p. 739. no. 264. *Waldmotte.*

Gleditſch Forſtwiſſ. II. p. 939. no. 3. *die weißliche Waldmotte mit gekrümmten Flügeln, wovon die obern am innern Rande einen ſchwarzen Punkt haben.*

Müllerí Faun. Fridr. p. 55. no. 492. Tin. *Nemorella.* Nom. *Linn.*

— Zool. Dan. Pr. p. 134. no. 1547. Tin. *Nemorella.*

365. *Un-*

*) *Nicht abgebildet.* **) *Nicht abgebildet.*

365. *Unguicella*, der *Nagelflügel.*

Müller l. c. p. 739. no. 365. *Nagelflügel.*
Clerk Phal. t. 12. f. 7.
Syst. Nat. du Regn. Anim. II. p. 159. no. 80.
Fabric. S. E. p. 654. no. 51. *Pyralis unguicana.* Nom. *Linn.*
— Spec. Inf. II. p. 287. no. 70. *Pyralis unguicana.*

366. *Ramella*, die *Eichenmotte.* *)

Müller l. c. p. 740. no. 366. *Eichenmotte.*
Gleditsch Forstwiss. I. p. 657. no. 46. Tinea *Ramella*, die *kleine weißgraue Sprossenschabe.*

367. *Salicella*, die *Weidenmotte.*

Müller l. c. p. 740. no. 367. t. 22. f. 16. *Weidenmotte.*
Füeßl. schweiz. Inf. p. 42. no. 824. Tin. *Salicella.*
Röfels Insektenbel. I. NV. 4te Kl. p. 20. t. 9. *der auf Weidenbäumen wohnende schwarze und mit weißen Punkten besetzte Blattwickler.*
Maders (Kleem.) Raupenkal. p. 39. no. 102. p. 62. no. 172. Tin. *Salicella*, *Weidenmotte.*
Gleditsch Forstwiss. II. p. 785. no. 83. Tin. *Salicella*, die *kleine blaugraue weißpunktirte Weidenmotte.*
Wien. Schmett. p. 131. E. no. 37. *Bandweidenwicklerraupe* (Salicis viminalis); *Bandweidenwickler.* Tortr. *Salicana.*
Sulzers Kennz. t. 16. f. 97.
Fabric. S. E. p. 659. no. 21. Tin. *Salicella.* Nom. *Linn.*
Larva nuda, 16-poda, fusca, albo-punctata.
Pupa antice nigra, postice brunnea.

*) *Nicht abgebildet.*

Fabric. Spec. Inſ. II. p. 294. no. 27. Tin. *Salicella.*

368. *Cynosbatella*, die *Roſenmotte.*

Müller l. c. p. 740. no. 368. *Roſenmotte.*
Füeßl. ſchweiz. Inſ. p. 42. no. 825. Tin. *Cynosbatella.*
Gleditſch Forſtwiſſ. II. p. 1033. no. 5. Tin. *Cynosbatella*, die *graue Knoſpenmotte der Heckroſen mit weißen Flügelſpitzen und einem ſchwarzen Punkt.*
Fabric. S. E. p. 654. no. 54. *Pyralis Cynosbana.* Nom. *Linn.*
— Spec. Inſ. II. p. 287. no. 74. Pyr. *Cynosbana.*
Mülleri Faun. Fr. p. 56. no. 494. Tin. *Cynosbatella.* Nom. *Linn.*
— Zool. Dan. Pr. p. 134. no. 1548. Tin. *Cynosbatella.*
Degeer Inſ. I. t. 34. f. 4. 5.
— *Ueberſ.* I. 3 Quart. p. 76.
— Tom. II. Part. I. p. 486. no. 5.
Phaléne à antennes filiformes, à trompe, à ailes pendantes d'un brun noirâtre par devant & blanches par derriere avec des taches brunes, à corcelet non-huppé.
Phaléne brune par devant & blanche par derriere à taches brunes.
— *Ueberſ.* II Th. I B. p. 359. no. 5. die *braungefleckte, vorn braune und hinten weiße Phaläne.*

369. *Foenella*, die *Heumotte.*

Müller l. c. p. 740. no. 369. *Heumotte.*
Füeßl. ſchweiz. Inſ. p. 42. no. 826. Tin. *Foenella.*
Clerk Phal. t. 2. f. 13.

Fabric.

Fabric. S. E. p. 659. no. 22. Tin. *Foenella.* Nom. *Linn.*

— Spec. Inſ. II. p. 294. no. 29. Tin. *Foenella.*

Müllerí Faun. Fridr. p. 58. no. 517. Tin. *Foenella.* Nom. *Linn.*

— Zool. Dan. Pr. p. 134. no. 1550. Tin. *Foenella.*

370. *Veſtianella*, die *Tuchmotte.* *)

Müller l. c. p. 740. no. 370. *Tuchmotte.*

Fiſchers Naturgeſch. von Livland p. 154. no. 373. *Tuchmotte.*

Scop. Ent. carn. p. 256. no. 669. Ph. *Veſtianella.*
Alae cineraſcentes; coſta alba.
Long. lin. $3\frac{1}{2}$.

Fabric. S. E. p. 660. no. 25. Tin. *Veſtianella.* Nom. *Linn.*

— Spec. Inſ. II. p. 295. no. 32. Tin. *Veſtianella.*

371. *Tapetzella*, die *Tapetenmotte.*

Müller l. c. p. 741. no. 371. *Tapetenmotte.*

Fiſchers N. G. von Livland p. 155. no. 374. *Tapetenmotte.*

Wien. Schmett. p. 142. D. no. 13. *Tapetenſchabenraupe* (Tapetium etc.); *Tapetenſchabe.* T. *Tapetzella* L.

Raj. Hiſt. Inſ. p. 204. no. 98. *Tinea* veſtivora major, alis oblongis acutis; exterioribus ad ſcapulas nigricantibus, inferius albentibus, interioribus fuſcis ſive cinereis.

Syſt. Nat. du Regn. Anim. II. p. 160. no. 82.

Clerk Phal. t. 11. f. 12.

Geoffr. Inſ. II. p. 187. no. 13.
Tinea nigra, capite niveo, alis pone albidis.
La *Teigne bedaude à tête blanche.*
Long.

*) *Nicht abgebildet.*

Long. 4½ lign.

Fabric. S. E. p. 659. no. 23. Tin. *Tapetzella.* Alis nigris, poſtice albis, capite niveo.

— Spec. Inſ. II. p. 295. no. 30. Tin. *Tapetzella.* *)

Müller Faun. Fridr. p. 56. no. 503. Tin. *Tapetzella.* Nom. *Linn.*

— Zool. Dan. Pr. p. 134. no. 1552. Tin. *Tapetzella.*

372. *Pellionella*, die *Pelzmotte.* **)

Müller l. c. p. 741. no. 372. *Pelzmotte.*

Füeßl. ſchweiz. Inſ. p. 42. no. 827. Tin. *Pellionella.*

Röſels Inſektenbel. I. NV. 4te Kl. p. 46. t. 17. die *dem Pelzwerk ſehr ſchädliche Schabenraupe.*

Maders (Kleem.) Raupenkal. p. 119. no. 336. Tin. *Pellionella.*

Neuer Schaupl. der Nat. I B. p. 144. VI. p. 406. *Pelzmotte.*

Olaffens Reiſe durch Iſland I. p. 320. *Pelzmotte.*

Allgem. Magaz. der Nat. X. p. 365. *Pelzmotte.*

Fiſchers N. G. von Livland p. 155. no. 375. die *Pelzmotte.*

Eberts Naturl. für die Jug. III. p. 95.

Leske Anfangsgr. der N. G. I. p. 464. no. 24. *Pelzmotte.*

Der *Dronth.* Geſellſch. Schr. IV. p. 286. no. 48. Tin. *Pellionella.*

Onomat.

*) Die vom Fabricius hierbey angeführte zwote Untergattung des *Geoffroy* no. 14. la Teigne bedaude à tête brune, iſt Linn. Ph. Tortr. *Faſciana* no. 283. (*Wien. Schmett.* p. 131. no. 36.)

**) Conf. *Scop.* Tin. *Zoolegella:* Ent. carn. no. 666. *forte eadem*, ſed Tinea haec Scop. non eſt cana. v. unter den *neuen* no. 196.

Onomat. hiſt. nat. VI. p. 395. *Pelzſchabe.*

Syſt. Nat. du Regn. Anim. II. p. 160. no. 84. Teigne, qui ronge les habits à poils.

Geoffr. Inſ. II. p. 184. no. 6.

Tinea plumbea nitida, puncto nigro in medio alarum.

La *Teigne commune.*

Long. 2 lign.

Fabric. S. E. p. 659. no. 24. Tin. *Pellionella.* Nom. *Linn.*

Larva albicans, linea dorſali rubra, intra cucullum latitans.

Pupa flaveſcens.

— Spec. Inſ. II. p. 295. no. 31. Tin. *Pellionella.*

Mülleri Faun. Fridr. p. 57. no. 504. Tin. *Pellionella.* Nom. *Linn.*

— Zool. Dan. Pr. p. 134. no. 1553. Tin. *Pellionella.*

373. *Sarcitella*, die *Kleidermotte.*

Müller l. c. p. 741. no. 373. *Kleidermotte.*

Füeſsl. ſchweiz. Inſ. p. 42. no. 828. Tin. *Sarcitella.* In den *Kleiderſchränken.*

Röſels Inſektenbel. I. NV. 4te Kl. p. 41. t. 15. *die den Inſektenſammlungen höchſt ſchädliche Schabenraupe.*

Neuer Schaupl. der Nat. I. p. 143. *Tuchaftermotten.*

Maders (Kleem.) Raupenkal. p. 119. no. 336. Tin. *Sarcitella.* *)

Wien. Schmett. p. 139. C. no. 41. *Kleiderſchabenraupe*

*) Hier wird die auf t. 17. im Röſel abgebildete Motte für Pellionella und Sarcitella angegeben, da doch t. 15. eigentlich die Sarcitella iſt.

pe (Veſtimentorum); *Kleiderſchabe.* Tin. *Sarcitella* L.

Fiſchers N. G. von Livland p. 155. no. 376. *Kleidermotte.*

Leske Anfangsgr. der N. G. I. p. 464. no. 25. *Kleidermotte.*

Berlin. Samml. VII. p. 613. Mittel gegen die *Kleidermotten.*

Suſt. Nat. du Regn. Anim. II. p. 160. no. 83.

Fabric. S. E. p. 660. no. 26. Tin. *Sarcitella.* Nom. *Linn.*

Parva; tota cinerea, nitida.

— Spec. Inſ. II. p. 295. no. 33. Tin. *Sarcitella.*

374. *Niſella*, der *Eyerfleck.*

Müller l. c. p. 741. no. 374. *Eyerfleck.*

Scop. Ent. carn. p. 247. no. 634. Tin. *Niſella.*

Alae anticae caneſcentes; macula communi *ovata* nigricante.

In *Sylvis.*

Long. lin. $4\frac{3}{4}$.

Clerk Phal. t. 12. f. 6.

375. *Mellonella*, der *Honiglecker.* *)

Müller l. c. p. 741. no. 375. *Honiglecker.*

Füeſsl. ſchweiz. Inſ. p. 42. no. 829. Tin. *Mellonella.* In den *Bienenkörben* und im *Wachstuch.*

Röſels Inſektenbel. III. p. 242. t. 41. die zu der NV. 4ter Kl. gehörige *Bienenſchabe.*

Swammerd. Bib. der Nat. Fol. p. 208. t. 26. f. 2. der *Wolf in den Bienenkörben.*

Neuer

*) Dieſe Art Motten nennet *Columella* Lib. 3. cap. 14. Vermiculos ac Tineas. *Virgil.* Georg. 4. Dirum Tineae genus. *Plin.* H. N. Lib. XI. c. 19. Papilionem ignavum.

Deſtruuntur fumo fimi mixti cum medulla bovina.

Neuer Schaupl. der Nat. I B. p. 142. *Aftermotte; Bienenmotte; Bienenſchabe; Bienenfalter;* Fauſſe-teigne de la cire; *Wolf.*

Wien. Schmett. p. 134. B. no. 2. *Honigſchabenraupe* (Mellis in Alvearibus); *Honigſchabe.* T. *Mellonella* L.

Bonnets Betr. über die Natur p. 457. *Aftermotten.*

Eberts Naturl. für die Jug. III. p. 95.

Abhandl. der ſchwed. Geſ. der Wiſſ. 24 B. p. 24. Unterſ. und Beſchr. einer der Bienenzucht höchſt ſchädlichen Raupe und des daraus entſtehenden Schmetterlings, von Adolph *Modeer.* t. 1. f. 1-12. Tin. *Mellonella* L.

Blumenbachs Handb. der N. G. I. p. 372. no. 19. Tin. *Mellonella.*

Bekm. Epit. S. L. p. 168. no. 375. Tin. *Mellonella.*

Scop. Ann. 4. hiſt. nat. p. 40. obſ. 15. Tinea *Mellonella.*

Fabric. S. E. p. 660. no. 28. Tin. *Mellonella.* Nom. *Linn.*

Larva nuda, 16-poda, griſea, capite brunneo.

Pupa folliculata, brunnea.

— Spec. Inſ. II. p. 296. no. 36. Tin. *Mellonella.*

376. *Cucullatella*, die *Sperbermotte.*

Müller l. c. p. 742. no. 376. *Sperbermotte.*

Füeſsl. ſchweiz. Inſ. p. 42. no. 830. Tin. *Cucullatella.* Auf *Birn- und Apfelblättern.*

— Magaz. der Entomol. II. p. 39. Tin. *Cucullatella.*

Röſels Inſektenbel. I. NV. 4te Kl. p. 24. t. 11. das kleine, braune, haarige Apfelbaumräuplein mit weiſsen Schildern.

Gleditſch

Gleditſch Forſtwiſſ. II. p. 848. no. 3. Tinea *Cucullatella*, die *weiſse Vogelbeerbaummotte.*

Onomat. Hiſt. nat. VI. p. 346. die *Sperbermotte.*

Fabric. S. E. p. 660. no. 29. Tin. *Cucullatella.*

Alis argenteis; arcu dorſali fuſco.

Larva piloſa, 14-poda, fuſca; dorſo albo maculato.

Pupa folliculata, obtuſa, fuſca.

— Spec. Inſ. II. p. 296. no. 37. Tin. *Cucullatella*

377. *Granella*, die *Kornmotte.**)

Müller l. c. p. 742. no. 377. *Kornwurm.*

Füeſsl. ſchweiz. Inſ. p. 42. no. 831. Tin. *Granella.*

Röſels Inſektenbel. I. NV. 4te Kl. p. 25. t. 12. der ſchädliche, wohlbekannte, *weiſse Kornwurm.*

Maders (Kleem.) Raupenkal. p. 78. no. 223. p. 89. no. 257. Tin. *Granella*, der *Kornwurm.*

Bakers zum Gebrauch leicht gemachtes Microſcopium p. 236. t. XI. f. 13. AB. *Wolf im Korn.*

Bonnets Betr. über die Natur p. 458. *Aftermotten auf den Kornböden.*

Berlin. Samml. IV. p. 341. *Kornwurm* no. 1.

Martini Naturlex. I. 634. *Getreideaftermotten; der Wolf; der weiſse Kornwurm.* Tin. *Granella.*

Abhandl. der königl. ſchwed. Geſ. der Wiſſ. VIII. p. 49. t. 1. f. 1-4. *Raupe.* Beſchr. kleiner *weiſſer Raupen*, welche das Korn auf Böden und Vorrathsbehältniſſen verzehren. (Carl *Degeer.*)

Oekonomiſche Nachr. der patriotiſchen Geſ. in Schleſien I. p. 159. *Kornmotte.*

— II. p. 119. *Kornmotte.*

Neuer

*) Ich nenne ſie lieber *Kornmotte*, um ſie von dem *Kornwurm*, Curculio granarius et frumentarius, zu unterſcheiden.

Neuer Schaupl. der Nat. I. p. 144. *Kornmotten.*
Eberts Naturl. für die Jugend III. p. 95.
Blumenbachs Handb. der N. G. I. p. 372. no. 20. Tin. *Granella, Wolf; weißer Kornwurm.*
Wien. Schmett. p. 144. C. no. 77. *Kornſchabenraupe* (Frumenti in Granariis); *Kornſchabe.* Tin. *Granella* L.
Loevenhoek Opp. Tom. II. Arcana Nat. detecta p. 241-252. f. 2. A A. *Lupus.*
Tiburtius von den Kornmotten. Berlin. 12. 1665.
Bekm. Epit. S. L. p. 168. no. 377. Tin. *Granella, weißer Kornwurm; Wolf.*
Bomar. Dict. des Anim. IV. 313. VIII. 245. Fauſſe-Teigne du Bled.
Fabric. S. E. p. 668. no. 8. *Alucita granella.* Nom. *Linn.*
Larva 16-poda, nuda, alba, capite brunneo.
Pupa folliculata, attenuata, brunnea.
— Spec. Inſ. II. p. 307. no. 10. *Alucita granella.*
Geoffr. Inſ. II. p. 186. no. 11.
Tinea rota fuſco-nebuloſa, capite albido.
La *Teigne brune à tête blanchâtre.*
Long. $3\frac{2}{3}$ lign.
Müllers Zool. Dan. Pr. p. 134. no. 1556. Tin. *granella.* Nom. *Linn.*

378. *Lappella*, die *Klettenmotte.*

Müller l. c. p. 742. no. 378. *Klettenmotte.*
Abhandl. der königl. ſchwed. Geſ. der Wiſſ. XIV. p. 72. der *Klettenſchmetterling* (von *Renſtröm*).
Phalaena ſeticornis, ſpirilinguis, alis incumbentibus; ſuperioribus cinereo-griſeis, puncto atro; inferioribus atris, omnibus margine poſtico interiore, barbatis.

Wien. Schmett. p. 142. D. no. 12. *Klettenſchabenraupe* (Arctii Lappae); *Klettenſchabe.* Tin. *Lappella* L.

Clerk Phal. t. 11. f. 15.

Fabric. S. E. p. 668. no. 9. *Alucita Lappella* Nom. *Linn.*

— Spec. Inſ. II. p. 308. no. 12. Aluc. *Lappella.*

Mülleri Faun. Fridr. p. 57. no. 510. Tin. *Lappella.* Nom. *Linn.*

— Zool. Dan. Pr. p. 134. no. 1555. Tin. *Lappella.*

379. *Proletella*, die *Muttermotte.* *)

Müller l. c. p. 742. no. 379. *Muttermotte.*

Füeßl. ſchweiz. Inſ. p. 42. no. 832. Tin. *Proletella.* Auf der Unterſeite des *Kohls.*

Sulzers Geſch. der Inſ. p. 163. t. 23. f. 17. *Muttermotte.*

380. *Arbutella*, *Bärentraubenmotte.* **)

Müller l. c. p. 742. no. 380. *Bärentraubenmotte.*

Cathol. A. p. 446. *Arbutella*, *Sandbeerenmotte.*

Fabric. S. E. p. 661. no. 30. Tin. *Arbutella.*

Alis rufis, ſtrigis argenteis, intermediis bifidis.

— Spec. Inſ. II. p. 296. no. 39. Tin. *Arbutella.*

Mülleri Faun. Fr. p. 56. no. 496. Tin. *Arbutella.* Nom. *Linn.*

— Zool. Dan. Pr. p. 134. no. 1557. Tin. *Arbutella.*

381. *Teſſella*, die *Würfelmotte.* ***)

Müller l. c. p. 742. no. 381. *Würfelmotte.*

Füeßl.

*) Parit quotannis 200000 ſoboles, dum 12 progenies ponant 12 ova ſingula.

**) *Nicht abgebildet.*

***) *Nicht abgebildet.*

Füeßl. ſchweiz. Inſ. p. 42. no. 833. Tin. *Teſſella.*
Gleditſch Forſtwiſſ. II. p. 978. no. 25. Tin. *Teſſella.*
Die ſchwarzgeflügelte Motte mit zwey weiſſen weit aus einander ſtehenden *gewürfelten* Binden.
Franz von Paula *Schrank* Beytr. zur Naturgeſch. p. 81. *Würfelmotte.* Tin. *Teſſella.*
Der *Dronth.* Geſellſch. Schr. IV. p. 287. no. 49. Tin. *Teſſella.*
Syſt. Nat. du Regn. Anim. II. p. 161. no. 87.
Fabric. S. E. p. 661. no. 31. Tin. *Teſſella.* Nom. *Linn.*
— Spec. Inſ. II. p. 296. no. 40. T. *Teſſella.*
Müllеri Zool. Dan. Pr. p. 134. no. 1560. Tin. *Teſſella.*

382. *Vittella*, die *Schwarzbinde.*

Müller l. c. p. 743. no. 382. *Schwarzlinie.*
Wien. Schmett. p. 136. B. no. 42. *Ubekannte Raupe; Aſchgraue Schabe mit ſchwarzem Innenrande.* T. *Vittella* L.
Clerk Phal. t. 15. f. 10.
Fabric. S. E. p. 668. no. 6. *Alucita Vittella.*
Alis cinereis; *vitta* dorſali margineque poſtico nigris.
— Spec. Inſ. II. p. 307. no. 7. Aluc. *vittella.*
In *Lipſiae* hortis.
Müllеri Faun. Fridr. p. 55. no. 489. Tin. *vittella.* Nom. *Linn.*
— Zool. Dan. Pr. p. 134. no. 1554. Tin. *vittella.*

383. *Uſtella*, der *Brandrand.*

Müller l. c. p. 743. no. 383. *Brandrand.*
Clerk Phal. t. 3. f. 13.

384. *Parenthesella*, die *Weifslinie.* *)

Müller l. c. p. 743. no. 384. *Weifslinie.*
Füefsl. fchweiz. Inf. p. 42. no. 834. Tin. *Parenthesella.* Auf den *Viehweiden.*
Fabric. S. E. p. 661. no. 33. Tin. *Parenthesella.* Nom. *Linn.*
— Spec. Inf. II. p. 297. no. 43. Tin. *Parenthesella.*

385. *Elongella*, der *Schmalflügel.* **)

Müller l. c. p. 743. no. 385. *Schmalflügel.*
Wien. Schmett. p. 141. C. no. 67. *Unbek. Raupe; Beinfarbige Schabe.* Tin. *Elongella* L.
Fabric. Mantiff. p. 295. no. 33-34. Tin. *Elongella.* Nom. *Linn.*
— Spec. Inf. II. p. 297. no. 44. Tin. *Elongella.*
Mülleri Faun. Fridr. p. 58. no. 514. Tin. *Elongella.* Nom. *Linn.*
— Zool. Dan. Pr. p. 135. no. 1564. Tin. *Elongella.*

386. *Punctella*, der *Punktflügel.* ***)

Müller l. c. p. 743. no. 386. *Punktflügel.*
Fabric. S. E. p. 661. no. 34. Tin. *Punctella.* Nom. *Linn.*
— Spec. Inf. II. p. 297. no. 46. Tin. *Punctella.*
Mülleri Faun. Fridr. p. 58. no. 515. Tin. *Punctella.* Nom. *Linn.*
— Zool. Dan. Pr. p. 135. no. 1565. Tin. *Punctella.*

387. *Bicostella*, die *Doppelrippe.*

Müller l. c. p. 743. no. 387. *Doppelrippe.*
Clerk Phal. t. 3. f. 15.

Scop.

*) *Nicht abgebildet.* **) *Nicht abgebildet.*
***) *Nicht abgebildet.*

Scop. Entom. carn. p. 249. no. 642. *Phal. bicoſtella.*

Caput, dorſum, alae anticae, alba; linea longitudinali ferruginea a baſi ad apicem excurrente prope marginem craſſiorem; diſco punctis ſubternis atris.

Circa *Idriam.*

Long. lin. 5.

Fabric. S. E. p. 661. no. 32. Tin. *bicoſtella.*

Alis cinereis, linea longitudinali fuſca, palpis porrectis.

— Spec. Inſ. II. p. 297. no. 42. Tin. *bicoſtella.*

In *Europae* hortis.

Mülleri Zool. Dan. Pr. p. 135. no. 1562. Tin. *bicoſtella.* Nom. *Linn.*

388. *Tetrapodella*, *Vierfuſs.* *)

Müller l. c. p. 744. no. 388. *Vierfuſs.* Auf den *Kirſchbäumen.*

389. *Xyloſtella*, die *Levkogenmotte.*

Müller l. c. p. 744. no. 389. *Levkogenmotte.*

Füeſsl. ſchweiz. Inſ. p. 42. no. 835. Tin. *Xyloſtella.*

Röſels Inſektenbel. I. NV. 4te Kl. p. 22. t. 10. das ſehr kleine *Kohl- und Salatraüplein.*

Maders (Kleem.) Raupenkal. p. 103. no. 294. die *Levkojenmotte.*

Wien. Schmett. p. 137. B. no. 54. *Heckkirſchenſchabenraupe* (Loniceri Xyloſtei); *Heckkirſchenſchabe.* Tin. *Xyloſtella* L.

Der *Dronth. Geſellſch.* Schr. IV. p. 287. no. 50. Tin. *Xyloſtella.*

Gleditſch Forſtwiſſ. II. p. 939. no. 2. Phal. Tinea *Xyloſtella.*

*) *Nicht abgebildet.*

Die aſchgraue *Welpermeymotte* mit einem weiſsen zackichten Flecke.

Syſt. Nat. du Regn. Anim. II. p. 162. no. 99.

Fabric. S. E. p. 667. no. 1. *Alucita Xyloſtella.* Nom. *Linn.*

— Spec. Inſ. II. p. 306. no. 1. Aluc. *Xyloſtella.*

Geoffr. Inſ. II. p. 195. no. 35.

Tinea cinerea, dorſo vitta longitudinali alba.

La *Teigne à bandelette blanche.*

Long. 3 lign.

Müller Zool. Dan. Pr. p. 135. no. 1562. Tin. *Xyloſtella.* Nom. *Linn.*

390. *Cinctella*, die *Pappelmotte.* *)

Müller l. c. p. 744. no. 390. *Pappelmotte.*

Füeſsl. ſchweiz. Inſ. p. 43. no. 836. Tin. *Cinctella.*

Der *Dronth.* Geſellſch. Schr. IV. p. 288. no. 53. Tin. *Cinctella.*

Scop. Ent. carn. p. 252. no. 651. Phal. *Vorticella.*

Nigra, alis anticis faſcia alba lineari.

In *foliis fruticum.*

Long. lin. $2\frac{3}{4}$.

Fabric. S. E. p. 662. no. 36. Tin. *cinctella.*

Alis nigris, anticis ſtriga argentea.

— Spec. Inſ. II. p. 298. no. 48. Tin. *cinctella.*

Müllerі Faun. Fridr. p. 56. no. 495. Tin. *cinctella.* Nom. *Linn.*

— Zool. Dan. Pr. p. 134. no. 1558. Tin. *cinctella.*

391. *Leucatella*, das *Weiſsband.* **)

Müller l. c. p. 744. no. 391. *Weiſsband.*

Wien. Schmett. p. 139. C. no. 42. *Unbekannte Raupe; ſchwärzlichte Schabe mit weiſsem Bande und Punkten.*

Fabric.

*) *Nicht abgebildet.* **) *Nicht abgebildet.*

Fabric. S. E. p. 662. no. 37. Tin. *Leucatella.* Nom. *Linn.*

— Spec. Inſ. II. p. 298. no. 49. Tin. *Leucatella.*

Müllerí Faun. Fridr. p. 58. no. 516. Tin. *Leucatella.* Nom. *Linn.*

— Zool. Dan. Pr. p. 135. no. 1566. Tin. *Leucatella.*

392. *Cinerella*, der *Grauflügel.* *)

Müller l. c. p. 744. no. 392. *Grauflügel.*

Wien. Schmett. p. 138. C. no. 25. *Unbek.* R. *Grauglänzende Schabe.*

Fabric. S. E. p. 662. no. 40. Tin. *Cinerella.*
Alis fuſco-cinereis, nitidulis, immaculatis.

— Spec. Inſ. II. p. 299. no. 55. Tin. *Cinerella.*

Müllerí Zool. Dan. Pr. p. 135. no. 1563. Tin. *Cinerella.* Nom. *Linn.*

393. *Trigonella*, das *Doppeldreyeck.* **)

Müller l. c. p. 745. no. 393. *Doppeldreyeck.*

Der *Dronth. Geſellſch.* Schr. IV. p. 287. no. 81. Tin. *Trigonella.*

Gleditſch Forſtwiſſ. II. p. 978. no. 26. Tin. *Trigonella*, die *braune Motte* mit dem gedoppelten weiſsen dreyeckigen Fleck.

Syſt. Nat. du Regn. Anim. II. p. 163. no. 101.

Fabric. S. E. p. 663. no. 42. Tin. *Trigonella.* Nom. *Linn.*

— Spec. Inſ. II. p. 299. no. 57. Tin. *Trigonella.*

Müllerí Zool. Dan. Pr. p. 135. no. 1567. Tin. *Trigonella.* Nom. *Linn.*

394. *Rhomboïdella*, das *ſchwarze Viereck.* ***)

Müller l. c. p. 745. no. 394. *Schwarzviereck.*

*) *Nicht abgebildet.* **) *Nicht abgebildet.*

***) *Nicht abgebildet.*

Fabric. S. E. p. 663. no. 43. Tin. *Rhomboïdella.* Nom. *Linn.*

— Spec. Inſ. II. p. 299. no. 58. Tin. *Rhomboïdella.*

395. *Tertianella*, die *Dunkelſtreife.* *)

Müller l. c. p. 745. no. 395. *Dunkelſtrich.*

— Faun. Fridr. p. 57. no. 511. Tin. *Tertianella.* Nom. *Linn.*

— Zool. Dan. Pr. p. 135. no. 1568. Tin. *Tertianella.*

396. *Scabrella*, der *Schuppenflügel.* **)

Müller l. c. p. 745. no. 396. *Schuppenflügel.*

Fabric. Mantiſſ. p. 297. no. 10-11. *Alucita Scabrella.*

Alis fuſco-cinereis, punctis nigris elevatis ſcabris.

— Spec. Inſ. II. p. 308. no. 14. Aluc. *Scabrella.*

397. *Aſperella*, der *Schuppenfleck.* ***)

Müller l. c. p. 745. no. 397. *Schuppenfleck.*

Füeßl. ſchweiz. Inſ. p. 43. no. 837. Tin. *Aſperella.*

Wien. Schmett. p. 136. B. no. 46. *Unbekannte Raupe; grünweißlichte Schabe mit gefichelten Oberflügeln.*

Catholicon A. p. 535. *Aſperella*, die *rauhe Motte.*

398. *Serratella*, der *Langſchenkel.* †)

Müller l. c. p. 745. no. 398. *Langſchenkel.*

399. *Populella*, der *Haarflügel.* ††)

Müller

*) *Nicht abgebildet.*
**) *Nicht abgebildet.*
***) *Nicht abgebildet.*
†) *Nicht abgebildet.*
††) *Nicht abgebildet.*

Müller l. c. p. 746. no. 399. *Haarflügel.*

400. *Mercurella*, die *Queckſilbermotte.* *)

Müller l. c. p. 746. no. 400. *Queckſilbermotte.*

401. *Pomonella*, die *Obſtmotte.*

Müller l. c. p. 746. no. 401. *Birnmotte.*

Füeßl. ſchweiz. Inſ. p. 43. no. 835. Tin. *Pomonella.*

Friſch Inſ. VII. p. 16. no. 10. 2te Pl. t. 10. der *Obſtwurm in Birnen und Aepfeln.*

Röſels Inſektenbel. I. NV. 4te Kl. p. 33. t. 13. die *kleine Apfel- und Birnraupe*, oder der ſogenannte Apfel- und Birnenwurm.

Maders (Kleem.) Raupenkal. p. 39. no. 104. p. 62. no. 173. Tin. *Pomonella*, *Birnmotte.*

Gleditſch Forſtwiſſ. II. p. 789. no. 18. Tin. *Pomonella*, die *Birnraupe.*

Wien. Schmett. p. 126. B. no. 10. *Apfelwicklerraupe* (Pyri mali); *Apfelwickler.* T. *Pomonana* (Pomonella L.).

Onomat. hiſt. nat. VI. p. 399. die *Birnmotte.*

Bekm. Ep. S. L. p. 168. no. 401. Tin. *Pomonella.*

Fabric. S. E. p. 653. no. 49. *Pyralis Pomana.* Nom. *Linn.*

Larva 16-poda, nuda, rufa, capite nigro.
Pupa folliculata, brunnea.

— Spec. Inſ. II. p. 286. no. 67. Pyralis *Pomana.*

Mülleri Faun. Fridr. p. 57. no. 505. Tin. *Pomonella.* Nom. *Linn.*

— Zool. Dan. Pr. p. 136. no. 1576. Tin. *Pomonella.*

402. *Strobilella*, die *Tannzapfenmotte.*

Müller l. c. p. 746. no. 402. *Zapfenmotte.*

*) *Nicht abgebildet.*

Füeſsl. ſchweiz. Inſ. p. 43. no. 839. Tin. *Strobilella.*
Gleditſch Forſtwiſſ. I. p. 504. no. 9. Tin. *Strobilella*, *Tannzapfenmotte.*
Wien. Schmett. p. 135. B. no. 24. *Tannzapfenſchabenraupe* (Strobilorum abietis); *Tannzapfenſchabe.* Tin. *Strobilella* L.
Syſt. Nat. du Regn. Anim. II. p. 164. no. 104.
Clerk Phal. t. 12. f. 10.
Fabric. S. E. p. 662. no. 38. Tin. *Strobilella.* Nom. *Linn.*
— Spec. Inſ. II. p. 298. no. 50. Tin. *Strobilella.*
Degeer Inſ. Tom. II. P. I. p. 490. no. 9. t. 9. f. 15. *Phaléne* à antennes filiformes, à trompe, à ailes pendantes d'un brun obſcur avec des rayes transverſes couleur d'agathe. *Petite Phaléne des Pommes de Sapin.*
— *Ueberſ.* II Th. I B. p. 362. no. 9. t. 9. f. 15. die *kleine Tannapfelphaläne.*
Müllerí Faun. Fridr. p. 57. no. 506. Tin. *Strobilella.* Nom. *Linn.*
— Zool. Dan. Pr. p. 136. no. 1577. Tin. *Strobilella.*

403. *Turionella*, die *Anflugmotte.*

Müller l. c. p. 746. no. 403. *Anflugmotte.*
Gleditſch Forſtwiſſ. I. p. 504. no. 10. Tin. *Turionella*, die *Lichtgraue Maywachsmotte.*
Degeer Ueberſ. I Th. 3 Quart. p. 74.
Clerk Phal. t. 12. f. 15.
Müllerí Faun. Fridr. p. 57. no. 507. Tin. *Turionella.* Nom. *Linn.*
— Zool. Dan. Pr. p. 156. no. 1578. Tin. *Turionella.*

404. *Dodecella*, der *Zwölfpunkt.*

Müller

Müller l. c. p. 747. no. 404. *Zwölfpunkt.*
Gleditſch Forſtwiſſ. I. p. 504. no. 11. Tin. *Dodecella*, die *Lichtgraue und braunſtipplichte Maywachsmotte.*
Degeer Inſ. I. t. 22. f. 22. 23. 24.
— Ueberſ. 3 Quart. p. 73.
— Inſ. Tom. II. Part. I. p. 494. no. 3.
Phaléne à antennes filiformes, à trompe; à ailes étroites un peu élevées griſes à quatre bandes ondées noirâtres & ſix huppes elevées noires.
Phaléne teigne à douze huppes ſur les ailes.
— *Ueberſ.* II Th. I B. p. 365. no. 3. die *Mottenphaläne mit zwölf Bürſtgen auf den Flügeln.*
Fabric. Spec. Inſ. II. p. 298. no. 53. Tin. *Dodecella*, griſea, nigro-punctata.
Larva 16-poda, laevis ferruginea.
Pupa folliculata, conica, ferruginea.
Imago palpis reflexis coniformibus.
Ledermüller Gemüths- und Augenergötzung p. 122. t. 64. der Saame von der rothen Tanne oder Fichte, und die denſelben ſo ſchädliche kleine Raupe mit ihrer Verwandlung zur Schabe. *)

405. *Cembrella*, der *Weiſsſprenkel.* **)

Müller l. c. p. 747. no. 405. *Weißſprenkel.*
Wien. Schmett. p. 136. B. no. 39. *Fichtenſchabenraupe* (Pini Sylveſtris); *Fichtenſchabe.* Tin. *Cembrella* L.
Mülleri Faun. Fridr. p. 57. no. 508. Tin. *Cembrella.* Nom. *Linn.*
— Zool. Dan. Pr. p. 156. no. 1579. Tin. *Cembrella.*

406. *Re-*

*) Da die kleine Motte hier t. 64. 1. punktirt abgebildet iſt; ſo glaube ich, daſs es die Dodecella iſt.

**) *Nicht abgebildet.*

406. *Reſinella*, die *Harzmotte.*

Müller l. c. p. 747. no. 406. *Harzmotte.*

Füeſsl. ſchweiz. Inſ. p. 43. no. 840. Tin. *Reſinella.*

Friſch Inſ. X. p. 11. no. 9. 2te Pl. t. 9. die *Kienſproſſenmotte.*

Röſels Inſektenbel. I. NV. 4te Kl. p. 44. t. 16. die in den Harzbeulen des Kiehn- oder Föhrenbaums wohnende *Schabenraupe.*

Maders (Kleem.) Raupenkal. p. 117. no. 331. Tin. *Reſinella, Harzmotte.*

Bonnets und anderer Abhandl. aus der Inſektol. p. 391.

Fr. von Paula *Schrank* Beytr. zur N. G. p. 42. *Kienſproſſenmotte. Fliege* aus derſelben. t. 2. f. 5.

Fiſchers N. G. von Livl. p. 155. no. 377. *Kienſproſſenmotte.*

Bekm. Epit. S. L. p. 168. no. 406. Tin. *Reſinella.*

Fabric. S. E. p. 654. no. 55. *Pyralis Reſinana.* Nom. *Linn.*

— Spec. Inſ. II. p. 288. no. 75. Tin. *Reſinana.*
Larva 16-poda, nuda, lutea, capite brunneo.
Pupa folliculata, fuſca.

Mülleri Faun. Fridr. p. 57. no. 508. Tinea *Reſinella.* Nom. *Linn.*

— Zool. Dan. Pr. p. 136. no. 1580. Tin. *Reſinella.*

Degeer Inſ. I. t. 33. f. 12. 13.

— Ueberſ. I. 3 Quart. p. 65.

— Tom. II. P. I. p. 491. no. 10.
Phaléne à antennes filiformes, à trompe; à ailes pendantes d'un gris cendré avec des rayes transverſes & des nuances noires.
Phaléne des galles reſineuſes du Pin.

— *Ueberſ.* II Th. I B. p. 363. no. 10. die *Fichtenharzphaläne.*

407. *Tae-*

407. *Taedella*, der *Spaltfleck.*

Müller l. c. p. 747. no. 407. *Spaltfleck.*
Clerk Phal. t. 10. f. 13.

408. *Iuniperella*, die *Wacholdermotte.* *)

Müller l. c. p. 747. no. 408. *Wacholdermotte.*
Wien. Schmett. p. 139. C. no. 26. *Wacholderſchabenraupe* (luniperi communis); *Wacholderſchabe.* Tin. *Iuniperella* L.
Cathol. I. p. 405. *Iuniperella.*

409. *Fuſcella*, die *Hausmotte.* **)

Müller l. c. p. 748. no. 409. *Hausmotte.*
Fabric. S. E. p. 662. no. 39. Tin. *Fuſcella.* Nom. *Linn.*
— Spec. Inſ. II. p. 299. no. 54. Tin. *Fuſcella.*
Mülleri Zool. Dan. Pr. p. 135. no. 1569. Tin. *Fuſcella.* Nom. *Linn.*

410. *Minutella*, die *Miniaturmotte.* ***)

Müller l. c. p. 748. no. 410. *Mignaturmotte.*
Wien. Schmett. p. 140. C. no 30. *Unbek.* R. *Kupferbraune Schabe mit unterbrochenem gelben Querbande.*
Fabric. Spec. Inſ. II. p. 300. no. 63. Alis atris, maculis duabus ferrugineis ſuboppoſitis.
In Europae *hortis.*

411. *Corticella*, die *Rindenmotte.* †)

Müller l. c. p. 748. no. 411. *Rindenmotte.*
Gleditſch Forſtwiſſ. I. p. 558. no. 14. Tin. *Corticella*, die *Rindenmotte.*

412. *Sti-*

*) *Nicht abgebildet.* **) *Nicht abgebildet.*
***) *Nicht abgebildet.* †) *Nicht abgebildet.*

412. *Stipella*, der *Schwefelfleck.*

Müller l. c. p. 748. no. 412. *Schwefelfleck.*
Pontopp. N. G. von Dännem. p. 222. Tin. *Stipella.* t. 17.
Clerk Phal. t. 12. f. 5.
Mülleri Zool. Dan. Pr. p. 136. no. 1575. Tin. *Stipella.* Nom. *Linn.*

413. *Sylvella*, die *Roſtbinde.* *)

Müller l. c. p. 748. no. 413. das *Bartköpfchen.*
Fabric. S. E. p. 667. no. 3. *Alucita Sylvella.* Nom. *Linn.*
— Spec. Inſ. II. p. 306. no. 4. Aluc. *Sylvella.*

414. *Gemmella*, der *Eichenblattminirer.*

Müller l. c. p. 748. no. 414. *Silberwolke.*
Gleditſch Forſtwiſſ. I. p. 657. no. 47. Tin. *Gemmella*, die *kleine Eichenblattſchabe.*
Clerk Phal. t. 10. f. 10.
Fabric. S. E. p. 663. no. 44. Tin. *Gemmella.* Nom. *Linn.*
— Spec. Inſ. II. p. 299. no. 59. Tin. *Gemmella.*
Mülleri Zool. Dan. Pr. p. 135. no. 1570. Tin. *Gemmella.* Nom. *Linn.*

415. *Bractella*, der *Goldflügel.*

Müller l. c. p. 749. no. 415. *Goldflügel.*
Füeſsl. ſchweiz. Inſ. p. 43. no. 841. Tin. *Bractella.*
Clerk Phal. t. 12. f. 4.
Fabric. S. E. p. 662. no. 41. Tinea *Bractella.*
Alis nigris, macula baſeos faſciaque media interrupta ſulphureis.
— Spec. Inſ. II. p. 299. no. 56. Tin. *Bractella.*
Mülleri

*) *Nicht abgebildet.*

Mülleri Zool. Dan. Pr. p. 135. no. 1571. Tin. *Brattella.* Nom. *Linn.*

416. *Ariſtella*, die *Silberlinie.* *)

Müller l. c. p. 749. no. 416. *Silberlinie.*
Cathol. A. p. 477. *Ariſtella.*
Fabric. S. E. p. 669. no. 11. *Alucita Ariſtella.* Nom. *Linn.*
— Spec. Inſ. II. p. 308. no. 15. Aluc. *Ariſtella.*

417. *Caudella*, die *Schwanzlinie.* **)

Müller l. c. p. 749. no. 417. *Schwanzlinie.*
Fabric. S. E. p. 669. no. 12. *Alucita Caudella.* Alis ſubcaudatis, teſtaceis; linea poſtica fuſca.
— Spec. Inſ. II. p. 308. no. 16. Aluc. *Caudella.*

418. *Capitella*, der *Gelbkopf.* ***)

Müller l. c. p. 749. no. 418. *Gelbkopf.*
Fabric. S. E. p. 663. no. 45. Tin. *Capitella.* Nom. *Linn.*
— Spec. Inſ. II. p. 300. no. 60. Tin. *Capitella.*
Mülleri Faun. Fridr. p. 56. no. 493. Tin. *Capitella.* Nom. *Linn.*
— Zool. Dan. Pr. p. 136. no. 1581. Tin. *Capitella.*

419. *Porrectella*, der *Hahnenſchwanz.*

Müller l. c. p. 749. no. 419. t. 22. f. 17. das *Langhorn.*
Wien. Schmett. p. 140. C. no. 62. *Unbek.* R. *Weißgeſtrichte Schabe mit gelblichem Unterrande.* Tin. *Porrectella* L.

Degeer

*) *Nicht abgebildet.* **) *Nicht abgebildet.*
***) *Nicht abgebildet.*

Degeer Inf. I. t. 26. f. 15. 16.
— *Ueberf.* I. 3 Quart. p. 12.
— Tom. II. P. I. p. 494. no. 2.

Phaléne à antennes filiformes, à trompe; à ailes étroites élevées d'un gris blancheâtre à bande longitudinale ondée brune.

Phaléne teigne blancheâtre de la Juliane.

— *Ueberf.* II Th. I B. p. 364. no. 2. die *weißliche Mottenphaläne der Viola matronalis.*
Müller Zool. Dan. Pr. p. 135. no. 1572. Tin. *Porrectella.* Nom. *Linn.*

420. *Pedella*, die *braune Dreybinde.* *)

Müller l. c. p. 750. no. 420. das *Querbein.*
Mülleri Faun. Fridr. p. 57. no. 513. Tin. *Pedella.* Nom. *Linn.*
— Zool. Dan. Pr. p. 136. no. 1582. Tin. *Pedella.*

421. *Argentella*, die *Silbermotte.*

Müller l. c. p. 750. no. 421. *Silbermotte.*
Fabric. S. E. p. 658. no. 17. Tin. *Argentella.* Nom. *Linn.*
— Spec. Inf. II. p. 293. no. 20. Tin. *Argentella.*
Degeer Inf. Tom. II. Part. I. p. 483. no. 2. t. 10. f. 19.

Phaléne à antennes filiformes, à trompe; à ailes pendantes d'un blanc argenté, dont le deſſous des ſuperieures eſt ardoiſé, & dont l'extremité du ventre eſt jaune.

Phaléne argentée.

— *Ueberf.* II Th. I B. p. 357. no. 2. t. 10. f. 19. die *Silbermotte.*
Müller Zool. Dan. Pr. p. 135. no. 1573. Tin. *Argentella.* Nom. *Linn.*

422. *Cal-*

*) *Nicht abgebildet.*

422. *Calthella*, die *Sumpfdottermotte.* *)

Müller l. c. p. 750. no. 422. *Sumpfdottermotte.*

Wien. Schmett. p. 144. D. no. 36. *Dotterblumenſchabenraupe* (Calthae Paluſtris); *Dotterblumenſchabe.* Tin. *Calthella* L.

Fabric. S. E. p. 663. no. 47. Tin. *Calthella.* Nom. *Linn.*

— Spec. Inſ. II. p. 300. no. 64. Tin. *Calthella.*

Mülleri Faun. Fridr. p. 57. no. 512. Tin. *Calthella.* Nom. *Linn.*

— Zool. Dan. Pr. p. 136. no. 1583. Tin. *Calthella.*

423. *Petiverella*, der *Rückenſtrich.*

Müller l. c. p. 750. no. 423. die *Schleuder.*

Wien. Schmett. p. 136. B. no. 41. *Unbek. Raupe. Gelbgraue Goldſchielende Schabe.*

Fabric. S. E. p. 664. no. 49. Tin. *Petiverella.* Nom. *Linn.*

— Spec. Inſ. II. p. 300. no. 65. Tin. *Petiverella.*

Schaeff. Icon. t. 43. f. 33.

Mülleri Zool. Dan. Pr. p. 136. no. 1584. Tin. *Petiverella.* Nom. *Linn.*

424. *Swammerdammella*, das *Langhorn.*

Müller l. c. p. 751. no. 424. *Langhorn.*

Füeßl. ſchweiz. Inſ. p. 43. no. 842. Tin. *Swammerdammella.* In den *Wieſen.*

Wien. Schmett. p. 141. D. no. 2. *Unbek.* R. *Bleichmeſſingfarbene gewäſſerte Schabe.*

Der *Drontheim.* Geſellſch. Schr. III. p. 370. no. 36. Tin. *Swammerdammella.*

Clerk Phal. t. 12. f. 1.

Fabric.

*) *Nicht abgebildet.*

Fabric. S. E. p. 669. no. 13. *Alucita Swammerdammella.*

— Spec. Inſ. II. p. 308. no. 17. Tin. *Swammerdammella.*

Müllerí Zool. Dan. Pr. p. 136. no. 1585. Tin. *Swammerdammella.* Nom. *Linn.*

425. *Reaumurella*, der *Goldrand.*

Müller l. c. p. 751. no. 425. der *Goldrand.*

Füeßl. ſchweiz. Inſ. p. 43. no. 843. Tin. *Reaumurella.*

Wien. Schmett. p. 143. D. no. 26. *Dotterweidenſchabenraupe* (Salicis Vitellinae); *Dotterweidenſchabe.* Tin. *Reaumurella* L.

Der *Dronth.* Geſellſch. Schr. IV. p. 287. no. 52. Tin. *Reaumurella.*

Syſt. Nat. du Regn. Anim. II. p. 162. no. 92.

Clerk Phal. t. 12. f. 2.

Fabric. S. E. p. 670. no. 17. *Alucita Reaumurella.* Nom. *Linn.*

— Spec. Inſ. II. p. 309. no. 22. Aluc. *Reaumurella.*

Müllerí Zool. Dan. Pr. p. 136. no. 1586. Tin. *Reaumurella.*

Geoffr. Inſ. II. p. 193. no. 28.

Tinea nigra, alis exterioribus deauratis, antennis corpore duplo longioribus.

La *Teigne noire bronzée.*

Long. $3\frac{1}{2}$ lign.

426. *Degeerella*, der *Silberrand.*

Müller l. c. p. 751. no. 426. *Silberrand.*

Füeßl. ſchweiz. Inſ. p. 43. no. 844. Tin. *Degeerella.*

Wien.

Wien. Schmett. p. 143. D. no. 25. *Unbek.* R. *Goldgeſtrichte Schabe mit gelbem Querbande.*

Leske Anfangsgr. der N. G. I. p. 464. no. 26. *Goldgeſtreifte Schabe.*

Scop. Ent. carn. p. 251. no. 647.

Alae nigrae, faſcia argenteo-aurea; antennae longae.

Long. lin. 2.

Fabric. S. E. p. 669. no. 15. *Alucita Degeerella.* Nom. *Linn.*

— Spec. Inſ. II. p. 309. no. 20. Aluc. *Degeerella.*

Geoffr. Inſ. II. p. 193. no. 29. t. 12. f. 5.

Tinea nigra, alis ſuperioribus lineis longitudinalibus, faſcia lata transverſa, inferneque radiis plurimis aureis; antennis corpore triplo longioribus.

La *Coquille d'or.*

Long. $4\frac{1}{2}$ lign.

Mülleri Faun. Fridr. p. 56. no. 497. Tin. *Degeerella.* Nom. *Linn.*

— Zool. Dan. Pr. p. 136. no. 1587. Tin. *Degeerella.*

Degeer Inſ. I. t. 32. f. 13.

— *Ueberſ.* 3 Quart. p. 99.

— Inſ. Tom. II. P. I. p. 487. no. 6.

Phaléne à antennes filiformes trois fois plus longues que le corps, & à trompe; à ailes pendantes bronzées traverſées par une bande jaune bordée de violet.

Phaléne-frigane bronzée à bande jaune.

— *Ueberſ.* II Th. I B. p. 359. no. 6. die *Erzfarbige gelbbandirte Phryganäenphaläne.*

427. *Sulzella*, das *Goldband.* *)

*) *Nicht abgebildet.* Dieſe hat *Fabric.* Spec. Inſ. II. p. 309. no. 20. *β.* als eine Abänderung der *Degeerella* angeführt.

Müller l. c. p. 751. no. 427. *Goldband.*
Wien. Schmett. p. 143. D. no. 24. *Unbek.* R. *Goldgeſtrichte Schabe mit ſchwarzem Querbande.*
Geoffr. Inſ. II. p. 199. no. 44.
Tinea nigra, alis exterioribus deauratis, capitis vertice, alarumque faſcia transverſa flavis.
La Teigne dorée à bande & toupet jaunes.
Long. $2\frac{3}{4}$ lign.

428. *Podaella,* das *Milchband.* *)
Müller l. c. p. 751. no. 428. *Milchband.*
Füeßl. ſchweiz. Inſ. p. 43. no. 845. Tin. *Podaella.*
Fabric. S. E. p. 670. no. 16. *Alucita Podaella.* Nom. *Linn.*
--- Spec. Inſ. II. p. 309. no. 21. Aluc. *Podaella.*
Geoffr. Inſ. II. p. 194. no. 32.**)
Tinea nigra, faſcia transverſa alba.
La *Teigne cordelière.*
Long. $2\frac{1}{2}$ lign.

429. *Robertella,* das *Weißeck.* ***)
Müller l. c. p. 752. no. 429. die *weiße Ecke.*
Wien. Schmett. p. 142. D. no. 8. *Unbek.* R. *Glänzende neblicht düſtre Schabe.*
Fabric. S. E. p. 669. no. 14. *Alucita Robertella.* Nom. *Linn.*
--- Spec. Inſ. II. p. 308. no. 18. Aluc. *Robertella.*

430. *Geoffrella,* das *Silbergitter.* †)
Müller l. c. p. 752. no. 430. *Silbergitter.*

Wien.

*) *Nicht abgebildet.*

**) Dieſe nach der Meynung der Wiener Entomol. p. 123. Linn. *Pyralis cingulata.* no. 280.

***) *Nicht abgebildet.* †) *Nicht abgebildet.*

Wien. Schmett. p. 138. C. no. 19. *Unbek.* R. *Okergelbe Schabe mit Silberſtrichen und zwey hellgelben Dreyecken.*

Fabric. S. E. p. 664. no. 50. Tin. *Geoffrella.* Nom. *Linn.*

--- Spec. Inſ. II. p. 301. no. 67. Tin. *Geoffrella.*

431. *Mouffetella*, der *Spitzflügel.* *)

Müller l. c. p. 752. no. 431. *Spitzflügel.*

Wien. Schmett. p. 140. C. no. 57. *Unbek.* R. *Röthlichgraue Schabe mit 8 ſchwarzen Punkten.*

Fabric. S. E. p. 664. no. 51. Tin. *Mouffetella.* Nom. *Linn.*

--- Spec. Inſ. II. p. 301. no. 68. Tin. *Mouffetella.*

Mülleri Faun. Fridr. p. 56. no. 499. Tin. *Mouffetella.* Nom. *Linn.*

--- Zool. Dan. Pr. p. 136. no. 1588. Tin. *Mouffetella.*

432. *Liſterella*, der *Halbringel.* **)

Müller l. c. p. 752. no. 432. *Halbringel.*

Wien. Schmett. p. 139. C. no. 30. *Unbek.* R. *Trübgraue Schabe mit ſchwarzpunktirtem Unterrande.*

433. *Friſchella*, der *Goldbraune Flügel.* ***)

Müller l. c. p. 752. no. 433. der *Vergulder.*

Wien. Schmett. p. 140. C. no. 53. *Unbek.* R. *Schmuzige Goldgeglättete Schabe.*

Fabric. S. E. p. 663. no. 48. Tin. *Friſchella.* Nom. *Linn.*

--- Spec. Inſ. II. p. 309. no. 19. *Alucita Friſchella.*

*) *Nicht abgebildet.* **) *Nicht abgebildet.*

***) *Nicht abgebildet.*

Müllerí Faun. Fridr. p. 56. no. 498. Tin. *Frischella.* Nom. *Linn.*

--- Zool. Dan. Pr. p. 137. no. 1589. Tin. *Frischella.*

434. *Scopolella*, der *Goldsprenkel.* *)

Müller l. c. p. 753. no. 434. *Goldsprenkel.*

Wien. Schmett. p. 138. C. no. 1. *Unbek.* R. *Schwärzlichte Schabe mit 8 weißen Punkten.*

435. *Albinella*, der *Goldbogen.* **)

Müller l. c. p. 753. no. 435. *Goldbogen.*

Syst. Nat. du Regn. Anim. II. p. 162. no. 91.

436. *Goedartella*, der *Silberbogen.* ***)

Müller l. c. p. 753. no. 436. *Silberbogen.*

Gleditsch Forstwiss. I. p. 558. no. 15. Tin. *Goedartella*, die *Goldfarbige Elsenmotte mit der doppelten Silberweissen Binde.*

Clerk Phal. t. 12. f. 14.

Fabric. S. E. p. 664. no. 33. Tin. *Goedartella.*
Alis auratis; fasciis duabus punctisque tribus argenteis.

--- Spec. Inf. II. p. 302. no. 72. Tin. *Goedartella.*
In Alnetis; in *Betulae gemmis.*

437. *Loevenhoekella*, die *Silberlinie.* †)

Müller l. c. p. 753. no. 437. *Silberlinie.*

Wien. Schmett. p. 141. C. no. 76. *Unbek.* R. *Kupferglänzende Schabe mit 12 Silber- oder Blafsgoldflecken.*

438. *Merianella*, das *Silberblättchen.*

Müller l. c. p. 753. no. 438. *Silberblättchen.*

Wien.

*) *Nicht abgebildet.*

**) *Nicht abgebildet.*

***) *Nicht abgebildet.*

†) *Nicht abgebildet.*

Wien. Schmett. p. 143. D. no. 31. *Unbek.* R. *Purpurgoldne Schabe mit 3 blafsgoldnen Querbändern.*

Syft. Nat. du Regn. Anim. II. p. 161. no. 90.

Fabric. S. E. p. 664. no. 54. Tinea *Merianella.* Nom. *Linn.*

--- Spec. Inf. II. p. 302. no. 73. Tin. *Merianella.*

Geoffr. Inf. II. p. 198. no. 43.

Tinea nigro-aurata lineis argenteis transverfis tribus, antennis extremo-albis.

La *Teigne dorée à bandes d'argent.*

Long. 1 lign.

Act. Upfal. 1736. p. 26. no. 84.

Papilio alis depreffis oblongis argenteis, lineis tribus transverfis aureis, media bifurca.

439. *Wilkella*, das *Bogenband.*

Müller l. c. p. 754. no. 439. *Bogenband.*

Réaum. Inf. III. t. 4. f. 8.

Syft. Nat. du Regn. Anim. II. p. 161. no. 89.

Fabric. S. E. p. 664. no. 55. Tin. *Wilkella.* Nom. *Linn.*

--- Spec. Inf. II. p. 302. no. 74. Tin. *Wilkella.*

Geoffr. Inf. II. p. 199. no. 43. *β.*

Tinea nigro-aurata, lineis argenteis transverfis quatuor, antennis nigris.

Long. $1\frac{3}{4}$ lign.

(Variet. *Merianellae*).

440. *Lyonetella*, die *Silberfpalte.* *)

Müller l. c. p. 754. no. 440. *Silberroftral.*

Syft. Nat. du Regn. Anim. II. p. 162. no. 94.

Fabric. S. E. p. 665. no. 56. Tin. *Lyonetella.* Nom. *Linn.*

*) *Nicht abgebildet.*

Fabric. Spec. Inſ. II. p. 302. no. 77. Tin. *Lyonetella.*

441. *Bonnetella*, die *Silberwelle.* *)

Müller l. c. p. 754. no. 441. *Wellenſilber.*
Syſt. Nat. du Regn. Anim. II. p. 162. no. 93.
Fabric. S. E. p. 665. no. 57. Tin. *Bonnetella.* Nom. *Linn.*
— Spec. Inſ. II. p. 303. no. 78. Tin. *Bonnetella.*

442. *Iungiella*, der *Siebenfleck.*

Müller l. c. p. 754. no. 442. *Verdoppeler.*
Clerk Phal. t. 12. f. 9.
Cathol. I. p. 405. *Iungiella.*
Müller i Zool. Dan. Pr. p. 137. no. 1594. Tin. *Iungiella.* Nom. *Linn.*

443. *Schefferella*, der *Buchblattminirer.* **)

Müller l. c. p. 754. no. 443. *Büchenwühler.*
Gleditſch Forſtwiſſ. I. p. 600. no. 4. Tin. *Schefferella*, die *kleine ſchwarze und gelbgefleckte Buchmotte.*
Wien. Schmett. p. 138. C. no. 21. *Büchenblattſchabenraupe* (in Fagi Sylvaticae foliis); *Büchenblattſchabe.* Tin. *Schefferella* L.
Leske Anfangsgr. der N. G. I. p. 464. no. 27. *Büchenminirer.*
Fabric. S. E. p. 665. no. 58. Tin. *Schefferella.* Nom. *Linn.*
— Spec. Inſ. II. p. 303. no. 79. Tin. *Schefferella.*

444. *Rhediella*, die *gebrochene Silberlinie.*

Müller l. c. p. 755. no. 444. *Bruchſilber.*
Clerk Phal. t. 12. f. 12.

Fabric.

*) *Nicht abgebildet.* **) *Nicht abgebildet.*

Fabric. S. E. p. 665. no. 59. Tin. *Rhediella.* Nom. *Linn.*

— Spec. Inſ. II. p. 303. no. 82. Tin. *Rhediella.*

Mülleri Faun. Fridr. p. 56. no. 500. Tin. *Rhediella.* Nom. *Linn.*

— Zool. Dan. Pr. p. 137. no. 1591. Tin. *Rhediella.*

445. *Roeſella*, der *Apfelblattminirer.* *)

Müller l. c. p. 755. no. 445. *Silberbuckel.*

Füeßl. ſchwēiz. Inſ. p. 43. no. 847. Tin. *Roeſella.*

Friſch Inſ. III. p. 31. no. 15. 3 Pl. t. 4. f. 7. von den *Räuplein unter der Pflaumenblatthaut.*

Gleditſch Forſtwiſſ. II. p. 790. no. 20. Tin. *Roeſella*, die *allerkleinſte Blattmotte des Apfelblatts.*

Wien. Schmett. p. 143. D. no. 30. *Apfelblattſchabenraupe* (in Pyri Mali foliis); *Apfelblattſchābe.* Tin. *Roeſella* L.

Fabric. S. E. p. 665. no. 60. Tin. *Roeſella.* Nom. *Linn.*

— Spec. Inſ. II. p. 303. no. 83. Tin. *Roeſella.*
Larva 14-poda, flava, capite teſtaceo.
Pupa nuda, oblonga, brunnea.

Mülleri Faun. Fridr. p. 56. no. 501. Tin. *Roeſella.* Nom. *Linn.*

— Zool. Dan. Pr. p. 137. no. 1592. Tin. *Roeſella.*

Degeer Inſ. I. t. 30. f. 10-12.

— *Ueberſ.* I. 3 Quart. p. 36.

— Inſ. Tom. II. Part. J. p. 495. no. 6.
Phaléne à antennes filiformes, à trompe, à ailes étroites couleur de bronze doré à taches argentées, mais ſans point noir.

*) Vermuthlich einerley mit *Mülleri* Tin. *Maeſtingella.* Faun. Fr. p. 58. no. 521. Alis flavis linea maculisque niveis. — Zool. Dan. Pr. p. 138. no. 1603. Hierbey auch Friſch, III. t. 4. f. 7.

Phaléne-teigne dorée à taches argentées du Pommier.

— *Ueberſ.* II Th. I B. p. 366. no. 6. die *goldne Silbergefleckte Apfelmottenphaläne.*

Réaum. Inſ. III. t. 4. f. 11-15.

446. *Linneella*, der *Silberpunkt.*

Müller l. c. p. 755. no. 446. der *Autor.*

Clerk Phal. t. 12. f. 8.

Bekm. Epit. S. L. p. 168. no. 446. Tin. *Linneella.*

Fabric. S. E. p. 666. no. 61. Tin. *Linneella.*

Alis fuſco-auratis; punctis quatuor argenteis elevatis.

— Spec. Inſ. II. p. 304. no. 84. Tin. *Linneella.*

Geoffr. Inſ. II. p. 200. no. 45.

Tinea flavo-aurata, punctis quatuor argenteis, antennarumque apice albo. Vulgo *Linnaeanella.*

La *Teigne dorée à quatre points d'argent.*

Long. $2\frac{1}{3}$ lign.

447. *Rajella*, der *Erlenblattminirer.*

Müller l. c. p. 755. no. 447. *Erlenmotte.*

Gleditſch Forſtwiſſ. I. p. 558. no. 16. Tin. *Rajella*, die *kleine Goldfarbige, Silberweiße gedüpfelte Elſenmotte.*

Swammerd. Bib. der Nat. Fol. p. 298. t. 44. f. 18-21. von den *Würmern zwiſchen den beyden Häuten der Erlenblätter.*

Wien. Schmett. p. 143. D. no. 32. *Erlenblattſchabenraupe* (in Betulae Alni foliis); *Erlenblattſchabe.* Tin. *Rajella* L.

Fabric. S. E. p. 666. no. 62. Tin. *Rajella.* Nom. *Linn.*

— Spec. Inſ. II. p. 304. no. 85. Tin. *Rajella.*

Larva

Larva pallida, capite utrinque puncto testaceo.

Pupa oblonga mucrone dentato intra folliculum extus excrementis tectum.

Degeer Inſ. I. t. 31. f. 11. 12.

— *Ueberſ.* I. 3 Quart. p. 40.

— Inſ. Tom. II. P. I. p. 495. no. 5.

Phaléne à antennes filiformes, à trompe; à ailes étroites élevées dorées à taches argentées, avec un point noir proche du bout.

Phaléne-teigne dorée à taches argentées de l'Aune.

— *Ueberſ.* II Th. I B. p. 366. no. 5. die *goldne, Silbergefleckte Erlenminir-Mottenphaläne.*

448. *Brunnichella*, die *Violetbinde.* *)

Müller l. c. p. 755. no. 448. *Violetlinie.*

449. *Harriſella*, die *Brandſpitze.* **)

Müller l. c. p. 756. no. 449. *Brandſpitze.*

Fabric. S. E. p. 666. no. 63. Tin. *Harriſella.* Nom. *Linn.*

— Spec. Inſ. II. p. 305. no. 88. Tin. *Harriſella.*

Mülleri Faun. Fridr. p. 56. no. 502. Tin. *Harriſella.* Nom. *Linn.*

— Zool. Dan. Pr. p. 137. no. 1593. Tin. *Harriſella.*

450. *Clerckella*, die *Schwanzmotte.* ***)

Müller l. c. p. 756. no. 450. *Schwanzmotte.*

Fabric. S. E. p. 666. no. 66. Tin. *Clerckella.*

Alis argenteis, poſtice ſubcaudatis, fuſco-ſtriatis punctoque atro.

— Spec. Inſ. II. p. 305. no. 93. Tin. *Clerckella.*

In

*) *Nicht abgebildet.* **) *Nicht abgebildet.*

***) *Nicht abgebildet.*

In *Europae Nemoribus.*

451. *Occultella*, die *Fenſtermotte.* *)

Müller l. c. p. 756. no. 451. *Fenſtermotte.*
Degeer Inſ. I. Ueberſ. 3 Quart. p. 32.

452. *Lichenella*, die *Mooßmotte.*

Müller l. c. p. 756. no. 452. *Flechtenmotte.*
Degeer Ueberſ. I. 3 Quart. p. 78.
— Inſ. Tom. II. Part. I. p. 380. no. 4. t. 11. f. 5. 6.

Phaléne à antennes filiformes, ſans trompe, dont la femelle eſt ſans ailes; d'une chenille-teigne des murs à fourreau prismatique fait de grains de pierre.

Phaléne-teigne des murs à court fourreau prismatique.

— *Ueberſ.* II Th. I B. p. 276. no. 4. t. 11. f. 1-6. die *Mauermottenphaläne mit kurzem dreyeckigem Gehäuſe.*

Fabric. Spec. Inſ. II. p. 306. no. 94. Tin. *Lichenella.*
Aptera laevis nigra.

Larva 16-poda, laevis, obſcure griſea, poſtice incraſſata, intra cucullum triangulari prismaticum ex arena conſtructum.

Unabgebildete Linnéiſche Motten.

1) no. 353. *Crataegella.*
2) no. 357. *Oxyocanthella.*
3) no. 359. *Paſcuella.*
4) no. 362. *Rorella.*
5) no. 364. *Nemorella.*
6) no. 366. *Ramella.*
7) no. 370. *Veſtionella.*
8) no.

*) *Nicht abgebildet.*

8) no. 380. *Arbutella.*
9) no. 381. *Teſſella.*
10) no. 384. *Parentheſella.*
11) no. 385. *Elongella.*
12) no. 386. *Punctella.*
13) no. 388. *Tetrapodella.*
14) no. 390. *Cinctella.*
15) no. 391. *Leucatella.*
16) no. 392. *Cinerella.*
17) no. 393. *Trigonella.*
18) no. 394. *Rhomboidella.*
19) no. 395. *Tertianella.*
20) no. 396. *Scabrella.*
21) no. 397. *Aſperella.*
22) no. 398. *Serratella.*
23) no. 399. *Populella.*
24) no. 400. *Mercurella.*
25) no. 405. *Cembrella.*
26) no. 408. *Iuniperella.*
27) no. 409. *Fuſcella.*
28) no. 410. *Minutella.*
29) no. 411. *Corticella.*
30) no. 413. *Sylvella.*
31) no. 416. *Ariſtella.*
32) no. 417. *Caudella.*
33) no. 418. *Capitella.*
34) no. 420. *Pedella.*
35) no. 422. *Calthella.*
36) no. 427. *Sulzella.*
37) no. 428. *Podaella.*
38) no. 429. *Robertella.*
39) no. 430. *Geoffrella.*
40) no. 431. *Mouffetella.*
41) no. 432. *Liſterella.*
42) no. 433. *Friſchella.*

43) no.

43) no. 434. *Scopolella.*
44) no. 435. *Albinella.*
45) no. 437. *Loevenhoekella.*
46) no. 440. *Lyonetella.*
47) no. 441. *Bonnetella.*
48) no. 443. *Schefferella.*
49) no. 448. *Brunnichella.*
50) no. 450. *Clerckella.*
51) no. 451. *Occultella.*

Neue Arten von Motten.

1. *Tinea cauda piscina*, die *Fischschwanzmotte.*
Naturforscher II St. p. 14. t. 1. f. 6. (D. *Kühn.*)

2. *Aureo-polita*, der *Goldglanz.*
Naturforscher III. p. 8. f) t. 1. f. 8. (D. *Kühn.*)
Füeßl. Magaz. der Entomol. II. p. 107.
Schaeff. Icon. t. 19. f. 4. 5.

3. *Quadrioculata*, das *Vierauge.*
Naturforscher III. p. 8. g) t. 1. f. 9. die fahlbraune *vieräugigte* Motte, welche fast die Gestalt einer Frühlingsfliege hat (D. *Kühn*).
Füeßl. Magaz. der Entom. II. p. 107.
Schaeff. Icon. t. 278. f. 4-7.

4. *Aleella*, die *gelbbraunrothgefleckte Motte.*
Naturforscher IX. p. 106. t. 2. *(Schulze).*
Alis oblongis flavis, maculis fulvis alternis, strigaque undulata argentea.
In *Germaniae Pratis.*

5. *Chocolatella*, die *Chokolatenmotte.*

Bonnets

Bonnets Betracht. über die Natur p. 457. (Note *Spallanzani*).

Martini allgem. Gesch. der Nat. I. p. 633.

Alis griseis, pallide-flavis, nigro-punctatis maculatisque.

6. *Fuesslinella*, die *Füßlismotte.*

Sulzers Gesch. der Ins. p. 163. t. 23. f. 13. die Vorderflügel schwarz; die hintern braun; auf dem Kopfe und zu beyden Seiten des Bruststücks Orangelbe Flecken; auf den Vorderflügeln weisse Tropfen.

7. *Proboscidella*, der *Schnauzbart.*

Sulzers Gesch. der Ins. p. 163. t. 23. f. 14. die Flügel braun, mit einem Goldgelben Bande der Länge nach durchzogen, nebst einem rothgelben Fleck und Saum.

8. *Viciella*, *Wickenschabe.*

Wien. Schmett. p. 133. A. *Scheinspinnerschaben* (Ph. Tin. Bombyciformes): no. 2. *Wickenschabenraupe* (Viciae Sylvaticae), Tab. I. a. f. 7. *Wickenschabe*, Tab. I. b. f. 7.

Geoffr. Ins. II. p. 203. no. 52.

Tinea involucro ex paleis transversis composito.

La *Teigne à fourreau de pailles transverses.*

Fourreau à sept à huit lignes de long.

Degeer Ins. I. p. 511. t. 29. f. 23-25.

Chenille-teigne à seize jambes, rase, noirâtre, qui vit sur l'Ozier, & qui se fait un fourreau couvert de brins de gramen, qui sont placés *transversalement* sur le fourreau.

Uebers. I. 3 Quart. p. 80. t. 29. f. 23-25.

9. *Muscella*,

9. *Muſcella*, *Fliegenflüglichte Schabe.*

Wien. Schmett. p. 133. A. no. 3. *Unbek. Raupe.*

10. *Bombycella*, *gelblichte düſtere gewäſſerte Schabe.*

Wien. Schmett. p. 133. A. no. 4. *Unbek.* R.

11. *Pectinella*, *Aſchgraue durchſichtige Schabe.*

Wien. Schmett. p. 133. A. no. 5. *Unbek.* R.

12. *Plumella*, *ſchwärzlichte Schabe.*

Wien. Schmett. p. 133. A. no. 6. *Unbek.* R.

13. *Palpella*, *braungelblichte Schabe mit 2 geraden Silberſtreifen.*

Wien. Schmett. p. 134. B. *Geradſchnauzigte Schaben,* Ph. Tin. *Direotipalpes:* no. 3. *Unbek.* R.

14. *Margaritella*, *braune Schabe mit Silberartigem Geradſtreife.*

Wien. Schmett. p. 134. B. no. 5. *Unbek.* R.
Geoffr. Inſ. II. p. 183. no. 3.
Tinea cinerea, corniculis duobus criſtatis, faſcia alarum longitudinali argentea.
La *Teigne à rayure d' argent.*
Long. 4 lign.

15. *Conchella*, *gelbbraune Schabe mit 2 Silberartigen Flecken.*

Wien. Schmett. p. 134. B. no. 6. *Unbek.* R.

16. *Inquinatella*, *gelblichte am Innenrande trübe Schabe.*

Wien. Schmett. p. 134. B. no. 10. *Unbek.* R.

17. *Exoletella*, *Beinfarbene graugeſtrichte Schabe.*

Wien. Schmett. p. 134. B. no. 12. *Unbek.* R.

18. *Stra-*

18. *Straminella*, *Strohfarbigte Schabe.*
Wien. Schmett. p. 134. B. no. 13. *Unbek.* R.

19. *Luteella*, *Okergelbe Schabe.*
Wien. Schmett. p. 134. B. no. 14. *Unbek.* R.

20. *Convolutella*, *Lichtgraue Schabe.*
Wien. Schmett. p. 134. B. no. 15. *Unbek.* R.

21. *Falsella*, *weißlichglänzende dunkelgezeichnete Schabe.*
Wien. Schmett. p. 134. B. no. 16. *Unbek.* R.

22. *Tristella*, *grau und braungemischte Schabe.*
Wien. Schmett. p. 134. B. no. 17. *Unbek.* R.

23. *Quercella*, *Eichenschabe.*
Wien. Schmett. p. 134. B. no. 18. *Eichenschabenraupe* (Quercus Koboris).

24. *Antennella*, *gelblichte*, *weißschielende Schabe.*
Wien. Schmett. p. 135. B. no. 19. *Unbek.* R.

25. *Pyralella*, *weißlichte Schabe mit grauen Querflecken.*
Wien. Schmett. p. 135. B. no. 20. *Unbek.* R.

26. *Alpella*, *blaßschwefelgelbe olivgestrichte Schabe.*
Wien. Schmett. p. 135. B. no. 21. *Unbek.* R.

27. *Cerussella*, *graue Schabe mit silberner Untenrandlinie.*
Wien. Schmett. p. 135. B. no. 22. *Unbek.* R.

28. *Quadrella*, *weiße Schabe mit gestrichtem Untenrande.*

Wien. Schmett. p. 135. B. no. 23. *Unbek.* R.

29. *Striatella, graue Schabe mit weißen Geradſtrichen.*

Wien. Schmett. p. 135. B. no. 26. *Unbek.* R.

30. *Gigantella, groſse graugelbe Schabe mit langen Schnauzen.*

Wien. Schmett. p. 135. B. no. 27. *Unbek.* R.

31. *Argyrella, ſilberne graugeſprenkelte Schabe.*

Wien. Schmett. p. 135. B. no. 28. *Unbek.* R.

32. *Anella, graugemiſchte Schabe mit 2 Mittelringen.*

Wien. Schmett. p. 135. B. no. 30. *Unbek.* R.

33. *Canella, grauröthliche Schabe ohne Ringe.*

Wien. Schmett. p. 135. B. no. 31. *Unbek.* R.

34. *Ahenella, glänzende ſchwarzgraulichte Schabe.*

Wien. Schmett. p. 135. B. no. 32. *Unbek.* R.

35. *Alternella, weiſsgraue Schabe mit breiten düſtern Querſtreifen.*

Wien. Schmett. p. 135. B. no. 33. *Unbek.* R.

36. *Fagella, Büchenſchabe.*

Wien. Schmett. p. 135. B. no. 34. *Buchenſchabenraupe* (Fagi Sylvaticae).

37. *Noctuella, bräunlichte Schabe mit düſtern Ring- und Nierenflecken.*

Wien. Schmett. p. 136. B. no. 35. *Unbek.* R.

38. *Verbaſcella, Wollkrautſchabe.*

Wien.

Wien. Schmett. p. 136. B. no. 36. *Wollkrautſchabenraupe* (Verbaſci Tapſi).

39. *Daphnella*, *Zeidelbaſtſchabe.*

Wien. Schmett. p. 136. B. no. 37. *Zeidelbaſtſchabenraupe* (Daphnes Mezerei).

40. *Nyctemerella*, *weiſse* Schabe *mit ſchwarzen Randflecken.*

Wien. Schmett. p. 136. B. no. 38. *Unbek.* R.

41. *Dilutella*, *graue*, *düſtergezeichnete* Schabe.

Wien. Schmett. p. 136. B. no. 40. *Unbek.* R.

42. *Barbella*, *dunkelgraue* Schabe.

Wien. Schmett. p. 136. B. no. 43. *Unbek.* R.

43. *Bracteella*, *rothgoldene* Schabe.

Wien. Schmett. p. 136. B. no. 44. *Unbek.* R.

44. *Falcella*, *gelbbraune* Schabe *mit geſichelten Oberflügeln.*

Wien. Schmett. p. 136. B. no. 47. *Unbek.* R.

45. *Apicella*, *graugelbe* Schabe *mit ſpitzigem Aufſenwinkel der Oberflügel.*

Wien. Schmett. p. 136. B. no. 48. *Unbek.* R.

46. *Uncella*, *Erdfarben und weiſsgemiſchte* Schabe *mit geſichteltem Aufſenwinkel der Oberflügel.*

Wien. Schmett. p. 136. B. no. 49. *Unbek.* R.

47. *Harpella*, *Zimmetbraune* Schabe *mit gelbem Innenrande und geſichelten Oberflügeln.*

Wien. Schmett. p. 136. B. no. 50. *Unbek.* R.

48. *Ciliella*, *goldbraune Schabe.*

Wien. Schmett. p. 136. B. no. 51. *Unbek.* R.

49. *Geniſtella*, *Gilbkrautſchabe.*

Wien. Schmett. p. 137. B. no. 52. *Gilbkrautſchabenraupe* (Geniſtae tinctoriae).

50. *Pyropella*, *bleichgelbe Schabe mit finſterem Aufſenrande.*

Wien. Schmett. p. 137. B. no. 53. *Unbek.* R.

51. *Albidella*, *weiſsgraue Schabe.*

Wien. Schmett. p. 137. B. no. 56. *Unbek.* R.

52. *Humerella*, *Okerbraune Schabe mit weiſsem Aufſenrande der Oberflügel.*

Wien. Schmett. p. 137. B. no. 57. *Unbek.* R.

53. *Nitidella*, *Silberweiſse Schabe mit goldfarbiger Zeichnung.*

Wien. Schmett. p. 137. B. no. 58. *Unbek.* R.

54. *Mendicella*, *ſchwarzbraune Schabe.*

Wien. Schmett. p. 137. B. no. 59. *Unbek.* R.

55. *Choragella*, *glänzend Holzfarbichte dunkelgezeichnete Schabe.*

Wien. Schmett. p. 137. C. *Krummſchnauzichte* Schaben, Ph. Tin. *Recurvipalpes:* no. 1. *Unbek.* R.

56. *Characterella*, *graulichte Schabe mit Sförmigem Mittelzeichen.*

Wien. Schmett. p. 137. C. no. 2. *Unbek.* R.

57. *Arenella*, *bleichſandfarbige Schabe mit Bleyfarbenem Mittelpunkt.*

Wien.

Wien. Schmett. p. 137. C. no. 3. *Unbek.* R.

58. *Liturella*, *gelblichte Schabe mit niederen dunklen Flecken.*

Wien. Schmett. p. 137. C. no. 4. *Unbek.* R.

59. *Daucella*, *Möhrenſchabe.*

Wien. Schmett. p. 137. C. no. 5. *Möhrenſchabenraupe* (Dauci Carotae).

60. *Atomella*, *graulichte dunkelgeſprengte Schabe.*

Wien. Schmett. p. 137. C. no. 6. *Unbek.* R.

61. *Laterella*, *Ziegelfarbigte Schabe.*

Wien. Schmett. p. 137. C. no. 7. *Unbek.* R.

62. *Verrucella*, *vorwärts Zimmetrothe, rückwärts düſtere Schabe mit einer Warze.*

Wien. Schmett. p. 138. C. no. 8. *)

63. *Lobella*, *graue Schabe mit 3 ſchwarzen Hökern.*

Wien. Schmett. p. 138. C. no. 9. *Unbek.* R.

64. *Putridella*, *Holzbräunliche Schabe mit einem kleinen weiſsen Mittelpunkt.*

Wien. Schmett. p. 138. C. no. 10. *Unbek.* R.

65. *Monilella*, *weiſslichte Schabe mit einem bunten Makel am Aufsenrande.*

Wien. Schmett. p. 138. C. no. 11. *Unbek.* R.

66. *Roborella*, *Hageeichenſchabe.*

Wien. Schmett. p. 138. C. no. 14. *Hageeichenſchabenraupe* (Quercus Roboris).

*) Die Raupe auf dem *Kellerhals* oder *Zeiland*, Daphne Mezereum. S. *Nachtrag* p. 319. Note.

67. *Palumbella*, *graue* Schabe *mit 2 röthlichen Querſtrichen.*

Wien. Schmett. p. 138. C. no. 15. *Unbek.* R.

68. *Abietella*, *Tannenſchabe.*

Wien. Schmett. p. 138. C. no. 19. *Tannenſchabenraupe.* (Pini abietis. *Cluſ.*)

69. *Adſcitella*, *grauglänzende* Schabe.

Wien. Schmett. p. 138. C. no. 20. *Unbek.* R.

70. *Procerella*, *goldgelbe* Schabe.

Wien. Schmett. p. 138. C. no. 21. *Unbek.* R.

71. *Tetricella*, *düſterglänzende* Schabe.

Wien. Schmett. p. 138. C. no. 22. *Unbek. R.*

72. *Deniſella*, *gelbgraue weiſsgefleckte* Schabe.

Wien. Schmett. p. 138. C. no. 23. *Unbek.* R.

73. *Lipſiella*, *Hirſchfarbene* Schabe *mit einer weiſslichten Nerve.*

Wien. Schmett. p. 138. C. no. 24. *Unbek.* R.

74. *Tremella*, *Zitterpappelſchabe.*

Wien. Schmett. p. 139. C. no. 27. *Unbek.* R.

75. *Criſtella*, *hellgraue* Schabe *mit ſchwarzen Randflecken.*

Wien. Schmett. p. 139. C. no. 28. *Unbek.* R.

76. *Turpella*, *düſter und blaſsgraugemiſchte* Schabe.

Wien. Schmett. p. 139. C. no. 29. *Unbek.* R.

77. *Umbrella*, *graugelbe glänzende* Schabe *mit düſtern Flecken.*

Wien. Schmett. p. 139. C. no. 31. *Unbek.* R.

78. *Ob-*

78. *Obſoletella*, *Staubfarbigte* Schabe.
Wien. Schmett. p. 139. C. no. 32. *Unbek.* R.

79. *Plumbella*, *Bleyfarbene* Schabe *mit ſchwarzer Mittelmakel und ſchwarzen Punkten.*
Wien. Schmett. p. 139. C. no. 34. *Unbek.* R.

80. *Violella*, *glänzende düſter Veilrothe* Schabe.
Wien. Schmett. p. 139. C. no. 35. *Unbek. R.*

81. *Laevigella*, *braune* Schabe *mit Goldſtäubchen.*
Wien. Schmett. p. 139. C. no. 36. *Unbek.* R.

82. *Lactella*, *glänzend braungemiſchte* Schabe *mit weiſſem Kopfe und Rücken.*
Wien. Schmett. p. 139. C. no. 37. *Unbek.* R.

83. *Rhombella*, *Holzfarbigte ſchwarzgezeichnete* Schabe.
Wien. Schmett. p. 139. C. no. 38. *Unbek.* R.

84. *Obſcurella*, *düſtere* Schabe *mit bleichem Auſſenrandpunkte.*
Wien. Schmett. p. 139. C. no. 39. *Unbek.* R.

85. *Aquella*, *bleiche* Schabe *mit dunkler Zeichnung.*
Wien. Schmett. p. 139. C. no. 40. *Unbek.* R.

86. *Alabaſtrella*, *weiſſe* Schabe.
Wien. Schmett. p. 139. C. no. 41. *Unbek.* R.
Geoffr. Inſ. II. p. 168. no. 115.
Phalaena ſeticornis ſpirilinguis alba, oculis nigris, antennis pedibusque ſubflaveſcentibus.
L'albâtre.
Long. $2\frac{1}{2}$ lign.

87. *Vulgella*, *graue* Schabe.
Wien. Schmett. p. 139. C. no. 44. *Unbek.* R.

88. *Terſella*, *bleiche* Schabe.

Wien. Schmett. p. 139. C. no. 45. *Unbek.* R.

89. *Sisymbrella*, *Wellensamenschabe.*

Wien. Schmett. p. 140. C. no. 46. *Wellensamenschabenraupe* (Sisymbrii Sophiae).

90. *Formosella*, *gelbe Schabe mit silbernem Aufsenrandmakel.*

Wien. Schmett. p. 140. C. no. 47. *Unbek.* R.

91. *Pedisequella*, *bleichglänzende Schabe.*

Wien. Schmett. p. 140. C. no. 48. *Unbek.* R.

92. *Terrella*, *röthlichgraue Schabe.*

Wien. Schmett. p. 140. C. no. 49. *Unbek.* R.

93. *Laminella*, *glänzende dunkelstahlgrüne Schabe.*

Wien. Schmett. p. 140. C. no. 51. *Unbek.* R.

94. *Nebulella*, *Aschgraue Schabe mit schwarzen Punkten.*

Wien. Schmett. p. 140. C. no. 52. *Unbek.* R.

95. *Echiella*, *Natterkopfschabe.*

Wien. Schmett. p. 140. C. no. 54. *Natterkopfschabenraupe* (Echii vulgaris).

96. *Derasella*, *bleichbraune Schabe.*

Wien. Schmett. p. 140. C. no. 56. *Unbek.* R.

97. *Cuspidella*, *schwarzbraune Schabe mit 4 weißlichen Streifen.*

Wien. Schmett. p. 140. C. no. 58. *Unbek.* R.

98. *Micella*, *stahlgrüne Schabe mit blausilbernen Punkten.*

Wien. Schmett. p. 140. C. no. 59. *Unbek.* R.

99. *Atrella*,

99. *Atrella*, *blauſchwarze Schabe mit 4 weißen Punkten.*

Wien. Schmett. p. 140. C. no. 60. *Unbek.* R.

100. *Pennella*, *Silberweißgeſtrichte Schabe.*

Wien. Schmett. p. 140. C. no. 61. *Unbek.* R.

101. *Eburnella*, *Helfenbeinfarbene gelbgeſtrichte Schabe.*

Wien. Schmett. p. 140. C. no. 63. *Unbek.* R.

102. *Variella*, *graue bleichgefleckte Schabe.*

Wien. Schmett. p. 140. C. no. 64. *Unbek.* R.

103. *Epilobiella*, *Weidrichsröschenſchabe.*

Wien. Schmett. p. 141. C. no. 65. *Weidrichsröschenſchabenraupe* (Epilobii hirſuti).

104. *Sparſella*, *weißliche ſchwarzgeſprengte Schabe.*

Wien. Schmett. p. 141. C. no. 67. *Unbek.* R.

105. *Nanella*, *ſchwarzgrau und weißgemiſchte Schabe.*

Wien. Schmett. p. 141. C. no. 68. *Unbek.* R.

106. *Opimella*, *bräunlichte Schabe mit ſilbernem Mittelraume.*

Wien. Schmett. p. 141. C. no. 69. *Unbek.* R.

107. *Pygmaeella*, *Goldfarbigte Schabe mit bleichem Innenrande.*

Wien. Schmett. p. 141. C. no. 70. *Unbek.* R.

108. *Locupletella*, *goldene und ſilberne Schabe mit düſterm Untenrande.*

Wien. Schmett. p. 141. C. no. 71. *Unbek.* R.

109. *Dimidiella*, *halbgelb und halbſchwarze Schabe.*
Wien. Schmett. p. 141. C. no. 72. *Unbek.* R.

110. *Pumilella*, *weiß und graue Schabe.*
Wien. Schmett. p. 141. C. no. 73. *Unbek.* R.

111. *Acceſſella*, *graubraune Schabe mit bleichgelben Flecken.*
Wien. Schmett. p. 141. C. no. 74. *Unbek.* R.

112. *Majorella*, *goldbraun gezeichnete Schabe.*
Wien. Schmett. p. 141. D. *Schnauzenloſe Schaben*, Ph. Tin. *Impalpes:* no. 1. *Unbek.* R.

113. *Membranella*, *mattgelbe durchſichtige Schabe.*
Wien. Schmett. p. 142. D. no. 3. *Unbek.* R.

114. *Rubricella*, *braunröthliche kleingeſtrichte Schabe.*
Wien. Schmett. p. 142. D. no. 5. *Unbek.* R.

115. *Pilella*, *glänzend düſtergraue Schabe.*
Wien. Schmett. p. 142. D. no. 6. *Unbek.* R.

116. *Ephemerella*, *weiſsliche faſt durchſichtige Schabe.*
Wien. Schmett. p. 142. D. no. 9. *Unbek.* R.

117. *Spretella*, *Aſchgraue Schabe mit ſchwarzen Punkten.*
Wien. Schmett. p. 142. D. no. 10. *Unbek.* R.

118. *Maurella*, *glänzendſchwarze Schabe.*
Wien. Schmett. p. 142. D. no. 11. *Unbek.* R.

119. *Ferrugella*, *Goldgelbe bräunlichgemiſchte Schabe.*
Wien. Schmett. p. 142. D. no. 14. *Unbek.* R.

120. *Pro-*

120. *Pronubella*, *Trübgoldschielende Schabe mit gelben Unterflügeln.*
Wien. Schmett. p. 142. D. no. 16. *Unbek.* R.

121. *Taurella*, *grau und schwärzlichte Schabe mit knotigen Fühlhörnern.*
Wien. Schmett. p. 142. D. no. 17. *Unbek.* R.

122. *Miscella*, *düstergelb und blaugemischte Schabe mit Hökern.*
Wien. Schmett. p. 142. D. no. 18. *Unbek.* R.

123. *Aurella*, *rothgoldene Schabe mit silbernem Querbande.*
Wien. Schmett. p. 142. D. no. 19. *Unbek.* R.

124. *Schiffermillerella*, *rothgoldene Schabe mit stahlblauem Querbande.*
Wien. Schmett. p. 142. D. no. 20. *Unbek.* R.

125. *Exiguella*, *düstere Schabe mit weisslichem Querstriche.*
Wien. Schmett. p. 143. D. no. 21. *Unbek.* R.

126. *Flavifrontella*, *grauglänzende Schabe mit gelbem Kopfe.*
Wien. Schmett. p. 143. D. no. 22. *Unbek.* R.

127. *Obviella*, *Aschgraue Schabe mit gelblichtem Innenrande.*
Wien. Schmett. p. 143. D. no. 23. *Unbek.* R.

128. *Albinigrella*, *schwärzlichte Schabe mit 8 weissen Makeln.*
Wien. Schmett. p. 143. D. no. 27. *Unbek.* R.

129. *Masculella*, *grauglänzende Schabe mit zwey weissen Innenrandpunkten.*
Wien. Schmett. p. 143. D. no. 28. *Unbek.* R.

130. *Fibulella*, *Purpurschielende Schabe mit einem goldenen Gemeinmakel.*
Wien.

Wien. Schmett. p. 143. D. no. 33. *Unbek.* R.

131. *Metallella*, *dunkelgoldne Schabe mit 6 Silberzeichen.*

Wien. Schmett. p. 144. D. no. 34. *Unbek.* R.

132. *Cydoniella*, *Quittenblattſchabe.*

Wien. Schmett. p. 144. D. no. 35. *Quittenblattſchabenraupe* (in Pyri Cydoniae foliis).

133. *Rejectella*, *grauglänzende Schabe mit einem ſchwärzlichen Punkte.*

Wien. Schmett. p. 144. D. no. 37. *Unbek.* R.

134. *Irella*, *grauliche dunkelgefleckte Schabe.*

Wien. Schmett. p. 144. D. no. 39. *Unbek.* R.

135. *Alucitella*, *goldglänzende Schabe mit 2 düſtern Querflecken.*

Wien. Schmett. p. 144. D. no. 40. *Unbek.* R.

136. *Hemidactylella*, *oraniengelbe rothbraunpunktirte Schabe.*

Wien. Schmett. p. 144. D. no. 41. *Unbek.* R.

137. *Microdactylella*, *weiſse Schabe mit Goldgelben Winkelſtreifen.*

Wien. Schmett. p. 144. D. no. 42. *Unbek.* R.

138. *Hirſutella*, *Schwingelſchabe.*

Wien. Schmett. Nachtr. p. 318. ad A. *Schwingelſchabenraupe* (Feſtucae ovinae et elatioris).

139. *Legatella*, *breitflüglichte graue Schabe mit einem langen Silberſtreife.*

Wien. Schmett. Nachtr. p. 319. ad B. *Unbek.* R.

140. *Tribunella*, *breitflüglichte graue Schabe.*

Wien. Schmett. Nachtr. p. 319. ad B. *Unbek.* R.

141. *Cen-*

141. *Centuriella*, *blafsgraue braungelb und düfterfleckichte Schabe.*
Wien. Schmett. Nachtr. p. 319. ad B. *Unbek.* R.

142. *Combinella*, *Silberweifse*, *auswärts braungelbe Schabe.*
Wien. Schmett. Nachtr. p. 319. ad B. *Unbek.* R.

143. *Marginella*, *glänzende bräunliche Schabe mit einer weifsen Aufsenrandlinie.*
Wien. Schmett. Nachtr. p 319. ad B. *Unbek.* R.

144. *Tripunctella*, *Flachsbräunliche Schabe mit drey fchwarzen Punkten.*
Wien. Schmett. Nachtr. p. 319. ad B. *Unbek.* R.

145. *Perficella*, *Pfirfichfchabe.*
Wien. Schmett. Nachtr. p. 319. ad B. *Pfirfichfchabenraupe* (Amygdali Perficae).

146. *Bififfella*, *Pflaumenfchabe.*
Wien. Schmett. Nachtr. p. 319. ad B. *Pflaumenfchabenraupe* (Pruni domeftiçae).

147. *Ornatella*, *hellbraune blaulichtweifsgeftrichelte Schabe.*
Wien. Schmett. Nachtr. p. 319. ad C. *Unbek.* R.

148. *Ligulella*, *Sammetfchwarze Schabe mit einem weifsen Querftriche.*
Wien. Schmett. Nachtr. p. 319. ad C. *Unbek.* R.

149. *Feftivella*, *Goldgelb und Silberweifs gemifchte Schabe mit erhobenen braunen Fleckchen.*
Wien. Schmett. Nachtr. p. 319. ad C. *Unbek.* R.

150. *Albipunctella*, *Rufsfarbene Schabe mit 3 weifsen Punkten.*
Wien. Schmett. Nachtr. p. 319. ad C. *Unbek.* R.

151. *Aeneella*, *grünlichtgoldene Schabe.*
Wien. Schmett. Nachtr. p. 319. ad C. *Unbek.* R.

152. *Mi-*

152. *Minimella*, *düſtergoldne* Schabe.
Wien. Schmett. Nachtr. p. 319. ad C. *Unbek.* R.

153. *Splendella*, *blankbraune Schabe mit röthlichſilbernem Innenrande und Punkte.*
Wien. Schmett. Nachtr. p. 320. ad D. *Unbek.* R.

154. *Cuprella*, *ganz rothgoldne* Schabe.
Wien. Schmett. Nachtr. p. 320. ad D. *Unbek.* R.

155. *Rupella*, *dunkelrothgoldene Schabe mit 4 runden Silbermakeln.*
Wien. Schmett. Nachtr. p. 320. ad D. *Unbek.* R.

156. *Praelatella*, *blankveilrothe Schabe mit 2 ſilbernen Eckmakeln und einem Querſtriche.*
Wien. Schmett. Nachtr. p. 320. ad D. *Unbek.* R.

157. *Argyrodactyla*, *ſilberne Schabe mit ſchwarzgeſtricheltem Untenrande und Kielförmigen Unterflügeln.*
Wien. Schmett. Nachtr. p. 320. ad D. *Unbek.* R.

158. *Erythrodactyla*, *röthlichgelbe dunkelrothfleckichte* Schabe.
Wien. Schmett. Nachtr. p. 320. ad D. *Unbek.* R.

159. *Perlella*, die *Perlmotte.*

Scop. Entom. carn. p. 243. no. 620.
Alae ſupra eodem prorſus, quo perla, colore fulgidae; ſubtus fuſceſcentes.
In *Pratis.* *Long.* lin. 6.

Wien. Schmett. p. 134. B. no. 11. *glänzend Perlfarbichte Schabe.* *Unbek.* R.

Knochs Beytr. zur Inſektengeſch. I St. p. 68. t. 4. f. 6. Ph. Tin. *Perlella*, die *Perlmotte.*
Tinea alis oblongis margaritato-fulgidis, ſubtus furvis.

160. Se-

160. *Semirubella*, der *Halbröthling.*
Scop. Entom. carn. p. 245. no. 623.
Alae anticae vinaceae, semipalcaceae.
In *Gramineis.* *Long.* lin. 6.

161. *Rosella*, die *halbrosenfarbige Motte.*
Scop. Ent. carn. p. 245. no. 624.
Alae anticae albae, semiroseae. Occiput aureum.
In *herbidis collibus.* *Long.* lin. 4.

162. *Viduella*, der *Einsiedler.*
Scop. Ent. carn. p. 245. no. 625.
Alae anticae albae; linea fusca, a basi ad apicem prope marginem crassiorem decurrente.
In *Sylvis*, rarior et solitaria. *Long.* lin. $4\frac{1}{3}$.

163. *Fuscella*, der *Braunpunkt.*
Scop. Ent. carn. p. 245. no. 626.
Alae canescentes, fusco-punctatae.
In *montanis nostris.* *Long.* lin. 4.

164. *Craterella*, die *Achtlinie.*
Scop. Ent. carn. p. 246. no. 627.
Alae anticae albidae; lineis longitudinalibus *octo* binisque transversis ferrugineis.
In *Gramine.* *Long.* lin. $5\frac{1}{3}$.

165. *Chrysonuchella*, der *Streupunkt.*
Scop. Ent. carn. p. 246. no. 628.
Alae albidae, margine crassiore, *punctulis sparsis*, strigisque binis transversis fuscescentibus.
In *pratis.* *Long.* lin. $5\frac{1}{3}$

Wien.

Wien. Schmett. p. 134. B. no. 8. *weifslichte Schabe mit einem Silberbogen und Untenrande. Unbek.* R.

166. *Virginella*, das *Jüngferchen.*
Scop. Ent. carn. p. 246. no. 629.
Pallida tota et albicans; alis anticis maculis duabus albiſſimis, anteriore conica, poſteriore quadrata.
In *Nemoribus.* *Long.* lin. 5.

167. *Cornutella*, das *Zweyhorn.*
Scop. Ent. carn. p. 247. no. 633.
Tota oſſea et polita; palpis *erectis.*
In *pratis.* *Long.* lin. $5\frac{1}{2}$.

168. *Marginella*, der *Blafsrand.*
Scop. Ent. carn. p. 248. no. 635.
Pallide caryophyllina; alis anticis margine craſſiore pallidiore punctisque (6-7) caryophyllinis variegato, fimbria ſubargentea.
In *Pomariis* circa Idriam. *Long.* lin. $3\frac{1}{2}$.

169. *Palliatella*, das *Schwarzauge.*
Scop. Ent. carn. p. 248. no. 636.
Oſſea tota, alis impoſitis, oculis nigris.
In *Nemoribus* noſtris. *Long.* lin. 7.

170. *Cervinella*, die *Hirſchhornfarbige Motte.*
Scop. Ent. carn. p. 248. no. 637.
Alae *cervinae;* anticae punctis poſticis nigris (4) in margine craſſiore, (7) in exteriore. Corpus ſubtus ſubargenteum.
In *Pratis.* *Long.* lin. $5\frac{1}{2}$.

171. *Forficella*, der *Goldkopf.*
Scop. Ent. carn. p. 248. no. 638.

Alae

Alae anticae fuſco-ferrugineae; capite, ſtriga a baſi ad angulum poſticum extenſa, maculaque obliqua poſtica marginis craſſioris, *ſubaurei coloris.*

In *Sylvis.* *Long.* lin. 5.

172. *Flavella*, der *Gelbling.*

Scop. Ent. carn. p. 249. no. 639.

Caput, dorſum, alae anticae ſupra flavae ferrugineo-ſubfaſciatae.

In *Nemoribus umbroſis.* *Long.* lin. $4\frac{1}{2}$.

173. *Gemmatella*, die *Juwelenmotte.*

Scop. Ent. carn. p. 249. no. 640.

Alae anticae flaveſcentes; faſciis ferrugineis punctisque argenteis variegatae.

In *Collibus noſtris.* *Long.* lin. $3\frac{3}{4}$.

Wien. Schmett. p. 135. B. no. 25. *Gelblichte Schabe mit zwey bräunlichten Bändern. Unbek.* R.

174. *Eclipſella*, der *Dickrand.*

Scop. Ent. carn. p. 249. no. 641.

Obſcure cana; alis anticis margine craſſiore nigro-punctatis.

In *Pratis.* *Long.* $3\frac{1}{3}$.

175. *Mucronella*, der *Lanzettenflügel.*

Scop. Ent. carn. p. 250. no. 643.

Alae omnes *lanceolatae*, mucronatae, nitidae, concolores, pallidae; anticae longitudinaliter fuſco-ſublineatae.

Unicam collegi circa *Idriam.*

Long. lin. $6\frac{1}{2}$.

Wien. Schmett. p. 136. B. no. 45. *Unreinſtrohfarbichte Schabe. Unbek.* R.

176. *Scabioſella*, die *Skabioſenmotte.*

Scop. Ent. carn. p. 250. no. 644.

Alae anticae auratae, margine ſubtusque una cum poſticis utrinque haematiticae lucidae. Antennae alis longiores, albae, baſi nigricantes.

In Floribus *Scabioſae officin.*

Long. lin. 4.

Poda Muſ. Graec. p. 94. *Metallica.*

Füeßl. ſchweiz. Inſ. p. 43. no. 846. Tin. *Scabioſella* Scop. Auf den wilden *Skabioſen.*

Sulzers Geſch. der Inſ. p. 163. t. 23. f. 16. die *Skabioſenmotte.*

177. *Viridella*, der *Goldgrünling.*

Scop. Ent. carn. p. 250. no. 645.

Alae anticae viridi-auratae. Femora poſtica barbata.

In *Sylvis Idrienſibus. Long.* lin. $3\frac{1}{3}$.

Wien. Schmett. p. 142. D. no. 4. *Mattgrüngoldglänzende Schabe. Unbek.* R.

178. *Barbatella*, der *Bartling.*

Scop. Ent. carn. p. 251. no. 646.

Alae anticae glaucae, aurato-punctatae. *Palpi barbati.* Antennae alis longiores, apice albidae.

In *Collibus gramineis Carnioliae ſuper.*

Long. lin. $2\frac{1}{3}$.

179. *Croeſella*, die *Goldlinie.*

Scop. Ent. carn. p. 251. no. 648.

Alae ſature violaceae, anticae faſcia, baſi et apice, lineisque longitudinalibus (5 - 7) aureis. Antennae longiſſimae albidae.

In *Evonymo vulgari.*

Long. lin. 2^{1}.

180. *Ru-*

180. *Rufimitrella*, das *Rauchmützgen.*
Scop. Ent. carn. p. 251. no. 649.
Caput lana rufa veſtitum. Corpus nigrum. Alae fuſcae, anticae ſupra fuſco-viridi aeneae.
In *Sylveſtribus.* *Long.* lin. $2\frac{1}{2}$.
Wien. Schmett. p. 142. D. no. 15. *Bräunlicht-Meſſingfarbige Schabe. Unbek.* R.

181. *Hemerobiella*, die *Hemerobienmotte.*
Scop. Ent. carn. p. 252. no. 650.
Alae anticae canae, fuſco-punctulatae. Tibiae poſticae plumoſae.
Friſch Inſ. I. p. 37. 3 Pl. t. XI. f. 1-6. *von der Blattmotte, die mit aufgerichteter gerader Hülſe fortkriecht.* *)

182. *Obſcurella*, der *Düſterling.*
Scop. Ent. carn. p. 252. no. 652.
Fuſca; alis anticis ſupra fuſco-auratis, apice ſubhaematiticis.
In *Carniolia* inferiore.
Long. lin. 3.

183. *Feneſtrella*, die *Fenſtermotte.*
Scop. Ent. carn. p. 252. no. 653.
Alae anticae albidae; maculis punctisque nigris, poſtice nebula ſubaurata.
Circa *feneſtras* occurrit primo vere.
Long. lin. 3.

184. *Scalella*, die *Treppenmotte.*
Scop. Ent. carn. p. 253. no. 654.
Alae anticae albae; tribus paribus punctorum nigrorum, contiguorum, totidem obliquas aeque diſſitas veluti faſcias praeferentium.

*) Dies die perpendikular ſtehenden braunen Bälglein auf den *Apfel-und Birnblättern.*

Ruri. *Long.* lin. 2.

185. *Punctella*, der *Punktling.*
Scop. Ent. carn. p. 253. no. 655.
Alae anticae niveae; punctis fuſceſcentibus, in apice confluentibus variegatae.
Ruri inter *Corylos.* *Long.* lin. $2\frac{1}{2}$.

186. *Comella*, das *Weißhaar.*
Scop. Ent. carn. p. 253. no. 656.
Capillitium album, alba coma per marginem alae internum decurrente auctum. Alae anticae ferrugineae faſcia obſcuriore, obſoleta, obliqua.
Circa *domos et hortos.*
Long. lin. $2\frac{1}{4}$.

187. *Puſiella*, der *Zwerg.*
Scop. Ent. carn. p. 253. no. 657.
Alae anticae cauda repanda terminatae, poſticae lineares.
In *Pratis.* *Long.* lin. $1\frac{1}{2}$.

188. *Thraſonella*, der *Praler.*
Scop. Ent. carn. p. 253. no. 658.
Alae anticae fuſco-auratae, lineis ſtrigisque transverſis argenteis, macula nigra ad angulum poſticum, in qua puncta tria argentea.
In *herbidis paludoſis.*
Long. lin. $2\frac{2}{3}$.

189. *Equitella*, das *Pferdeſchwänzchen.*
Scop. Ent. carn. p. 254. no. 659.
Alae anticae caudula e margine exteriore nata, loboque terminatae; lituris in margine eodem quinis, in oppoſito vero binis argenteis.
In *herbidis paludoſis.*
Long. lin. $2\frac{1}{3}$.

190. *Arun-*

190. *Aruncella*, *Schwarzwurzelmotte.*
Scop. Ent. carn. p. 254. no. 660.
Alae anticae auratae, cum intermixto violaceo-rubro colore, fronte aureis pilis pubescente.
In Paniculis *Asteae*, *Arunci.*
Long. lin. $1\frac{1}{4}$.

191. *Alchimiella*, der *Lanzettenfleck.*
Scop. Ent. carn. p. 254. no. 661.
Alae anticae aureae, striga transversa, antica, maculaque *lanceolata* apicis, laccae colore.
Circa *Idriam.* *Long.* lin. $2\frac{1}{2}$.

192. *Aureatella*, der *Goldröthling.*
Scop. Ent. carn. p. 254. no. 662.
Alae anticae rubro-auratae, fascia maculisque aureis.
In *Sylvestribus locis.* *Long.* lin. $2\frac{1}{3}$.

193. *Aeneella*, der *Kupferkönig.*
Scop. Ent. carn. p. 255. no. 663.
Fusca tota, alis anticis aeneo-fuscis.
In *Sylvis.* *Long.* lin. 3.

194. *Leucocerella*, der *weiße Doppelpunkt.*
Scop. Ent. carn. p. 255. no. 664.
Alae anticae aurato-rubrae, punctis binis obsoletis albis.
In *Sylvis.* *Long.* lin. 2.

195. *Luridella*, der *Schmutzling.*
Scop. Ent. carn. p. 255. no. 665.
Alae argenteae, anticae atomis punctisque fuscis inquinatae. Caput cum thorace album.
Circa *Labacum.* *Long.* lin. $3\frac{1}{2}$.

196. *Zoolegella*, die *Thiermotte.*

Scop. Ent. carn. p. 255. no. 666.
Pallide cervina; alis anticis puncto poſtico nigro.
In *Avium exuviis*, et *Inſectis adſervatis*, praeſertim *Cancris.*
Huic proxima, et forte eadem, Phal. Tin. *Pellionella* Linn. no. 372, ſed noſtra non eſt cana.
Long. lin. $2\frac{1}{2}$.

197. *Rufella*, der *Fuchs.*
Scop. Ent. carn. p. 255. no. 667.
Alae griſeo-cinereae, corpore pedibusque rufis.
Circa *Labacum. Long.* lin. $2\frac{1}{2}$.

198. *Murinella*, das *Mäuslein.*
Scop. Ent. carn. p. 256. no. 668.
Alae pallide murinae.
In *Carniolia inferiore. Long.* lin. 3.
Wien. Schmett. p. 137. B. no. 55. *Mausfarbichte Schabe. Unbek.* R.

199. *Arbuſtella*, die *Strauchmotte.*
Scop. Ent. carn. p. 256. no. 670.
Alae anticae ſubargenteae, puncto nigro.
Inter *arbuſta. Long.* lin. $1\frac{1}{2}$.

200. *Domeſticella*, die *Hausmotte.*
Scop. Ent. carn. p. 256. no. 671.
Albida nitens, alis omnibus apice utrinque nigro nebuloſis.
In *Cubilibus. Long.* lin. 3.

201. *De Bornella*, die *Goldbinde.*
Scop. Ann. 5. hiſt. nat. p. 118. no. 137.
Antennis longiſſimis; alarum anticarum lineis aureis

aureis nigrisque, et fascia aurea violaceo margine moeniata.

Circa *Schemnitz.* *Long.* alae ant. lin. 5-6.

202. *Gronoviella*, das *Mohrenkind.*

Scop. Ann. 5. hist. nat. p. 119. no. 138.

Alis nigris, punctis aureo-argenteis 8-9; marginalibus tribus maioribus.

Circa *Schemnitium.*

Alae anticae *Long.* lin. 4.

203. *Vandelliella*, die *Violetlinie.*

Scop. Ann. 5. hist. nat. p. 119. no. 139.

Alae anticae aureae; linea media *violacea*, fascia versus basin argentea, violaceo-marginata.

Circa *Schemnitium.* Statura prioris.

204. *Cornella*, die *Korneelkirschenmotte.*

Fabric. S. E. p. 657. no. 8.

Alis niveis, fascia punctisque numerosis fuscis.

Habitat in *Saxoniae corno.*

— Spec. Inf. II. p. 291. no. 11. Tin. *Cornella.*

205. *Nigrella*, der *Rothafter.*

Fabric. S. E. p. 658. no. 19.

Nigra, alis fuscis, abdomine rufo.

In *Daniae Nemoribus.*

— Spec. Inf. II. p. 294. no. 24. Tin. *Nigrella.*

206. *Cryptella*, die *ostindianische Wellenstreife.*

Fabric. S. E. p. 658. no. 20.

Alis griseis, linea dimidiata albissima strigaque postica undata, argentea.

In *India orientali.*

— Spec. Inf. II. p. 294. no. 25. Tin. *Cryptella.*

207. *Limbella*, der *Saumflügel.*

Fabric. S. E. p. 660. no. 27.
Alis ciliatis, exalbidis, limbo maculisque fuscis.
In *Germaniae Nemoribus.*
— Spec. Inf. II. p. 296. no. 35. Tin. *Limbella.*

208. *Undella*, die *Wellenmotte.*
Fabric. S. E. p. 661. no. 35.
Alis fusco-cinereis; lineola media fasciaque posticae undatis, albis.
— Spec. Inf. II. p. 297. no. 47. Tin. *Undella.*
In *Germania.*

209. *Compositella*, der *Rückenfleck.*
Fabric. S. E. p. 663. no. 46.
Alis fuscis; macula communi dorsali argentea, e strigis quatuor compositis.
In *Angliae Nemoribus.*
— Spec. Inf. II. p. 300. no. 62. Tin. *Compositella.*

210. *Drurella*, die *Drurella.*
Fabric. S. E. p. 666. no. 64.
Alis fusco-argenteis, fascia postica aurea.
Hafniae.
— Spec. Inf. II. p. 305. no. 89. Tin. *Drurella.*

211. *Aurella*, der *Goldflügel.*
Fabric. S. E. p. 666. no. 65.
Alis auratis, postice atris, fascia argentea. *Lipsiae* in Pomonae arboribus.
— Spec. Inf. II. p. 305. no. 92. Tin. *Aurella.*

212. *Spissicella*, das *Dickhorn.*
Fabric. Mantiss. p. 295. no. 3-4.
Alis oblongis griseis, antennarum articulis duobus inferioribus *incrassatis.*

Chilo-

Chilonii.

Fabric. Spec. Inſ. p. 289. no. 4. Tin. *Spiſſicella.*

213. *Arcella*, der *Braunbogen.*

Fabric. Mantiſſ. p. 295. no. 29-30.
Alis niveis; *arcu* communi maculisque duabus marginalibus fuſcis.
In *Germania.*

— Spec. Inſ. II. p. 296. no. 38. Tin. *Arcella.*

214. *Cylindrella*, die *Walzenförmige Motte.*

Fabric. Mantiſſ. p. 295. no. 34-35.
Alis anticis linearibus fuſcis, maculis tribus flavis.
Hamburgi.

— Spec. Inſ. II. p. 297. no. 45. Tin. *Cylindrella.*

215. *Bipunctella*, der *Zweypunkt.*

Fabric. Mant. p. 296. no. 38-39.
Alis fuſco-cinereis, puncto marginali albo.
Hamburgi.

— Spec. Inſ. II. p. 298. no. 51. Tin. *2-punctella.*

216. *Sulphurella*, die *Schwefelmotte.*

Fabric. Mant. p. 296. no. 45-46.
Fuſca, capite thorace alarumque baſi maculaque coſtali ſulphureis.

— Spec. Inſ. II. p. 300. no. 61. Tin. *Sulphurella.*
In *Germaniae Nemoribus.*

217. *Seppella*, der *doppelte Silberſtrich.*

Fabric. Mantiſſ. p. 296. no. 52-53.
Alis auratis, ſtrigis duabus argenteis.
In *Anglia.*

— Spec. Inſ. II. p. 301. no. 70. Tin. *Seppella.*

218. *Cramerella*, der *ſchwarze Endpunkt.*

Fabric. Mantiſſ. p. 296. no. 64-65.

Alis pallide argenteis poſtice fuſcis maculis marginalibus argenteis punctoque terminali atro.

In *Anglia.*

— Spec. Inſ. II. p. 305. no. 90. Tin. *Cramerella.*

219. *Linetella*, der *lineirte Flügel.*

Fabric. Spec. Inſ. II. p. 291. no. 12.

Alis albidis fuſco-lineatis, apice ſtrigis duabus fuſcis.

In *Agro Pedemontano.*

220. *Strigella*, die *ſilberne Randſtreife.*

Fabric. Spec. Inſ. II. p. 293. no. 22.

Alis anticis cinereo-flaveſcentibus, ſtriga marginali argentea.

In *Germania.*

221. *Marginella*, der *weiße Walſtrand.*

Fabric. Spec. Inſ. II. p. 293. no. 23.

Alis anticis fuſcis, margine craſſiori albo, palpis porrectis incraſſatis.

222. *Gramella*, die *Winkelſtreife.*

Fabric. Spec. Inſ. II. p. 294. no. 26.

Alis cinereis, ſtrigis duabus angulatis fuſcis, argenteaque marginali.

In *Anglia.*

223. *Scalacella*, das *ſchwarze Treppchen.*

Fabric. Spec. Inſ. II. p. 294. no. 28.

Alis coeruleſcenti cinereis, punctis vitta media maculisque rhombeis contiguis atris.

Beſchäftigungen der Berlin. Geſellſch. Naturf. Fr. III. p. 36. t. 1. f. 6. (D. *Kühn*).

224.

224. *Stigmatella*, der *weiße Rippenfleck.*

Fabric. Spec. Inſ. II. p. 295. no. 34.
Alis ſublinearibus ferrugineis, macula coſtali alba.
In *Anglia.*

225. *Clematella*, die *Waldrebenmotte.*

Fabric. Spec. Inſ. II. p. 297. no. 41.
Alis anticis niveis, lineola baſeos, faſcia media punctoque apicis nigris.
In *Angliae Clematide.*

226. *4-punctella*, der *Vierpunkt.*

Fabric. Spec. Inſ. II. p. 298. no. 52.
Alis fuſcis, punctis duobus albidis.
In *Germania.*

227. *Fueslella*, der *Schwarzwinkel.*

Fabric. Spec. Inſ. II. p. 301. no. 66.
Alis auratis argenteo ſubfaſciatis, angulo ani macula atra, punctis tribus argenteis.
In *Germaniae Nemoribus.*

228. *Sulzerella*, die *abgebrochene Streife.*

Fabric. Spec. Inſ. II. p. 301. no. 71.
Alis cinereis, ſtrigis tribus abbreviatis lineolisque duabus apicis argenteis fuſco-marginatis.
In *Africa aequinoctiali.*

229. *Schiffermüllerella*, die *Spaltſtreife.*

Fabric. Spec. Inſ. II. p. 302. no. 75.
Alis auratis, ſtrigis tribus nigro-argenteis, tertia externe *bifida.*
In *Hamburgenſibus arboretis.*

230. *Bergſtraeſſerella*, der *Flachflügel.*

Fabric. Spec. Inſ. II. p. 302. no. 76.

Alis

Alis *planis* auratis, limbo atro punctisque argenteis numerosis.
In *Germaniae Pomariis.*

231. *Stroemella*, die *Norwegiſche Waldmotte.*
Fabric. Spec. Inſ. p. 303. no. 80.
Alis atris, punctis quatuor argenteis, maculisque quatuor marginalibus flavis.
In *Norwagiae Nemoribus.*
— Reiſe durch Norwegen p. 196.

231. *Gleichenella*, die *Engliſche Waldmotte.*
Fabric. Spec. Inſ. II. p. 303. no. 81.
Alis planis atris, faſcia media maculisque duabus apicis oppoſitis argenteis.
In *Angliae Nemoribus.*

232. *Schreberella*, der *Glanzfleck.*
Fabric. Spec. Inſ. p. 304. no. 86.
Alis auratis, baſi faſciis duabus maculisque duabus apicis argenteis nitidiſſimis.
In *Anglia.*

233. *Klemannella*, die *Engliſche Gartenmotte.*
Fabric. Spec. Inſ. p. 304. no. 87.
Alis auratis argento ſubfaſciatis, apice maculis duabus atris, interiori oblonga tripunctata.
In *Angliae hortis.*

234. *Blancardella*, der *Siebenfleck.*
Fabric. Spec. Inſ. p. 305. no. 91.
Alis auratis, lineola apicis maculisque ſeptem marginalibus argenteis.
In *Angliae Nemoribus.*

235. *Dentella*, die *Zahnbinde.*
Fabric. S. E. p. 667. no. 2. *Alucita Dentella.*

Alis

Alis fuscis, apice adscendentibus; vitta dorsali communi unidentata, alba.

Fabric. Spec. Inf. II. p. 306. no. 3.

In *Sueciae Caprifolio.*

Larva glabra, viridis, linea dorsali purpurea.

Pupa flava intra folliculum fusiformem utrinque apertum.

Degeer Inf. Tom. II. Part. I. p. 493. no. 1.

Phaléne-teigne à bande jaune du Chevre-feuille.

— *Ueberf.* II Th. I B. p. 364. no. 1. die *Mottenphaläne mit der gelben Binde auf den Geißblättern.*

Albin. Inf. t. 73. fig. e, f, g, h.

236. *Lucella*, der *Schneekopf.*

Fabric. S. E. p. 667. no. 4.

Alis flavis, immaculatis, capite thoraceque niveis.

In *Suecia.*

— Spec. Inf. II. p. 307. no. 5.

237. *Flavella*, die *gelbe Rückenbinde.*

Fabric. S. E. p. 667. no. 5.

Alis fuscis; vitta communi dorsali abbreviata maculaque flavis.

In *Suecia.*

— Spec. Inf. II. p. 307. no. 6.

238. *Bipunctella*, der *schwarze Doppelpunkt.*

Fabric. S. E. p. 668. no. 7.

Alis fuscis; vitta communi dentata, alba, thorace niveo; punctis duobus atris.

In *Lichene prunastri Saxoniae.*

Fabric.

Fabric. Spec. Inſ. II. p. 307. no. 8.

239. *Coſtella*, der *Rippenfleck.*

Fabric. S. E. p. 668. no. 10.
Nivea, alis rufo-auratis; macula *coſtali* baſeos alba, fuſco-punctata.
— Spec. Inſ. II. p. 308. no. 13.
In *Anglia.*

240. *Faſciella*, die *Braunſtreife.*

Fabric. S. E. p. 670. no. 18.
Alis auratis, *faſcia fuſca*, antennis apice albis.
In *Anglia.*
— Spec. Inſ. II. p. 310. no. 23.

241. *Sulphurella*, der *Schwefelfleck.*

Fabric. S. E. p. 670. no. 19.
Alis anticis auratis; maculis duabus *ſulphureis* oppoſitis, poſticis flavis.
In *Anglia.*
— Spec. Inſ. II. p. 310. no. 25.

242. *Oppoſitella*, der *Gegenfleck.*

Fabric. S. E. p. 670. no. 20.
Alis fuſcis; maculis duabus *oppoſitis* flavis, poſticis fuſcis.
In *Anglia.*
— Spec. Inſ. II. p. 310. no. 27.

243. *Ephippella*, die *Sattelmotte.*

Fabric. Mantiſſ. p. 297. no. 1. 2. *Alucita Ephippella.*
Alis pallide auratis, vitta dorſali nivea, faſcia aurea.
In *Europa.*

Fabric.

Fabric. Spec. Inſ. II. p. 306. no. 2.

244. *Niveella*, der *Grönländer.*

Fabric. Mantiſſ. p. 297. no. 8-9.

Alis niveis, maculis duabus marginalibus faſciaque media nigris, capite albo.

In *Anglia.*

— Spec. Inſ. II. p. 308. no. 11.

245. *Marginella*, der *Schneerand.*

Fabric. Spec. Inſ. II. p. 307. no. 8. *Alucita Marginella.*

Alis fuſco-nitidis, marginibus niveis.

In *Iuniperetis Angliae.*

246. *Striatella*, der *Gelbſtrich.*

Fabric. Spec. Inſ. II. p. 310. no. 24.

Alis auratis, flavo-ſtriatis, faſcia media flava cupro marginata.

In *Angliae hortis.*

247. *Atomella*, die *Atomenmotte.*

Müllerí Faun. Fridr. p. 58. no. 518.

Alis ex albo fuſcoque variis, ſtrigis longitudinalibus nigro-punctatis; margine poſtico argenteo.

In *Pratis.*

248. *Wiedemanella*, der *blaue Silberpunkt.*

Müllerí Faun. Fridr. p. 58. no. 519.

Alis fulvis, faſciis maculisque albis, lineis punctisque coeruleo-argenteis.

In *Pratis.*

— Zool. Dan. Pr. p. 137. no. 1601.

249. *Obliquella*, die *Schregſtreife.*

Müllerí

Mülleri Faun. Fridr. p. 58. no. 520.
Alis plumbeis, fasciis duabus obliquis albidis, margine infima albo nigroque tessulato.
In *Pratis.*
— Zool. Dan. Pr. p. 138. no. 1602.

250. *Ludvigella*, das *braune Dreyeck.* *)
Mülleri Faun. Fridr. p. 58. no. 522.
Alis griseis; basi priorum macula magna, margine extimo triangulo minimo fusco.
In *Horto.*
— Zool. Dan. Pr. p. 138. no. 1604.

251. *Hebenstreitella*, der *Düsterfleck.* **)
Mülleri Faun. Fridr. p. 58. no. 523.
Alis subfuscis, priorum maculis tribus obscuris umbraticis.
In *Horto.*
— Zool. Dan. Pr. p. 138. no. 1605.

252. *Filicella*, der *Fadenflügel.*
Mülleri Zool. Dan. Pr. p. 137. no. 1600.
Alis superioribus apice in acumen erectis fuscis, linea dorsali communi medio divergente, antennis pedibusque albis.

253. *Angulella*, der *Silberwinkel.*
Mülleri Zool. Dan. Pr. p. 137. no. 1595.
Alis cinereis lanceolatis, superioribus angulis duobus argenteis, lineolaque apicis nigra.

254. *Hauberella*, der *Weißsaum.*
Mülleri

*) Hierbey *Rösel* I. NV. 4. t. 11. die doch mit *Linn.* Cucullatella no. 376. einerley ist.

**) Hierbey *Rösel* I. NV. 4. t. 2. Diese wird bald für Linn. Tortrix *Rosana* no. 293, bald für *Oporana* no. 292. ausgegeben.

Mülleri Zool. Dan. Pr. p. 137. no. 1596.

Alis anticis ciliisque albis, posticis utrinque, anticisque subtus, nigro-cinereis.

255. *Albella*, die *Schneemotte.*

Mülleri Zool. Dan. Pr. p. 137. no. 1597.

Alis totis albis ciliatis, oculis nigris.

Geoffr. Inf. II. p. 185. no. 8.

Tinea tota alba oculis nigris.

La *Teigne blanche.*

Long. $2\frac{1}{2}$ lign.

256. *Goezella*, die *gelbe Längsstreife.*

Mülleri Zool. Dan. Pr. p. 137. no. 1598.

Alis fulvescentibus, superioribus striga longitudinali communi flava, linea marginis inferioris alba.

257. *Lupulella*, die *Krummstreife.*

Mülleri Zool. Dan. Pr. p. 137. no. 1599.

Alis fulvescentibus; fascia marginis superioris incurvata, maculaque inferioris flavis.

258. *Auratella*, das *silberne Ringelhorn.*

Mülleri Zool. Dan. Pr. p. 138. no. 1606.

Alis auratis, antennis annulo argenteo.

Der *Dronth. Gesellsch.* Schr. IV. p. 288. no. 54. Tin. *Aurata.*

259. *Ciliatella*, der *Dreysaum.*

Mülleri Zool. Dan. Pr. p. 138. no. 1607.

Alis linearibus; anticis atomis nigris, maculisque sparsis luteis, posticis ter ciliatis.

260. *Hirundinella*, der *Schwalbenſchwanz.*

Geoffr. Inſ. II. p. 182. no. 1.

Tinea corniculis duobus ſubulatis recurvis, cinerea, alis macula fuſca.

La Teigne à queue d' hirondelle.

Long. $3\frac{1}{2}$ lign. *Larg.* 2 lign.

261. *Radiella*, das *Strahlenband.*

Geoffr. Inſ. II. p. 182. no. 2.

Tinea corniculis duobus ſubulatis recurvis, alis flaveſcentibus nitidis, ſtriarum albidarum ordine duplici transverſo.

La *Teigne à bandes rayonnées.*

Long. 5 lign.

262. *Hiſtrionella*, der *gelbe Harlekin.*

Geoffr. Inſ. II. p. 184. no. 5.

Tinea alis flavis, faſciis maculisque nigris.

L' Arlequinette jaune.

Long. $4\frac{1}{2}$ lign.

263. *Nebulella*, die *Nebelmotte.*

Geoffr. Inſ. II. p. 185. no. 7.

Atro-plumbea, alis ſuperioribus fuſco-nebuloſis.

La *Teigne plombée nébuleuſe.*

Long. 2 lign.

264. *Bordella*, die *Punktborte.*

Geoffr. Inſ. II. p. 185. no. 9.

Cinerea, alarum margine inferiore punctis nigris.

La

La *Teigne à bordure depoints.*

Long. $3\frac{1}{2}$ lign.

265. *Cruciella*, das *Ritterkreuz.*

Geoffr. Inf. II. p. 187. no. 12.

Fuſca, cruce dorſi decuſſata alba.

La *Teigne à croix de Chevalier.*

Long. $2\frac{1}{2}$ lign.

266. *Triangulella*, das *dreyfache Dreyeck.*

Geoffr. Inf. II. p. 188. no. 15.

Nigra, alis pone albidis, macula triplici triangulari nigra.

La *Teigne bedaude aux trois triangles.*

Réaum. Inf. II. t. 40. f. 5.

267. *Quadrella*, die *Quadratmotte.*

Geoffr. Inf. II. p. 189. no. 16.

Alis nigris, ſuperioribus macula quadrata alba ex quatuor lineolis albis transverſis compoſita.

La *Teigne à quarrure.*

Long. $2\frac{1}{2}$ lign.

268. *Quadrillella*, der *Vierfleck.*

Geoffr. Inf. II. p. 189. no. 17.

Nigra, antice albidis, maculis quatuor nigris; pone nigris, maculis duabus albis.

La *Teigne à quadrille.*

Long. $2\frac{2}{3}$ lign.

269. *Duplicella*, die *Zweylinie.*

Geoffr. Inf. II. p. 189. no. 18.

Alis atris, punctorum alborum linea duplici transverſa.

La *Teigne noire à deux rangs de points blancs.*

Long. $1\frac{1}{4}$ lign.

270. *Faſciella*, das *Vierband.*

Geoffr. Inſ. II. p. 190. no. 20.

Alis dilute cinereis, faſciis tribus fuſcis transverſis undulatis.

La *Teigne à quatre bandes brunes ondulées.*

Long. $3\frac{1}{2}$ lign.

271. *Viridella*, das *Grünband.*

Geoffr. Inſ. II. p. 191. no. 23.

Alis corpori circumvolutis albido-roſeis, faſciis tribus obſcure vireſcentibus.

Le *Manteau à bandes verdâtres.*

Long. $6\frac{1}{2}$ lign.

272. *Roſella*, der *Roſenrand.*

Geoffr. Inſ. II. p. 192. no. 25.

Alis corpori circumvolutis albeſcentibus, margine roſeo.

Le *Manteau couleur de Roſe.*

Long. 7 lign.

273. *Cinerella*, die *Aſchmotte.*

Geoffr. Inſ. II. p. 192. no. 26.

Fuſco-cinerea, alarum macula rhomboïdaea albida oblonga.

Le *lozange cendré.*

Long. 3 lign.

274. *Fiſſella*, die *geſpaltene Flügelader.*

Geoffr.

Geoffr. Inſ. II. p. 192. no. 27.

Alis cinereis, ſuperioribus nitentibus, nervis multifidis fuſcis.

La *Teigne à nervures.*

Long. 5 lign.

275. *Mediella*, der *Zwiſchenfleck.*

Geoffr. Inſ. II. p. 194. no. 30.

Alis flaveſcentibus, lineis duabus et macula intermedia fuſcis in extremo ſuperiorum.

L'Entre-ligne.

Long. 5 lign.

276. *Fuſcorubella*, der *braune Mönch.*

Geoffr. Inſ. II. p. 194. no. 31.

Fuſco-rubra, alarum ſuperiorum margine exteriore maculis duabus flavis.

La *Teigne à deux taches jaunes en bordure.*

Long. $3\frac{1}{2}$ lign.

277. *Marmorella*, die *Marmormotte.*

Geoffr. Inſ. II. p. 195. no. 34.

Nigro-fuſca, rivulis flaveſcentibus marmorata.

La *Teigne à marbrure.*

Long. 5 lign.

278. *Obliquella*, der *Sonderling.*

Geoffr. Inſ. II. p. 196. no. 36.

Cinerea, alarum faſcia triplici obliqua undulata fuſca.

La *Teigne griſe à trois ſautoirs bruns.*

Long. $3\frac{1}{2}$ lign.

279. *Thoracella*, der *geſtreifte Bruſtſchild.*

Geoffr. Inſ. II. p. 196. no. 37.

Capite thoraceque flavo lineis longitudinalibus fuſcis, alis albo-flaveſcentibus, faſciis transverſis fuſcis.

La *Teigne à corcelet rayé.*

Long. 4 lign.

280. *Interruptella*, das *Bruchband.*

Geoffr. Inſ. II. p. 197. no. 38.

Albo-flaveſcens, faſciis duabus obliquis ferrugineis, poſteriore interrupta.

La *Teigne à bande interrompue.*

Long. $2\frac{1}{2}$ lign.

281. *Kochiella*, das *Randdreyeck.*

Geoffr. Inſ. II. p. 197. no. 39.

Alba, margine alarum exteriore maculis tribus fuſcis, triangulum referentibus.

La *Teigne à triangle marginal.*

Long. $3\frac{1}{2}$ lign.

282. *Eſperella*, das *Fünfband.*

Geoffr. Inſ. II. p. 197. no. 40.

Alba, alis ſuperioribus lineis quinque transverſis fuſcis.

La *Teigne blanche à cinq bandes brunes.*

Long. $1\frac{2}{3}$ lign.

283. *Laichartingella*, der *eingeſchnittene Rand.*

Geoffr. Inſ. II. p. 198. no. 41.

Fuſca,

Fuſca, linea duplici transverſa flava, margine alarum undique flavo-interſecto.

La *Teigne à bordure herminée.*

Long. 2 lign.

284. *Schrankella*, der *Weißring.*

Geoffr. Inſ. II. p. 198. no. 42.

Alis ſuperioribus nigris, faſcia longitudinali, maculisque duabus aureis, antennis medio albis.

La *Teigne à bande dorée, & anneau blanc aux antennes.*

Long. $2\frac{3}{4}$ lign.

285. *Herbſtella*, die *Safranmotte.*

Geoffr. Inſ. II. p. 200. no. 46.

Crocea, lineis transverſis fuſco-argenteis interruptis, alarum medio macula alba punctisque plumbeis.

La *Teigne crayonnée.*

Long. $3\frac{1}{2}$ lign.

286. *Borowskiella*, die *Schimmelmotte.*

Geoffr. Inſ. II. p. 201. no. 47.

Albida, lineis longitudinalibus reticulatis fuſcis, involucro villoſo-albeſcente.

La *Teigne moiſie.*

Long. 4 lign.

287. *Bernoulliella*, die *Stielmotte.*

Geoffr. Inſ. II. p. 201. no. 48.

Alis cinereis, lineis albis, faſciaque longitudinali fuſca, involucro fuſco pediformi.

La *Teigne à fourreau en croſſe.*

Long. 4 lign.

Réaum. Inſ. Tom. III. t. 16.

288. *Kühnella*, die *Plattenmotte.*

Geoffr. Inſ. II. p. 202. no. 49.

Nigro-cinerea, involucro fuſco recurvo, lamina duplici folioſa tecto.

La *Teigne à fourreau à deux lames.*

Long. 3 lign.

289. *Lapidella*, die *Steinmooßmotte.*

Geoffr. Inſ. II. p. 204. no. 53.

La *Teigne des pierres à fourreau rond en capuchon.*

(Noch nie zur Verwandlung gebracht.)

Réaum. Inſ. III. t. 15. f. 1. 2. 3.

— No. 54. La *Teigne des pierres à fourreau triangulaire à pans.*

Réaum. Inſ. III. t. 15. f. 7. 8.

290. *Anomalella*, der *Hautfuß.*

Degeer Inſ. Tom. II. Part. I. p. 495. no. 7.

Phaléne à antennes filiformes, à trompe, à ailes étroites élevées griſes, d'une chenille mineuſe du Roſier.

Pha-

Phaléne-teigne mineuſe griſe du Roſier.

Degeer Tom. I. t. 30. f. 20. t. 31. f. 13. 14. 16.

La Chenille une mineuſe jaune *à dix-huit pattes membraneuſes & point de pattes écailleuſes*, qui mine les feuilles du Roſier en galleries.

— *Ueberſ.* I. 3 Quart. p. 41. t. 30. f. 20. t. 31. f. 13. 14. 16.

— II Th. I B. p. 366. no. 7. die *graue Roſenblattminirmotte.*

Naturforſcher 15tes St. p. 21. t. 2. f. 1-12. *die wahre, aber unendlich kleine Phaläne der Degeeriſchen Raupe mit 18 häutigen Wulſtfüßen.*

291. *Frangutella*, die *Faulbaummotte.*

Degeer Inſ. Tom. II. Part. I. p. 496. no. 8.

Phaléne-teigne blanche, tachetée de brun de l'Aune noir.

— Tom. I. t. 32. f. 1. 4. 8. 9. 10. 11.

— *Ueberſ.* I. 3 Quart. p. 49. t. 32. f. 1. 4. 8. 9. 10. 11.

— II Th. I B. p. 367. no. 8. die *weiße braungefleckte Faulbeermottenphaläne.*

292. *Chaerophyllella*, die *Kälberkropfmotte.*

Degeer Inſ. Tom. II. Part. I. p. 496. no. 9.

Phaléne-teigne à ailes huppées, du Cerfeuil ſauvage.

— Tom. I. t. 29. f. 9-18.

— *Ueberſ.* I. 3 Quart. p. 46. t. 29. f. 9-18.

— II Th. I B. p. 367. no. 9. die *wilde Kerbelmottenphaläne mit gebüſchelten Flügeln.*

293. *Entella*, die *Koromandelſche Entella.*

Cramer Pap. exot. III. p. 27. t. 208. Fig. D.
Alis flavis; anticis maculis purpuraſcentibus rubro-marginatis, poſticis flavo-venoſis.

294. *Nobilitella*, der *Kurakaner.*

Cramer Pap. exot. III. p. 128. t. 264. Fig. G.
Alis anticis fuſco-rubris, maculis albiſſimis nigro-marginatis, poſticis incarnatis fuſco-marginatis.

295. *Molinella*, der *Scheckflügel.*

Cramer Pap. exot. IV. p. 113. t. 348. Fig. G.
Alis anticis pulchre variegatis, poſticis luteis.

296. *Florella*, die *Surinamiſche Florella.*

Cramer Pap. exot. IV. p. 114. t. 348. Fig. L.
Fuſca, flavo-maculata.

297. *Argentella*, die *Surinamiſche Silbermotte.*

Cramer Pap. exot. IV. p. 135. t. 359. Fig. I.
Tota argentea, marginibus nigricantibus.

298. *Petronella*, die *Surinamiſche Petronella.*

Cramer Pap. exot. IV. p. 164. t. 372. Fig. K.
Teſtacea, atro-ſtriata.

299. *Punctella*, der *Surinamiſche Goldpunkt.*

Cramer Pap. exot. IV. p. 164. t. 372. Fig. L.
Nigra, punctis aurantiacis atomisque flavis.

300. *Nigrella*, der *oſtindianiſche Mohr.*

Linn. S. N. ed. 12. Tom. III. App. p. 225.
Alis atris, ſtrigis albis, anteriore ſimplici, poſteriore circumflexa.

Müllers

Müllers Suppl. B. p. 314. G. no. 453. a. der *Weiß-ſtriem.*

VII. *Federmotten. Alucitae.*

(Fächerfalter; Federvögel; *Geiſtgen.* Les Papilions à ailes en plumes. *Réaum.* Les Pterophores. *Geoffr.* Phaléne-Tipule *Degeer).*

453. *Monodactyla*, die *Einfeder.*

Müller l. c. p. 756. no. 453. *Einfeder.*
Füeßl. ſchweiz. Inſ. p. 43. no. 848. Aluc. *Monodactyla.*
Réaum. Inſ. I. t. 20. f. 12-16.
Fabric. S. E. p. 671. no. 1. *Pterophorus Monodactylus.* Nom. *Linn.*
— Spec. Inſ. II. p. 310. no. 1.
Mülleri Faun. Fridr. p. 59. no. 524. Aluc. *Monod.* Nom. *Linn.*
— Zool. Dan. Pr. p. 138. no. 1608.

454. *Didactyla*, die *Zweyfeder.*

Müller l. c. p. 757. no. 454. *Zweyfeder.*
Füeßl. ſchweiz. Inſ. p. 43. no. 849. Aluc. *Didactyla.*
Gleditſch Forſtwiſſ. II. p. 939. no. 4. Aluc. *Didactyla.*
Die braune Feder- oder Fingermotte mit äſtigen zwey-und dreytheiligen Flügeln.
Wien. Schmett. p. 145. no. 2. *Märzenwurzgeiſtchenraupe* (Gei rivalis); *Märzenwurzgeiſtchen.* Al. *Didact.* L.
Schäffers Inſ. III. p. 146. c. fig. der *Federfalter.*
— Icon. t. 159. f. 5. *Pterophorus* ſecundus.
Bekm. Ep. S. L. p. 168. no. 454.

Raj.

Raj. Hiſt. Inſ. p. 205. no. 101.

Phalaena minima, alis amplis, nervis rigidis, membrana connectente, facile disrupta a ſe invicem disiunctis.

Ex *Eruca parva incarnata*, Caprifolii folia depaſcente.

Scop. Ent. carn. p. 256. no. 672.

Alae fuſcae; anticae ſemibifidae, ſegmento inferiore falcato, omnibus rachi albida.

In *Pratis noſtris.*

Long. lin. 5.

Fabric. S. E. p. 671. no. 2. *Pterophorus didactylus.*

Alis fiſſis, fuſcis, ſtrigis albis; anticis bifidis, poſticis tripartitis.

In *Convolvulo; Geo rivali.*

— Spec. Inſ. II. p. 310. no. 2.

Larva 16-poda, viridis, faſciculato-piloſa.

Pupa elongata, lineis duabus dorſalibus tuberculorum quadri-ſpinoſorum.

Müllleri Faun. Fridr. p. 59. no. 525. Aluc. *didactyla.* Nom. *Linn.*

— Zool. Dan. Pr. p. 138. no. 1609.

(An *Schaeff.* Icon. t. 93. f. 7?)

Degeer Inſ. Tom. II. p. 260. no. 1. t. 4. f. 1-9.

Phaléne-Tipule à aile brunes rayées de blanc, dont les ſuperieures ſont diviſées en deux, & les inferieures en trois parties barbues.

Phaléne-Tipule brune rayée de blanc.

— *Ueberſ.* II Th. I B. p. 186. no. 1. t. 4. f. 1-9.

Die braune, weißgeſtreifte Erdſchnakenphaläne.

455. *Tridactyla*, die *Dreyfeder.*

Müller l. c. p. 757. no. 455. t. 22. f. 18. *Dreyfeder.*

Füeſsl.

Füeßl. ſchweiz. Inſ. p. 43. no. 850. Aluc. *Tridactyla.*

Scop. Ent. carn. p. 257. no. 675. Ph. *Tridactyla.*

Nivea tota, alis anticis ultra medium bifidis; poſticis trifidis.

In *Pratis*.

Long. lin. 6.

Poda Muſ. graec. t. 2. f. 14.

Fabric. S. E. p. 671. *Pterophorus* 3. Nom. *Linn.*

— Spec. Inſ. II. p. 311. no. 3. In *Europae hortis.*

Beſchäftigungen Naturf. Fr. zu Berl. III. t. 1. f. 8. (D. *Kühn*).

Mülleri Zool. Dan. Pr. p. 138. no. 1610. An Al. *tridactyla*?

Alis patentibus fiſſis, griſeis, macula fuſca, lineaque apicis transverſa alba; poſticis tripartitis.

456. *Teſſeradactyla*, die *Wolkenfeder.*

Müller l. c. p. 757. no. 456. *Wolkenfeder.*

Pontopp. N. G. v. Dännem. p. 222. t. 17.

Fabric. S. E. p. 671. *Pterophorus* 4. Nom. *Linn.*

— Spec. Inſ. II. p. 311. no. 4.

Mülleri Faun. Fr. p. 59. no. 527. Aluc. *Teſſeradactyla.* Nom. *Linn.*

— Zool. Dan. Pr. p. 138. no. 1611.

457. *Tetradactyla*, die *Vierfeder.*

Müller l. c. p. 757. no. 457. t. 22. f. 19. *Vierfeder.*

Sulzers Geſch. der Inſ. p. 163. t. 23. f. 20. die *Vierfeder.*

Mülleri Faun. Fr. p. 59. no. 528. Aluc. *Tetradactyla.* Nom. *Linn.*

— Zool. Dan. Pr. p. 138. no. 1612.

458. *Pterodactyla*, die *Flügelfeder.*

Müller

Müller l. c. p. 757. no. 458. *Flügelfeder.*

Pontopp. Nat. Geſch. von Dännem. p. 222. t. 17.

Wien. Schmett. p. 146. no. 6. Tab. I. a. f. 8. *Windlinggeiſtchenraupe* (Convolvuli arvenſis); *Windlinggeiſtchen.* Tab. I. b. f. 8. A. *Pterodactyla* L.

Scop. Ent. carn. p. 257. no. 674.

Alae anticae bifidae, diviſura lineari, puncto nigro medio notatae.

In *pratis ſterilioribus.*

Long. lin. 4.

Fabric. S. E. p. 671. *Pterophorus* 5. Nom. *Linn.*

— Spec. Inſ. II. p. 311. no. 5.

Larva ſubpiloſa coerulea, linea dorſali purpurea.

Geoffr. Inſ. II. p. 92. no. 2.

Pterophorus fuſcus, alis ſuperioribus apice bipartitis, inferioribus tripartitis.

Le *Pterophore brun.*

Long. 10 lign.

Act. Upſal. 1736. p. 26. no. 87. *Papilio* alis ramoſis.

Mülleri Faun. Fr. p. 59. no. 526. Al. *Pterodactyla.* Nom. *Linn.*

— Zool. Dan. Pr. p. 138. no. 1613.

459. *Pentadactyla*, *Fünffeder.*

Müller l. c. p. 758. no. 459. *Fünffeder.*

Füeßl. ſchweiz. Inſ. p. 43. no. 851. Aluc. *Pentadactyla.*

Röſels Inſektenbel. I. NV. 4te Kl. p. 12. t. 5. das kleine, dicke, blaſsgrüne *Räuplein* mit braunen Punkten und hellen Streifen.

Maders (Kleem.) Raupenkal. p. 18. no. 31. *Fünffeder.*

Wien.

Wien. Schmett. p. 146. no. 9. *Schlehengeiſtchenraupe* (Pruni Spinoſae); *Schlehengeiſtchen.* Aluc. *Pentadactyla* L.

Leske Anfangsgr. der N. G. I. p. 464. no. 28. *weiße Federmotte.*

Bekm. Epit. S. L. p. 168. no. 459. Aluc. *Pentadactyla.*

Gleditſch Forſtwiſſ. II. p. 939. no. 5. Aluc. *Pentadactyla.*

Die weiße Federmotte mit fünftheiligen Flügeln.

Fabric. S. E. p. 672. *Pterophorus* 6.

Alis niveis, anticis bifidis, poſticis tripartitis.

— Spec. Inſ. II. p. 311. no. 6.

Larva 16-poda, piloſa, viridis nigro-punctata lineaque dorſali alba.

Pupa piloſa, viridis, nigro-punctata.

Müllerі Faun. Fr. p. 59. no. 529. Aluc. *Pentadactyla.* Nom. *Linn.*

— Zool. Dan. Pr. p. 138. no. 1614.

Geoffr. Inſ. II. p. 91. no. 1. t. XI. f. 6.

Pterophorus albus, alis ſuperioribus bipartitis, inferioribus tripartitis.

Le *Pterophore blanc.*

Long. 1 pouce.

460. *Hexadactyla*, die *Sechsfeder.*

Müller l. c. p. 758. no. 460. *Sechsfeder.*

Füeſsl. ſchweiz. Inſ. p. 43. no. 852. Aluc. *Hexadactyla.*

Friſch Inſ. III. p. 20. no. 10. 2te Pl. t. 7. f. 1-5. von *dem kleinen Caprifoliumblütraupлein.*

Blumenbachs Handb. der N. G. I. p. 372. no. 22. Al. *Hexadactyla.*

Wien.

Wien. Schmett. p. 146. no. 10. *Heckenkirſchengeiſtchenraupe* (Lonicerae Xyloſtei); *Heckenkirſchengeiſtchen.* Al. *Hexadactyla* L.

Bekm. Ep. S. L. p. 168. no. 460. Al. *Hexadactyla.*

Scop. Ent. carn. p. 258. no. 676.

Alae ſingulae ſexpartitae fuſcae albis transverſis lineolis faſciatae.

Circa *Labacum.*

Long. lin. $3\frac{1}{3}$.

Fabric. S. E. p. 672. *Pterophorus* 7.

Alis fiſſis, cinereis, ſingulis ſexpartitis.

— Spec. Inſ. II. p. 312. no. 7.

Geoffr. Inſ. II. p. 92. no. 3.

Pterophorus cinereus, fuſco-maculatus, alis ſuperioribus octopartitis, inferioribus quadripartitis.

Le *Pterophore en Evantail.*

Long. 6 lign.

Neue Arten von Federmotten.

1. *Diptera*, die *Einfeder.*

Sulzers Geſch. der Inſ. p. 163. t. 23. f. 19.

Alis lanceolatis albidis, fuſco-maculatis.

2. *Paradoxa*, *Meyersvögelein.*

Sulzers Geſch. der Inſ. p. 163. t. 23. f. 21. vergröſs. f. 22.

Alis piloſis binis; elinguis, barba diviſa magna.

Fortaſſe *foemina* —

3. *Ochrodactyla*, *blaßröthlichgelbes Geiſtchen.*

Wien. Schmett. p. 145. no. 1. *Unbek.* R.

4. *Tri-*

4. *Trichodactyla*, *Braunes weißgeſtrichtes Geiſtchen.*
Wien. Schmett. p. 145. no. 3. *Unbek.* R.

5. *Calodactyla*, *Dunkelbraun und Oraniengelb gemiſchtes Geiſtchen.*
Wien. Schmett. p. 146. no. 4. *Unbek.* R.
An *Degeer* Inſ. Tom. II. Part. I. p. 267. no. 2. t. 3. f. 11. 12. *Phaléne-Tipale brune?*
— *Ueberſ.* II Th. I B. p. 190. no. 2. t. 3. f. 11. 12. die *braune Erdſchnakenphaläne.*

6. *Rhododactyla*, *Heckroſengeiſtchen.*
Wien. Schmett. p. 146. no. 5. *Heckroſengeiſtchenraupe* (Roſae caninae).

7. *Leucodactyla*, *Lungenkrautgeiſtchen.*
Wien. Schmett. p. 146. no. 7. *Lungenkrautgeiſtchenraupe* (Pulmonariae officinalis).

8. *Megadactyla*, *Weißlichtes bräunlichgeflecktes Geiſtchen.*
Wien. Schmett. p. 146. no. 8. *Unbek.* R.

9. *Chryſodactyla*, *Braunes Geiſtchen mit Goldglänzenden Querſtrichen.*
Wien. Schmett. Nachtr. p. 320. *Unbek.* R.

10. *Miſtodactyla*, *Flachsblüthfarben*, *bleichroth und braungemiſchtes Geiſtchen.*
Wien. Schmett. Nachtr. p. 320. *Unbek. R.*

11. *Gonodactyla*, *Bräunlichweißes Geiſtchen mit einem düſtern Dreyeckfleckchen.*

Wien. Schmett. p. 320. *Unbek.* R.

12. *Galactodactyla*, *Milchrahmfarbenes Geiſtchen mit einem düſtern Punkte.*

Wien. Schmett. p. 320. *Unbek.* R.

13. *Bipunctidactyla*, die *Zweypunktfeder.*

Scop. Ent. carn. p. 257. no. 673.

Alae anticae cinereae, punctis tribus, nigris, lineaque fuſca longitudinali in limbo.

In *Sylveſtribus.*

Long. lin. 4.

14. *Heterodactyla*, der *Fremdling.*

Mülleri Faun. Fridr. p. 59. no. 530.

Alis patentibus fillis, nigris, maculis albis, anticis bifidis, poſticis tripartitis.

In *horto.*

— Zool. Dan. Pr. p. 138. no. 1615.

Ende der Lepidopterorum.

SMITHSONIAN INSTITUTION LIBRARIES
3 9088 01476 4120